

全科医学(医学高级): 内分泌代谢疾病考试题库(题库版)

1、单选 最应警惕的优降糖不良反应为()。

- A. 低血糖反应
- B. 过敏反应
- C. 胃肠道反应
- D. 白细胞减少
- E. 乳酸性酸中毒

正确答案: A

2、单选 甲亢早期诊断下列哪项(江南博哥)检查最敏感()。

- A. 总 T3 (TT3)、总 T4 (TT4)
- B. 游离 T3 (FT3)、游离 T4 (FT4)
- C. 高敏感度 TSH
- D. 基础代谢率
- E. 甲状腺 I 吸收率

正确答案: C

3、多选 完整的内分泌疾病诊断包括()。

- A. 功能诊断
- B. 定位诊断
- C. 定性诊断
- D. 病因诊断
- E. 实验诊断

正确答案: A, B, C, D

4、单选 19岁男性糖尿病病人, 呕吐, 无法进食伴腹泻1天, 神志昏迷, 呼吸深大, 血糖 27.7mmol/L , 血钠 140mmol/L , 血 pH 7.2 , 首先应考虑()。

- A. 低血糖
- B. 水中毒
- C. 乳酸性酸中毒
- D. 酮症酸中毒
- E. 高渗性非酮症性糖尿病昏迷

正确答案: D

5、单选 某甲状腺肿大病人甲状腺摄 I 率增高, 且高峰前移, 提示其诊断为()。

- A. 毒性弥漫性甲状腺肿
- B. 地方性甲状腺肿
- C. 单纯性甲状腺肿
- D. 慢性淋巴细胞性甲状腺炎
- E. 亚急性甲状腺炎

正确答案: A

6、单选 硫脲类药物的作用机制是（）。

- A. 使体内甲状腺激素作用减弱
- B. 抑制甲状腺激素合成
- C. 抑制甲状腺激素释放
- D. 抑制促甲状腺激素合成
- E. 抑制碘的吸收

正确答案：B

7、单选 48岁，男，身高174cm，体重80kg，既往身体健康。1周前体检发现空腹血糖8.2mmol/L，餐后2h血糖11.8mmol/L，目前最恰当的治疗为（）。

- A. 二甲双胍治疗
- B. 格列本脲（优降糖）治疗
- C. 胰岛素治疗
- D. 饮食疗法
- E. 运动疗法

正确答案：D

8、单选 男，49岁，2型糖尿病，因大叶性肺炎，发生糖尿病酮症酸中毒昏迷，治疗时以下列哪项为主（）。

- A. 积极纠正酸中毒，中枢兴奋剂
- B. 小剂量胰岛素治疗，补充液体和平衡电解质
- C. 小剂量胰岛素治疗，积极纠正酸中毒
- D. 小剂量胰岛素治疗，中枢兴奋剂
- E. 补充液体和平衡电解质，积极纠正酸中毒

正确答案：B

9、单选 患者女性，30岁。因多食、多汗、心慌伴消瘦近1个月来院就诊。体检：突眼，甲状腺2度肿大，右上极可闻及血管杂音。在询问病史及体检时，下列哪项是最不可能出现的（）。

- A. 手颤
- B. 水冲脉
- C. 多汗
- D. 月经过多
- E. 易怒

正确答案：D

10、单选 主要通过增加外周组织对葡萄糖摄取和利用的降糖药物是（）。

- A. 磺脲类
- B. 双胍类
- C. 葡萄糖苷酶抑制剂
- D. 胰岛素增敏剂

E. 磺脲类

正确答案：B

参考解析：口服降糖药主要有磺脲类、双胍类和葡萄糖苷酶抑制剂。磺脲类直接刺激胰岛B细胞释放胰岛素，改善胰岛素受体和（或）受体后缺陷；双胍类对胰岛无刺激作用，主要通过增加外周组织对葡萄糖摄取和利用，抑制葡萄糖异生及肝糖原分解而起降低血糖作用；葡萄糖苷酶抑制剂抑制小肠 α 葡萄糖苷酶活性，减慢葡萄糖吸收，降低餐后血糖。

11、单选 58岁，女，糖尿病史15年，数年前因糖尿病肾病而致慢性肾功能不全，血清生化检查：肌酐 $286\mu\text{mol/L}$ （正常值 $88.4\sim 176\mu\text{mol/L}$ ），钠 140mmol/L （正常值 $135\sim 145\text{mmol/L}$ ），钾 5.7mmol/L （正常表现不符合的是哪项（））。

A. AP $21.3/3.3\text{kPa}$ （ $160/100\text{mmHg}$ ）

B. 夜尿多

C. 尿钾排泄 30mmol/d （正常值 $20\sim 90\text{mmol/d}$ ）

D. 尿蛋白 3.2g/d

E. 血浆醛固酮 $35\mu\text{g/dl}$ （正常值 $5\sim 15\mu\text{g/dl}$ ）

正确答案：E

12、单选 下列哪一个降糖药不是刺激胰岛B细胞分泌增加的药物（）。

A. 格列吡嗪

B. 格列齐特

C. α -糖苷酶抑制剂

D. 瑞格列奈

E. 格列本脲

正确答案：C

13、单选 糖尿病患者失明的主要原因是（）。

A. 视网膜新生血管产生

B. 白内障

C. 青光眼

D. 视网膜剥离

E. 视网膜出血

正确答案：D

14、单选 用胰岛素治疗糖尿病，哪一项是不正确的（）。

A. 适用于经饮食及口服降糖药控制不良的2型糖尿病

B. 适用于1型糖尿病

C. 抢救急性严重代谢紊乱的关键用药

D. 适用于有严重急慢性并发症者

E. 糖尿病妊娠时，不需或减少剂量

正确答案：E

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/118021007061006076>