北京住院医师儿内科Ⅰ阶段《新生儿专业找答案》新版

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

1、单项选择题：新生儿寒冷损失综合征伴心率降低者，宜使用的药物是（　）。A.地高辛

B.多巴胺

C.螺内酯

D.普萘洛尔

E.苯巴比妥纳

2、单项选择题：关于新生儿胆红素代谢特点，以下哪项是错误的（　）。A.胆红素生成增多

B.转运胆红素能力不足

C.肝脏葡萄糖醛酸转移酶活性低

D.肠道内 β-葡萄糖醛酸苷酶活性较低

E.肝细胞内 Y、Z 蛋白含量低

3、单项选择题：下列新生儿肝炎与先天性胆道闭锁鉴别中最有价值的是（　）。A.黄疸发展速度

B.大便颜色

C.小便颜色

D.动态观察胆红素

E.有无先天感染

4、单项选择题：足月顺产儿，25 天，出生体重 3.2kg，母乳喂养，生后第三天出现黄疸，至今黄疸不退，小儿吃奶好，体温正常。体检：体重 3.85kg，除皮肤黄染外，无其他异常，血、尿常规均正常，血清胆红素 170μmol／L，如何处理（　）。A.光照疗法

B.交换输血

C.口服泼尼松

D.停用苯巴比妥

E.停母乳，向家长解释

5、单项选择题：早产儿有呼吸暂停，主要是因为（　）。A.肺泡数量相对少

B.呼吸中枢相对不成熟

C.肺泡表面活性物质少

D.肋间肌肌力弱

E.膈肌位置高

6、单项选择题：NRDS（新生儿呼吸窘迫综合征）出现呼吸困难的时间是（　）。A.生后 6 小时内

B.生后 12 小时

C.生后 1 天

D.生后 2 天

E.生后 3 天

7、单项选择题：新生儿败血症在病原菌未明之前，宜用哪种抗生素（　）。A.青霉素

B.万古霉素+青霉素

C.氨苄西林

D.丁胺卡那霉素+红霉素

E.耐酶青霉素+丁胺卡那霉素

8、单项选择题：一早产儿，生后 2 天发现皮肤重度黄染，嗜睡，吸吮无力，不发热，无呕吐，无惊厥。最可能是（　）。A.生理性黄疸

B.母乳性黄疸

C.先天性胆道闭锁

D.新生儿溶血病

E.新生儿化脓性脑膜炎

9、单项选择题：晚发维生素 K 缺乏症，常见的表现是（　）。A.鼻出 l　　C.给予氨茶碱兴奋呼吸

D.加大头罩给氧，浓度 8L／min

E.5%碳酸氢钠纠正酸中毒

12、单项选择题：新生儿衣原体感染首选药物为（　）。A.红霉素

B.庆大霉素

C.青霉素

D.头孢拉定

E.氨苄西林

13、单项选择题：新生儿败血症常见的临床表现，以下哪项不正确（　）。A.精神差，拒乳

B.黄疸退而复现或进行性加重

C.腹胀，肝脾大

D.均有高热，体温达 39.0℃以上

E.皮肤发花

14、单项选择题：新生儿轻度窒息，Apgar 评分是（　）。A.10 分

B.7～10 分

C.4～7 分

D.2～4 分

E.0～3 分

15、单项选择题：热胎黄的治法是（　）。A.清热利湿

B.温中化湿

C.芳香化湿

D.利水渗湿

E.活血化瘀

16、单项选择题：足月新生儿生后 2 天，因黄疸 1 天而入院，皮肤重度黄染，心肺腹脐无异常。母亲血型为”O”型，子为”A”型，血红蛋白 135g／L，网织红细胞 7.8%。该病发病机制可能为（　）。A.同族免疫性溶血

B.自身免疫性溶血

C.异常血红蛋白

D.红细胞膜缺陷

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/118026013015006063