妇产科学考试试题与答案

1、新生儿娩出后首先应。

A、断脐

B、擦洗新生儿面部

C、清理呼吸道

D、刺激新生儿足部

E、抓紧娩出胎盘及胎膜

答案：C

2、该患者最可能的诊断是

A、卵巢囊肿蒂扭转

B、输卵管妊娠破裂

C、卵巢滤泡囊肿破裂

D、卵巢黄体囊肿破裂

E、卵巢子宫内膜异位囊肿破裂

答案：B

3、妊娠合并心脏病妊娠期的处理，下列哪项是不正确的？

A、不宜妊娠者，应 12 周前行人工流产

B、妊娠 4 个月后控制食盐

C、纠正贫血，防治妊娠期高血压疾病

D、预防感染，特别是上呼吸道感染

E、常规用去乙酰毛花苷预防心衰

答案：E

4、初孕妇，26 岁。妊娠 38 周，规律宫缩 8 小时，宫口开大 6cm，S+1，胎膜已破，胎儿估计 3000g，血压 130/80mmHg，胎心 144 次/分。2 小时后肛查：宫口仍 6cm，边薄，先露 S+1，宫缩力弱，20 秒/5～6 分，胎心好。应诊断为

A、潜伏期延长

B、活跃期延长

C、活跃期停滞

D、第二产程延长

E、滞产

答案：B

5、与病理缩复环关系最密切的是

A、嵌顿性肩先露

B、臀先露

C、枕先露

D、重型胎盘早剥

E、双胎妊娠

答案：A

6、下列哪种情况与子宫破裂无关？

A、横位

B、胎儿脑积水

C、慢性输卵管炎

D、病理缩复环

E、妊娠合并宫颈肌瘤

答案：C

7、重型胎盘早期剥离的并发症不包括

A、子宫胎盘卒中

B、凝血功能障碍

C、子宫破裂

D、产后出血

E、急性肾功能衰竭

答案：C

8、产褥感染时，常见的感染是

A、急性子宫内膜炎

B、急性盆腔结缔组织炎

C、急性输卵管炎

D、盆腔腹膜炎

E、弥漫性腹膜炎

答案：A

9、若骨盆坐骨结节间经 7.5cm，应加测的骨盆经线是

A、髂嵴间径

B、出口后矢状径

C、坐骨棘间径

D、骶耻外径

E、出口前矢状径

答案：B

10、胎儿能否顺利通过产道取决于:

A、胎动是否活跃

B、胎盘功能

C、胎儿成熟度

D、骨盆倾斜度应大于 60 度

E、产力强弱,骨盆大小和形状,胎儿大小和胎位

答案：E

11、关于死胎的治疗，不正确的是：

A、宫颈成熟，可用催产素静滴引产

B、可行羊膜腔内注入利凡诺引产

C、纤维蛋白原＜2g/L，血小板＜200′109/L，应予肝素治疗

D、胎死宫内 4 周未娩出，应作凝血功能检查

E、产后应仔细检查胎盘、脐带，寻找死因

答案：C

12、初孕妇，25 岁，来院就诊，初诊妊娠期高血压疾病，对估计病情及决定处理方案最有价值的辅助检查方法是

A、测定尿雌激素 / 肌酐值

B、测定血细胞比容

C、眼底检查

D、测定谷丙转氨酶值

E、全血黏度比值和血浆黏度比值

答案：C

13、属于完全性子宫破裂的临床表现，正确的是

A、病理缩复环不再升高

B、产妇突感子宫收缩停止

C、产妇疼痛难忍

D、胎体触不清

E、阴道多量鲜血流出

答案：B

14、Ⅲ度胎盘早剥的临床表现正确的是

A、腹部柔软

B、触诊胎位清楚

C、听诊胎心正常

D、妊娠晚期无痛性阴道出

E、休克程度与阴道流血量不成正比

答案：E

15、初产妇，30 岁。孕 37 周，规律宫缩 3 小时。产科检查：宫口开大 2cm，臀先露。2 分钟前胎膜自然破裂，胎心监护显示胎心率 90 次/分，阴道内诊触及搏动条索状物。最恰当的处理措施是

A、采取头低臀高位，立即行剖宫产术

B、吸氧，胎心恢复后立即行剖宫产术

C、行外转胎位术后待自然分娩

D、静脉滴注缩宫素，宫口开全行臀牵引

E、行内转胎位术后待自然分娩

答案：A

16、下列胎心电子检测结果提示胎儿缺氧的是

A、胎心出现早期减速

B、胎心出现变异减速

C、胎心出现晚期减速

D、胎心出现加速

E、胎心出现无应激试验反应型

答案：C

17、胎头跨耻征阳性的初产妇于临产后检查，不可能出现的是

A、子宫收缩力异常

B、病理缩复环

C、胎头衔接

D、胎膜早破

E、胎位异常

答案：C

18、为明确诊断，最可靠的辅助检查是

A、B 型超声检查

B、阴道后穹隆穿刺

C、盆腹腔 CT 检查

D、盆腹腔磁共振检查

E、血 hCG

答案：B

19、该孕妇自觉胎动减少，下列检查不必要的是

A、无应激试验（NST）

B、缩宫素激惹试验（OCT）

C、B 超测羊水指数

D、胎动计数

E、胎儿纤维连接蛋白（fFN）检查

答案：E

20、经上述处理后，还应行

A、立即行剖宫术

B、等待自然分娩

C、行产钳术助娩

D、静脉滴注缩宫素加强宫缩

E、静注地西泮加速产程进展

答案：A

21、关于卵巢形态学特征，说法正确的是

A、卵巢白膜是平滑肌组织

B、成年妇女卵巢重约 50g

C、卵巢表面无腹膜

D、髓质内含许多始基卵泡

E、皮质内含血管、神经、淋巴管

答案：C

22、关于月经的叙述，正确的是

A、初潮年龄多在 15～16 岁

B、经期多为 3～5 天

C、月经周期一般为 28～35 天

D、一次经量约为 80～100ml

E、一般在经期的 4～5 天经量最多

答案：B

23、体格检查最可能发现的子宫体征是

A、不规则收缩，较硬，有压痛，宫缩间歇期子宫不完全松弛

B、柔软，有压痛，无宫缩

C、有规则阵发性收缩，宫缩间歇期子宫完全松弛

D、局部隆起有包块，有压痛

E、上段硬，下段膨隆压痛，交界处有环行凹陷

答案：A

24、最有参考价值的病史是

A、既往有无头痛史

B、既往血压正常

C、有高血压家族史

D、有患病毒性肝炎史

E、有多次泌尿系统感染史

答案：B

25、初产妇，胎儿娩出 5 分钟后，阴道流血达 300ml，暗红色，有凝血块，首先考虑

A、宫颈裂伤

B、凝血功能障碍

C、子宫收缩乏力

D、胎盘部分剥离

E、子宫胎盘卒中

答案：D

26、维持子宫在盆腔内正常位置是由：

A、盆底肌肉及其上下筋膜支配

B、膀胱和直肠的支撑

C、子宫四对韧带及盆底肌肉.筋膜的支托作用

D、腹腔压力的作用

E、子宫四对韧带的作用

答案：C

27、临产后，肥皂水灌肠可用于

A、胎膜早破

B、胎头未衔接

C、胎位异常

D、初产妇宫口开大 3cm

E、严重心脏病

答案：D

28、早期妊娠的确诊依据是

A、停经史

B、早孕反应

C、黑加征阳性

D、尿妊娠试验

E、B 型超声检查

答案：E

29、初产妇，32 岁，G4P0。妊娠 35 周，因阴道无痛性中等量流血 2 天入院。查体：P72 次/分，BP120/80mmHg。产科检查：子宫长度 33cm。无宫缩，头先露高浮，胎心率 150 次/分。该患者最可能的诊断是

A、早产

B、临产

C、胎盘早剥

D、宫颈炎

E、前置胎盘

答案：E

30、初产妇第一产程潜伏期延长是指潜伏期超过

A、8 小时

B、10 小时

C、12 小时

D、14 小时

E、16 小时

答案：E

31、胎盘早剥出血发生在

A、底蜕膜

B、包蜕膜

C、绒毛膜

D、胎盘边缘血窦

E、子宫螺旋动脉

答案：A

32、枕先露时，通过产道最小径线是胎头的

A、枕颏径

B、双顶径

C、枕下前囟径

D、枕额径

E、枕顶径

答案：C

33、子宫下段形成的时期为

A、分娩早期

B、分娩末期

C、妊娠早期

D、妊娠中期

E、妊娠末期

答案：E

34、初产妇第一产程潜伏期延长是指潜伏期超过

A、8 小时

B、10 小时

C、12 小时

D、14 小时

E、16 小时

答案：E

35、胎膜早破的病因不包括

A、病原微生物上行感染

B、羊膜腔压力增高

C、胎膜受力不均

D、维生素 C 缺乏

E、钙缺乏

答案：E

36、重型胎盘早剥与先兆子宫破裂共有的临床表现是

A、合并妊娠高血压综合征

B、剧烈腹痛

C、跨耻征阳性

D、子宫呈板状硬

E、出现病理缩复环

答案：B

37、过期妊娠时，需立即终止妊娠的是

A、2 小时胎动为 12 次

B、NST 反应型

C、III度羊水粪染

D、OCT 阴性

E、B 型超声显示羊水平面 6cm

答案：C

38、流产的定义是

A、妊娠<37 周，胎儿体重<2500g 而终止者

B、妊娠<28 周，胎儿体重<1000g 而终止者

C、妊娠<38 周，胎儿体重<2500g 而终止者

D、妊娠<24 周，胎儿体重<1500g 而终止者

E、妊娠<36 周，胎儿体重<2500g 而终止者

答案：B

39、初孕妇，32 岁。妊娠 39 周，规律宫缩 8 小时，随后持续腹痛，拒按，无间歇期，胎心不清，宫口开大 5cm，胎头 S=-1，后囟位于 1 点处。该患者最可能的诊断是

A、协调性宫缩乏力

B、强直性子宫收缩

C、先兆子宫破裂

D、持续性枕后位

E、宫颈扩张活跃期停滞

答案：B

40、关于妊娠期母体内分泌系统的变化，正确的是

A、黄体生成激素增多

B、催乳激素增多

C、游离甲状腺激素增多

D、皮质醇减少

E、卵泡刺激素增多

答案：B

41、成年妇女骨盆倾斜度的正常值应是

A、50°

B、55°

C、60°

D、65°

E、70°

答案：C

42、孕妇分娩出院后，社区医院进行产后访视的次数至少应为

A、1 次

B、2 次

C、3 次

D、4 次

E、5 次

答案：C

43、属于骨盆狭窄的径线是

A、髂棘间径 24cm

B、骶耻外径 19cm

C、骨盆入口前后径 10cm

D、坐骨棘间径 10cm

E、坐骨结节间径 7.5cm，出口后矢状径 8cm

答案：C

44、妊娠期高血压疾病最常见的并发症是：

A、胎盘早剥

B、急性肾功能衰竭

C、心脏病

D、视网膜剥离

E、HELLP 综合征

答案：A

45、头先露中最常见的是

A、枕先露

B、前囟先露

C、额先露

D、面先露

E、复合先露

答案：A

46、正常足月妊娠，子宫腔容量平均比未孕时增加的倍数为

A、100

B、200

C、300

D、500

E、1000

答案：E

47、臀先露孕妇于妊娠 26 周来院就诊，应采取的处理措施是

A、内转胎位术

B、暂不需要处理

C、左侧卧位术

D、外转胎位术

E、胸膝卧位

答案：B

48、输卵管妊娠最常见的病因是

A、输卵管发育异常

B、慢性输卵管炎

C、输卵管结扎术后再通

D、输卵管受肿瘤压迫

E、内分泌功能失调

答案：B

49、初产妇，26 岁，妊娠 39 周，临产后 9 小时，胎儿娩出 5 分钟，胎盘未娩出。不恰当的处理是

A、下压宫底

B、检查宫体是否变硬

C、观察脐带有无自行延长

D、阴道有无流血

E、测量血压

答案：A

50、女性生殖器的邻近器官，下列哪项应除外：

A、膀胱

B、输尿管

C、阑尾

D、乙状结肠

E、直肠

答案：D

51、经控制饮食 2 周后，空腹血糖 6.1mmol/L，胎心 136 次/分，无应激试验无反应型。此时最恰当的措施是

A、间断吸氧

B、自行胎动计数

C、左侧卧位

D、立即终止妊娠

E、胎儿生物物理评分

答案：E

52、初产妇，宫口开全 1.5 小时，胎头已达盆底，持续性枕左横位。处理应是

A、催产素静脉滴注

B、等其自然回转

C、人工协助顺时针转 90°

D、人工协助逆时针转 90°

E、行会阴侧切开术

答案：D

53、初产妇，29 岁。胎儿娩出 30 分钟后，出现阴道流血 200ml，用手在产妇耻骨联合上方轻压子宫下段时，外露脐带回缩，此时正确的处理措施是

A、等待胎盘剥离

B、按压宫底，牵拉脐带

C、立即输血

D、徒手剥离胎盘

E、子宫体注射麦角新碱

答案：D

54、产生 HCG 的主要部位是

A、胎膜

B、卵巢黄体

C、合体滋养层细胞

D、叶状绒毛膜

E、胎儿胎盘单位

答案：C

55、产后出血的主要原因不包括

A、凝血功能障碍

B、胎盘因素

C、软产道损伤

D、子宫收缩乏力

E、胎膜早破，宫内感染

答案：E

56、受卵巢激素的影响，子宫内膜发生周期性脱落的是

A、全层

B、表面 2/3 层

C、表面 1/2 层

D、表面 1/4 层

E、表面 1/3 层

答案：B

57、妊娠早期心脏病患者是否继续妊娠，主要根据是

A、患者年龄

B、胎儿大小

C、心脏病种类

D、心功能分级

E、病变发生部位

答案：D

58、产褥感染是指

A、产后 24 小时至 10 天内，有 2 次体温达到或超过 38 度

B、分娩后由生殖道感染引起的疾病

C、分娩后体温超过 38 度，2 次

D、分娩时体温有 2 次超过 38 度

E、分娩时及产褥期生殖道受病原体感染,引起局部、全身的感染

答案：E

59、骨盆测量数值为正常的是

A、髂棘间径 20cm

B、髂嵴间径 22cm

C、骶耻外径 17cm

D、坐骨棘间径 8.5cm

E、坐骨结节间径 9cm

答案：E

60、对角径是指

A、骨盆入口平面的前后径

B、中骨盆平面的前后径

C、坐骨棘间径

D、耻骨联合下缘至骶尾关节的距离

E、耻骨联合下缘至骶岬上缘中点的距离

答案：E

61、孕产妇首先发生右心衰竭的疾病是

A、妊娠合并二尖瓣狭窄

B、子痫

C、羊水栓塞

D、重型胎盘早剥

E、产褥感染

答案：C

62、胎儿娩出后 10 分钟，阴道出血少量，外露脐带延长这一征象表明：

A、付胎盘存在

B、胎盘剥离

C、植入性胎盘

D、胎盘粘连

E、胎盘滞留

答案：B

63、30 岁初产妇，妊娠 40 周，宫缩规律，枕左前位，胎心率正常，肛查宫口开大 2cm，胎头未衔接，符合本产妇实际情况的骨盆测量数值应是

A、骶耻外径 17cm

B、髂棘间径 24cm

C、髂嵴间径 27cm

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/118033036116007021