

2024 年河北省平泉县《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库（模拟题）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 噻托溴铵平喘的主要机制是

- A: 阻断腺苷受体
- B: 拮抗 M 胆碱受体
- C: 激动肾上腺素 β_2 受体
- D: 抑制白三烯受体

答案：B

2. 属于妊娠 C 级毒性药品的是

- A: 辛伐他汀
- B: 青霉素、头孢哌酮-舒巴坦
- C: 水溶性维生素
- D: 氧氟沙星

答案：D

3. 丝裂霉素的主要毒副作用是（）

- A: 心脏毒性
- B: 出血性膀胱炎
- C: 溶血性尿毒症
- D: 肺纤维化

答案：C

4. 下列药物中，适用于压力性尿失禁的药物为

- A: 非那雄胺
- B: 米多君
- C: 哌唑嗪
- D: 索利那新

答案：B

5. 下列药物中，能解救含亚硝酸盐的食物中毒的是

- A: 亚甲蓝
- B: 维生素 B6
- C: 维生素 K1
- D: 普萘洛尔

答案：A

6. 房颤合并支气管哮喘患者，适用于控制心室率的药物为

- A: 利伐沙班
- B: 地尔硫卓
- C: 胺碘酮
- D: 硝苯地平

答案：B

7. 公众用药咨询的内容是

- A: 栓剂、气雾剂等外用剂型的正确使用方法
- B: 不宜选用氯化钠注射液溶解的药品
- C: 减肥、补钙、补充营养素
- D: 抗菌药物的合理使用

答案：C

8. 可能引起肺间质病变的药物是 ()

- A: 甲氨蝶呤
- B: 柳氮磺吡啶
- C: 硫唑嘌呤
- D: 羟氯喹

答案: A

9. 患者，男，56 岁，因高血压常年服用苯磺酸氨氯地平 10mgqd，近期体检血脂指标为 LDL—C4.8mmol / L，药师应建议患者加服

- A: 阿托伐他汀
- B: 叶酸
- C: 二甲双胍
- D: 福辛普利

答案: A

10. 属于血管紧张素 II 受体阻断剂的抗高血压药是

- A: 卡托普利
- B: 氨氯地平
- C: 厄贝沙坦
- D: 比索洛尔

答案: C

11. 会使运动员情绪高涨、斗志昂扬，还能产生欣快感，能忍受竞技造成的伤痛，并提高攻击力的药物是

- A: 利血平
- B: 可卡因
- C: 异戊巴比妥
- D: 阿米替林

答案：B

12. 高血压患者的降压目标部分有糖尿病、蛋白尿等高危患者的高血压（）

- A: <150 / 90mmHg
- B: <140 / 90mmHg
- C: <130 / 80mmHg
- D: <120 / 80mmHg

答案：C

13. （2019 年真题）配制下列化疗药时，只能选择葡萄糖注射液做溶媒的是

- A: 奥沙利铂
- B: 环磷酰胺
- C: 博来霉素
- D: 依托泊苷

答案：A

14. （2016 年真题）患者，男，70 岁，两周前因缺血性脑卒中入院治疗，经积极治疗，病情显著缓解后出院、目前无其他伴随疾病，为进行心脑血管事件的二级预防，应首选的药物是（）。

- A: 肝素
- B: 利伐沙班
- C: 氯吡格雷
- D: 阿司匹林

答案：D

15. 早餐前半小时服用的药物是（）

- A: 瑞巴派特
- B: 吉法酯
- C: 枸橼酸铋钾
- D: 雷贝拉唑

答案：D

16. 避免用于儿童退热，可能引起 Reye's 综合征的药物是

- A: 阿司匹林
- B: 对乙酰氨基酚
- C: 塞来昔布
- D: 布洛芬

答案：A

17. 1 个半衰期给药 1 次；如需要立即达到稳态，可首剂加倍针对

- A: 半衰期小于 30 分钟
- B: 半衰期大于 24 小时
- C: 半衰期 8~24 小时
- D: 半衰期大于 30 小时

答案：C

18. 适用于伴快速型心律失常的高血压患者服用的药物是

- A: 阿利吉仑
- B: 阿替洛尔
- C: 多沙唑嗪
- D: 氢氯噻嗪

答案：B

19. 通过抑菌圈直径判断细菌对不同药物的敏感性，而不以最小抑菌浓度（MIC）判断药物抗菌作用的药敏试验方法是

- A: 琼脂稀释法
- B: 纸片扩散法
- C: 肉汤稀释法
- D: E-test 法

答案：B

20. 痛风缓解期，在关节炎症控制 1~2 周后开始使用的药物

- A: 别嘌醇
- B: 阿司匹林
- C: 秋水仙碱
- D: 呋塞米

答案：A

21. 可减弱华法林抗凝作用的药物为

- A: 苯巴比妥
- B: 阿司匹林
- C: 头孢哌酮
- D: 布洛芬

答案：A

22. 钙制剂

- A: 骨吸收抑制剂
- B: 促进骨矿化剂
- C: 骨形成刺激剂
- D: 激素替代剂

答案：B

23. 血浆半衰期最长的强心苷类药物是

- A: 米力农
- B: 洋地黄毒苷
- C: 卡维地洛
- D: 地高辛

答案：B

24. 需要在凉暗处贮存的药品是

- A: 阿卡波糖片
- B: 复方甘草合剂
- C: 硝酸甘油
- D: 头孢曲松钠

答案：B

25. 在检查尿沉渣的项目中，最能提示是肾实质性病变的证据的是

- A: 尿沉渣白细胞
- B: 尿沉渣磷酸盐
- C: 尿沉渣管型
- D: 尿沉渣结晶

答案：C

26. 尽量不用带数字的术语来表示

- A: 及时回答不拖延
- B: 特别关注特殊人群
- C: 保护患者的隐私
- D: 解释的技巧

答案：D

27. 患者，女，43 岁。近 3 月来午后低热，剧烈咳嗽，痰中带血，进食少，乏力，消瘦，应用抗菌药及止咳化痰药物无效，X 线检查未见异常，血沉未见增快，痰中找到结核菌，临床诊断为肺结核。

- A: 利福平
- B: 吡嗪酰胺
- C: 乙胺丁醇
- D: 异烟肼

答案：D

28. 以下治疗手足浅表性真菌感染的药物中，尤其适用于角化皸裂型足癣的处方药是

- A: 苯甲酸
- B: 依沙吡啶
- C: 尿素
- D: 特比萘芬

答案：D

29. 心衰治疗中能够快速控制体液潴留的药物是（）

- A: 肾上腺素
- B: 利尿剂
- C: β 受体阻断剂
- D: 阿托品

答案：B

30. 抗利尿药

- A: 硝酸甘油
- B: 甘草合剂

C: 胃黏膜保护剂

D: 去氨加压素

答案: D

31. 能保护药品免受破坏的联合是

A: 普萘洛尔联用硝苯地平降血压

B: 亚胺培南-西司他汀复方制剂

C: 磷霉素联用其他抗菌药物

D: 维生素 C 与铁剂同服

答案: B

32. 女性，32 岁，3 年来月经量增多，乏力、心悸。体检面色较苍白。

血红蛋白 80g / L，呈小细胞低色素性贫血，白细胞 $7 \times 10^9 / L$ ，血小板 $120 \times 10^9 / L$ ，血清铁 $300 \mu g / L$ 。

A: 右旋糖酐铁肌注

B: 输血

C: 硫酸亚铁口服

D: 维生素 B12 肌内注射

答案: C

33. (2016 年真题) 治疗过敏性结膜炎可选用的药物是 ()。

A: 羟甲基纤维素钠滴眼液

B: 氧氟沙星滴眼液

C: 色甘酸钠滴眼液

D: 酞丁安滴眼液

答案: C

34. 属于超短效的胰岛素制剂是

- A: 精蛋白锌胰岛素
- B: 甘精胰岛素
- C: 赖脯胰岛素
- D: 低精蛋白锌胰岛素

答案：C

35. “沟通医、药、患的重要纽带”的工作是

- A: 处方调剂
- B: 参与临床药物治疗
- C: 静脉药物配置
- D: 治疗药物监测

答案：A

36. 头孢曲松钠与乳酸钠林格注射液直接混合,可导致 ()

- A: 溶液变色
- B: 产生气体
- C: 微浑浊或沉淀
- D: 产生胶状不溶物

答案：C

37. 由细菌引起的急性卡他结膜炎可选用

- A: 2% 色甘酸钠滴眼剂
- B: 0.1% 羟苄唑滴眼剂
- C: 四环素眼膏
- D: 0.1% 碘苷滴眼剂

答案：C

38. 利尿降压药的常见不良反应是

- A: 咳嗽
- B: 水、电解质紊乱
- C: 体位性低血压
- D: 首剂现象

答案：B

39. 关于药物经济学研究方法，下列说法误的是

- A: 成本效益方法能对医疗与非医疗项目进行比较
- B: 成本效果分析不能对医疗与非医疗项目进行比较
- C: 最小成本法不能对不同疾病间进行比较
- D: 成本效用方法不能对不同疾病间进行比较

答案：D

40. 治疗良性前列腺增生症的药物中，可引起性功能减退的药物为

- A: 非那雄胺
- B: 特拉唑嗪
- C: 奥昔布宁
- D: 坦索罗辛

答案：A

41. 患者男性，30 岁，确诊哮喘入院治疗 3 周，经正规治疗病情缓解，仅偶有胸闷，出院时医生进行用药注意事项嘱咐和患者教育。

- A: H₁ 受体阻断剂
- B: 抗胆碱药物
- C: β₂ 受体激动剂
- D: β 受体阻断剂

答案：D

42. 抑制前列腺内双氢睾酮水平，达到降低雄激素水平，提高最高尿流率的是（）

- A: 特拉唑嗪
- B: 索利那新
- C: 哌唑嗪
- D: 度他雄胺

答案：D

43. 可出现痤疮样皮疹的是（）

- A: 氟尿嘧啶
- B: 阿霉素
- C: 博来霉素
- D: 吉非替尼

答案：D

44. 上市前临床试验观测的指标限于实验设计内容，其他临床指标容易忽视，属于

- A: 病例数目少
- B: 考察不全面
- C: 观察时间短
- D: 管理漏洞

答案：B

45. 需要长期使用肾上腺皮质激素的小儿应避免选用（）。

- A: 地塞米松
- B: 甲泼尼松
- C: 可的松
- D: 泼尼松

答案：A

46. 日服 180mg 元素铁是依据铁剂吸收率为

- A: 0.3
- B: 10%~30%
- C: 0.4
- D: 10%~20%

答案：A

47. 正常情况下，人血白细胞群体中占比例最小的分类细胞是

- A: 单核细胞
- B: 淋巴细胞
- C: 嗜酸性粒细胞
- D: 嗜碱性粒细胞

答案：D

48. 细菌性痢疾可出现()。

- A: 脓血便
- B: 脓状便
- C: 鲜血便
- D: 稀糊便

答案：A

49. 属于护士用药咨询的是

- A: 抗菌药物的合理应用
- B: 栓剂、气雾剂的正确使用方法
- C: 注射剂溶媒的正确选择
- D: 减肥、补钙、补充营养素

答案：C

50. 患者，女，36 岁。餐后出现恶心、呕吐，可选用的药物是

- A: 维生素 C
- B: 甲氧氯普胺或多潘立酮片
- C: 二甲硅油制剂
- D: 鞣酸蛋白

答案：B

51. 下列哪种药物是 WHO 规定的第一阶梯镇痛药物

- A: 吗啡
- B: 阿司匹林
- C: 芬太尼
- D: 可待因

答案：B

52. 某女性，45 岁，肥胖多年，自觉口渴、消瘦 5 个月，尿糖阳性，空腹血糖 8.9mmol/L，餐后两小时血糖 15.1mmol/L

- A: 甲状腺功能亢进症
- B: 1 型糖尿病
- C: 肥胖症
- D: 2 型糖尿病

答案：D

53. 牙痛等轻度疼痛宜选用的药物是

- A: 吗啡
- B: 可待因
- C: 阿司匹林

D: 多奈哌齐

答案: C

54. 患者，女，38 岁，主诉：咳嗽、咳痰、高热、乏力 2 日；查体：神清、气稍促，心律 95bpm，律齐，体温 39.1℃，血压 110 / 70mmHg；心肺听诊：两肺呼吸音粗，未及明显啰音；发病以来胃纳差、精神欠佳、二便可、夜眠可。诊断：急性上呼吸道感染。

A: 60mg

B: 100mg

C: 120mg

D: 80mg

答案: B

55. 用药后有可能出现球后视神经炎的抗结核药物是

A: 链霉素

B: 吡嗪酰胺

C: 乙胺丁醇

D: 利福平

答案: C

56. 可用于了解肾小球滤过功能的是

A: 淀粉酶

B: 胆固醇

C: 尿素氮

D: 肌酐

答案: C

57. 服药期间进食高脂肪可促进吸收的药品是

- A: 硫酸亚铁
- B: 维生素
- C: 格列本脲
- D: 西咪替丁

答案：B

58. 麻醉药品处方印刷用纸是

- A: 淡橙色
- B: 淡红色
- C: 淡绿色
- D: 淡黄色

答案：B

59. 患者于 1 周前无诱因出现咳嗽，咳嗽为阵发性，痰少，呈白色黏液性，不易咳出，同时出现发热，体温多在夜间升高，38℃左右，无畏冷、寒战、胸痛、咳血等，于卫生院治疗后，未见好转，并有气喘、气促，活动后呼吸困难等症状。入院治疗诊断为：肺炎。

- A: 喹诺酮类抗菌药物有胃肠道反应，一般不用
- B: 青壮年和无基础疾病的 CAP 患者，常用青霉素和第一代头孢菌素
- C: CAP 常见病原体为肺炎链球菌、支原体、衣原体、流感嗜血杆菌和呼吸道病毒
- D: 老人、有基础疾病或者需要住院的 CAP 患者常用第二、三代头孢菌素、 β -内酰胺类等

答案：A

60. 遭遇蛇类咬伤，最先采取的应急措施是

- A: 就地取材将伤口捆扎
- B: 用布带等在伤口的近心端 5cm 处捆住

C: 就地取材在伤口的远心端捆扎

D: 用绳索等在伤口的近心端捆扎

答案: B

61. (2016 年真题) 美国食品药品监督管理局 (FDA) 根据药品对胎儿的危害，将妊娠用药分为 A、B、C、D、X 五个级别。

A: D 级

B: C 级

C: B 级

D: A 级

答案: C

62. 口服氯化铵用于解救的是 ()

A: 氯丙嗪中毒

B: 瘦肉精中毒

C: 苯丙胺中毒

D: 硝西泮中毒

答案: C

63. 选择药物的首要标准是药物治疗的

A: 经济性?

B: 有效性?

C: 安全性?

D: 方便性?

答案: B

64. 严重的先兆子痫首选

A: 呋塞米?

B: 赖诺普利？

C: 硫酸镁？

D: 硝苯地平？

答案：C

65. 患儿，男，5 个月，体重 9.0kg，平素健康，近日出现多汗、夜哭、易惊。体检：前囟平软，颅骨有“乒乓球”感，枕秃，肋骨串珠。人工喂养，尚未添加任何辅食，平素较少出门。

A: 坏血病

B: 佝偻病

C: 脑瘫

D: 智障

答案：B

66. 可引起粪便红细胞增多的是

A: 溶血性黄疸

B: 阻塞性黄疸

C: 急性胰腺炎

D: 细菌性痢疾

答案：D

67. 影响药酶代谢、增强药物作用而危及安全用药的是

A: 四环素+硫酸亚铁

B: 青霉素+丙磺舒

C: 西咪替丁+格列本脲

D: 多潘立酮+维生素 C

答案：C

68. 抗结核治疗中，主要针对细胞内有抗菌杀菌作用的是

- A: 异烟肼
- B: 吡嗪酰胺
- C: 乙胺丁醇
- D: 利福平

答案：B

69. 导致老年男性下尿路症状最常见的原因是

- A: 良性前列腺增生症
- B: 前列腺炎
- C: 肾盂肾炎
- D: 膀胱炎

答案：A

70. 患者，男，60 岁，呈典型的"面具脸"，"慌张步态"及"小字症"表现，确诊为帕金森病，患者同时患有闭角型青光眼，不宜选用的治疗帕金森病的药物是()

- A: 普拉克索
- B: 多奈哌齐
- C: 司来吉兰
- D: 左旋多巴

答案：D

71. 不稳定型心绞痛的药物治疗中，不属于抗凝治疗的药物为

- A: 肝素
- B: 替罗非班
- C: 低分子肝素
- D: 磺达肝癸钠

答案：B

72. 患者，女，52 岁，近年来发现手关节肿痛，且呈对称性，并有畸形，晨起时有僵硬现象持续 1 小时，疼痛难忍。经实验室检测示血沉 28mm / 1h，指尖关节的 X 线片显示受累关节有骨侵蚀特征。

- A: 骨性关节炎
- B: 软骨病
- C: 类风湿关节炎
- D: 骨质疏松症

答案：C

73. 某男性，53 岁，参加婚礼后 5 小时突发左脚第 1 跖趾关节剧痛，3 小时后局部出现红、肿、热、痛和活动困难。实验室检查示血尿酸为 500mol/L；足部 X 线示非特征性软组织肿胀。

- A: 类风湿性关节炎
- B: 假性痛风
- C: 风湿性关节炎
- D: 痛风

答案：D

74. 归属于用药记录的是

- A: 对药物治疗的建设性意见
- B: 同时合并应用的药品
- C: 主要实验室检查数据
- D: 主治医师签名

答案：B

75. 可促进肾小管对钠的重吸收，从而造成水钠潴留，易引起药源性高血压的药物是

- A: 重组人促红细胞生成素
- B: 阿司匹林
- C: 麻黄碱
- D: 地塞米松

答案：D

76. 静脉滴注给予万古霉素，滴注时间应该控制的时间是

- A: 4 小时以上
- B: 2 小时以上
- C: 1 小时以上
- D: 6 小时以上

答案：B

77. 适用于年轻、震颤明显患者的是

- A: 司来吉兰
- B: 恩托卡朋
- C: 左旋多巴
- D: 苯海索

答案：D

78. 属于 M 受体激动剂的是

- A: 美托洛尔
- B: 乙酰胆碱
- C: 福莫特罗
- D: 异丙托溴铵

答案：B

79. 头孢克洛片及胶囊应存放于()。

- A: 常温库
- B: 专用仓库
- C: 凉暗库
- D: 低温库

答案: C

80. 提供的药物信息和建议是否均来自受过专门药学培训的合格人员，是衡量互联网信息的

- A: 合理性
- B: 归因性
- C: 权威性
- D: 新颖性

答案: C

81. 下列叙述正确的是

- A: 有粒细胞根据其颗粒的嗜好可分为中性、嗜酸性、嗜碱性 3 种
- B: 淋巴细胞为有粒细胞
- C: 白细胞均是有粒细胞
- D: 单核细胞为有粒细胞

答案: A

82. 患者，男，58 岁，患 2 型糖尿病、高脂血症，给予二甲双胍肠溶片 0.5gtidpo、瑞格列奈片 1mg tidpo、阿托伐他汀片 20mg qdpo 等药物治疗。

- A: 阿托伐他汀钙片可在一天中任何固定时间给药
- B: 一旦出现低血糖症状，应立即口服葡萄糖水、糖块、巧克力等

C: 瑞格列奈片应于餐前服用

D: 二甲双胍肠溶片应于餐后服用

答案: D

83. 从事药学服务的药师应具备沟通能力。此项要求的重要性不是

A: 可提高公众对药师的认知度

B: 可杜绝投诉事件

C: 可使患者获得有关用药指导

D: 是药师实施药学服务的基础

答案: B

84. 当创伤应激严重时，由葡萄糖与脂肪提供 NPC 的比例是

A: 100kcal:1gN

B: 150kcal:1gN

C: NPC7:3

D: NPC5: 5

答案: D

85. 癫痫持续状态的首选治疗方法为

A: 乙琥胺口服

B: 苯巴比妥肌内注射

C: 苯妥英钠静脉注射

D: 地西泮静脉注射

答案: D

86. 慢性肝炎尤其是肝硬化时，肝功能检查结果可能显示的是

A: AST 上升幅度大

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

B: AST、ALT 同时上升

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/118054116045007022>