

2024 年广东省《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试真题题库及答案（）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 口服补液盐(氯化钠 3.5g、碳酸氢钠 2.5g 和葡萄糖 20g，加水至 1000ml)用于中度脱水腹泻病人，成人给予 3400ml。问给予体重 10kg 的患儿口服补液盐多少克，应配制成多少毫升

- A: 20.89, 800ml
- B: 24.79, 950ml
- C: 12.69, 485ml
- D: 22.19, 850ml

答案：C

2. 下列临床试验分期中，属于上市后药品临床再评价阶段的是

- A: IV 期临床试验
- B: I 期临床试验
- C: IIa 期临床试验
- D: III 期临床试验

答案：A

3. 对 5 岁以下儿童高热时紧急退热，应该选用的药品是

- A: 20% 安乃近溶液滴鼻
- B: 20% 阿司匹林溶液滴鼻
- C: 布洛芬混悬液
- D: 贝诺酯混悬液

答案：A

4. 抑制前列腺内双氢睾酮水平，达到降低雄激素水平，提高最高尿流率的是（）

- A: 特拉唑嗪
- B: 度他雄胺
- C: 索利那新
- D: 哌唑嗪

答案：B

5. （2017 年真题）下列关于烫伤救治措施的说送正确的是（）

- A: 可用清洁塑料薄膜覆盖创面,以防创面感染
- B: 创面及时外涂甲紫溶液预防感染
- C: I 度烫伤可冷敷后外涂烧伤膏
- D: 烫伤患者的镇痛镇静药物首选氯丙嗪

答案：C

6. 由医师和药师加强指导来减少

- A: 药师调配处方差错
- B: 护士执行医嘱差错
- C: 患者执行医嘱差错
- D: 医师处方差错

答案：C

7. 营养性巨幼细胞性贫血只要因为缺乏（）

- A: 维生素 C
- B: 叶酸和（或）维生素 B12
- C: 白细胞
- D: 鞣酸

答案：B

8. 患者，女，69 岁，体型偏胖，BMI30.1kg / m²，患者诉平卧时常有反酸、烧心、胸痛，偶感背痛半年，近 1 周出现夜间咳嗽、咽部有异物感。自用止咳糖浆无效。查体：咽红，声音嘶哑；双肺听诊未闻及干、湿性啰音，偶有哮鸣音。既往史：高血压病史 12 年，服用氨氯地平片 5mgqd，平素血压可控制在 140 / 85mmHg 左右；高脂血症病史 10 年，服用阿托伐他汀钙片 20mgqd。

- A: 布地奈德干粉吸入剂
- B: 奥美拉唑肠溶胶囊
- C: 多潘立酮片
- D: 单硝酸异山梨酯缓释片

答案：B

9. 紫外线加速一些药品的氧化、分解，归属于

- A: 湿度
- B: 日光
- C: 空气
- D: 温度

答案：B

10. 患者，男，50 岁，诊断为高血压、冠心病。医师处方，氨氯地平片 10mgpoqd；美托洛尔缓释片 47.5mgpoqd；贝那普利片 20mgpoqd；阿司匹林肠溶片 100mgpoqd；辛伐他汀片 40mgpoqd。

- A: 对乙酰氨基酚片
- B: 华法林片
- C: 双嘧达莫片
- D: 氯吡格雷片

答案：D

11. 可提示完全梗阻性黄疸的是

- A: $>342 \mu\text{mol/L}$
- B: $34.2 \mu\text{mol/L} \sim 171 \mu\text{mol/L}$
- C: $17.1 \mu\text{mol/L} \sim 34.2 \mu\text{mol/L}$
- D: $17.1 \mu\text{mol/L} \sim 171 \mu\text{mol/L}$

答案：A

12. (2019 年真题) 患者，女，56 岁，既往有高血压、高脂血症病史，长期服用依那普利片、阿托伐他汀钙片。现因上腹痛 2 周，伴黑便数日就诊。患者自诉 3 周前因膝关节痛，服用布洛芬，疼痛未缓解，自行加用萘普生。胃镜检查显示：胃窦小弯侧有一约 7mm 溃疡，幽门螺杆菌 (Hp) 阳性。肾功能未见异常。

- A: 埃索美拉唑 (艾司奥美拉唑) + 枸橼酸铋钾 + 阿莫西林 + 克拉霉素
- B: 埃索美拉唑 (艾司奥美拉唑) + 枸橼酸铋钾 + 阿莫西林 + 甲硝唑
- C: 埃索美拉唑 (艾司奥美拉唑) + 枸橼酸铋钾 + 克拉霉素 + 左氧氟沙星
- D: 埃索美拉唑 (艾司奥美拉唑) + 阿莫西林 + 克拉霉素

答案：B

13. 安神助眠的中成药中可能添加的化学药成分是

- A: 吲哚美辛
- B: 苯巴比妥
- C: 阿卡波糖
- D: 格列本脲

答案：B

14. 药源性疾病是由药物诱发的疾病，是指在预防、诊断、治疗或调节生理功能过程中出现与用药有关的人体功能异常或组织损伤所引起的一系列临床症状。引起药源性疾病的因素主要有患者因素和药物因素。

- A: 月经期服用常规剂量的避孕药和地西泮，其药理效应增强
- B: 假胆碱酯酶遗传性缺陷者应用琥珀胆碱出现呼吸暂停
- C: 肝硬化患者应用利多卡因，可引起严重中枢神经系统疾病
- D: 慢乙酰化者服用异烟肼后，其半衰期延长至 2~4.5h

答案：C

15. 消化性溃疡发病机制中的防御因子为（）

- A: 前列腺素
- B: 酒精
- C: 吸烟
- D: H. pylori 感染

答案：A

16. 穿孔（消化性溃疡并发症）

- A: 突发上腹剧痛，继而至全腹
- B: 疼痛性质改变，明显消瘦、贫血
- C: 规律性上腹痛
- D: 餐后加重的上腹胀痛，呕吐物有隔夜食物

答案：A

17. 具有退热、缓解头痛和全身痛的解热镇痛药是

- A: 伪麻黄碱
- B: 阿司匹林
- C: 菠萝蛋白酶

D: 颠茄浸膏片

答案: B

18. 影响肝药酶活性，药物疗效降低

A: 胰岛素

B: 呋塞米

C: 氨茶碱

D: 地西洋

答案: D

19. (2016 年真题) 患者，男，60 岁，呈典型的“面具脸”，“慌张步态”及“小字症”表现，确诊为帕金森病，患者同时患有闭角型青光眼，不宜选用的治疗帕金森病的药物是 ()。

A: 普拉克索

B: 多奈哌齐

C: 司来吉兰

D: 左旋多巴

答案: D

20. (2021 年真题) 吉法酯片治疗消化性溃疡，正确的用药方法是 ()

A: 睡前服用

B: 清晨空腹整片吞服，并保持上身直立至少 30 分钟

C: 餐后半小时服用

D: 餐前 1/小时嚼碎服用

答案: C

21. 有关药学服务的叙述，正确的是

A: 药学服务的社会属性仅限服务于治疗性药物

B: 用药周期长的慢性病患者属于药学服务的重要人群

C: 药学服务只涉及更高层次的临床实践，不包括处方调剂、药品检验、药品供应

D: 药学服务涵盖了患者用药相关的全部需求，但不包括对公众的健康教育

答案：B

22. 氟西汀与血浆蛋白的结合力强，使同服的华法林或洋地黄毒苷游离型浓度超出安全范围归属

A: 药动学相互作用

B: 药理作用

C: 药物制剂因素

D: 药物的使用

答案：A

23. 抗癫痫药应从小剂量起始给药，滴定增量，长期规律用药。成年癫痫患者药物治疗时

A: 丙戊酸钠

B: 苯妥英钠

C: 卡马西平

D: 拉莫三嗪

答案：D

24. 患者，女，40岁，既往有风湿性心脏病病史，近2年来出现劳累性呼吸困难，1天前因受凉出现发热、咳嗽，咳粉红色泡沫样痰，不能平卧。查体：半卧位，口唇发绀，两肺大量水泡音及哮鸣音。

A: 硝普钠

B: 阿替洛尔

C: 卡托普利

D: 毛花苷丙

答案: D

25. 弥漫性青铜色色素沉着的是

A: 氟尿嘧啶

B: 白消安

C: 博来霉素

D: 柔红霉素

答案: B

26. 成年人血清中高密度脂蛋白胆固醇含量是

A: 1.03~2.07mmol / L

B: 0.56~1.70mmol / L

C: 3.1~5.7mmol / L

D: 2.1~3.1mmol / L

答案: A

27. 能显示药师的文献评价能力和技巧的是

A: 形成答案并以口头形式提供给询问者

B: 随访了解效果，并建立档案

C: 对查阅的资料进行评价、分析和整理

D: 对问题进行确定并归类

答案: C

28. 房颤合并支气管哮喘患者，适用于控制心室率的药物为

A: 利伐沙班

B: 地尔硫

C: 硝苯地平

D: 胺碘酮

答案: B

29. 治疗发热，成人服对乙酰氨基酚，每隔 4~6 小时重复用药 1 次；1 日用量不得超过

A: 4.0g

B: 2.5g

C: 4.5g

D: 3.0g

答案: A

30. 每四小时用药一次的外文规范缩写是

A: q4h

B: qn

C: qod

D: tid

答案: A

31. 褪黑素受体激动剂

A: 阿戈美拉汀

B: 米氮平

C: 唑吡坦

D: 艾司唑仑

答案: A

32. 通过重整患者的医嘱或药疗方案，评估药物治疗的有效性、安全性和经济性，核查患者的用药依从性，属于

- A: 药物治疗管理
- B: 处方审核
- C: 药学干预
- D: 药物利用研究和评价

答案：A

33. 药物警戒信号通过评价后，将事前检出的信号归类，提示有潜在的风险，需要继续密切监测的信号属于

- A: 确认的信号
- B: 驳倒的信号
- C: 尚不确定的信号
- D: 部分确认的信号

答案：C

34. 日服 180mg 元素铁是依据铁剂吸收率为

- A: 0.4
- B: 10%~30%
- C: 10%~20%
- D: 0.3

答案：D

35. 心律失常患者用药治疗期间应该禁用的是

- A: 烟
- B: 咖啡
- C: 浓茶
- D: 酒

答案：C

36. 用于治疗痴呆的胆碱酯酶抑制剂不包括

- A: 多奈哌齐
- B: 美金刚
- C: 卡巴拉汀
- D: 加兰他敏

答案: B

37. 香豆素类杀鼠药中毒的特效解毒剂是 ()

- A: 青霉胺
- B: 乙酰胺
- C: 维生素 K1
- D: 纳洛酮

答案: C

38. “记录患者用药问题、药学干预内容、药学监测计划”的技能是

- A: 药品警戒技能
- B: 自主学习能力
- C: 药历书写技能
- D: 沟通技能

答案: C

39. 急性细菌性扁桃体炎患者常表现为 ()

- A: 嗜酸性粒细胞增多
- B: 中性粒细胞增多
- C: 红细胞增多
- D: 血红蛋白减少

答案: B

40. 白天咳嗽宜选用的药品是

- A: 羧甲司坦
- B: 可待因
- C: 右美沙芬
- D: 苯丙哌林

答案：D

41. 发挥局部作用的栓剂是

- A: 吲哚美辛栓
- B: 盐酸克伦特罗栓
- C: 甘油栓
- D: 阿司匹林栓

答案：C

42. 患者女 57 岁 BM312 诊断为 2 型糖尿病经生活方式干预, 未能有效控制血糖, 肝肾功能未见异常, 初始治疗首选的药物是 ()

- A: 阿卡波糖
- B: 格列齐特
- C: 吡格列酮
- D: 二甲双胍

答案：D

43. 目前推荐的绝经期激素补充治疗的窗口期是 ()

- A: 绝经后 5 年之内
- B: 绝经后 5 年之内或大于 60 岁
- C: 绝经后 10 年之内或 60 岁以前
- D: 大于 60 岁

答案：C

44. 患者，男，38 岁，身高 175cm，体重 70kg。3 日前自觉全身肌肉酸痛、头疼，轻微咳嗽，自服抗感冒药物效果不佳，近 1 日觉畏寒，发热，体温 37.7℃，遂来本院就诊。检查结果：患者神清，查咽喉部红肿，扁桃腺（-），双肺呼吸音清，心脏听诊无异常，腹检无异常。血象 WBC 正常，其他正常。诊断为：上呼吸道感染（感冒）。

- A: 阿昔洛韦
- B: 布洛芬
- C: 醋酸锌
- D: 葡萄糖酸辛含片

答案：B

45. 以下哪项不是药物流产的适应证（）

- A: 妊娠≤49 日
- B: 本人自愿、年龄>40 岁的健康女性
- C: B 超确诊为宫内妊娠
- D: 多次人工流产术史

答案：B

46. 可用于不明毒物、与其形成腐蚀性较小的化合物的是

- A: 1%氯化钠溶液
- B: 3%~5%鞣酸溶液
- C: 药用炭混悬液
- D: 鸡蛋白

答案：A

47. （2015 年真题）非甾体抗炎药引起的典型药源性疾病是（）。

- A: 胃肠类疾病

B: 血液系统疾病

C: 神经系统疾病

D: 肝病

答案：A

48. 患者，女，71 岁，2 型糖尿病史 10 年。化验结果糖化血红蛋白 (HbA) 9.2%，空腹血糖 10.5mmol/L，餐后血糖 15.5mmol/L。目前服用二甲双胍片 0.5gtidpo，格列美脲片 2mgtidpo，罗格列酮片 2mgbidpo，甲钴胺片 0.5mgtidpo，羟苯磺酸钙胶囊 250mgbidpo。

A: 普通胰岛素餐前 30min，皮下注射，qd

B: 门冬胰岛素餐前 30~60min，皮下注射，tid

C: 低精蛋白锌胰岛素餐前 30min，皮下注射

D: 甘精胰岛素睡前 30min，皮下注射，qd

答案：D

49. 急性肠炎可出现 ()。

A: 鲜血便

B: 稀糊便

C: 脓血便

D: 脓状便

答案：B

50. 以下所列“WHO 公布的有关艾滋病传播途径”中，不正确的是

A: 蚊虫叮咬

B: 吸毒

C: 性行为

D: 母婴传播

答案：A

51. 失神发作首选

- A: 丙戊酸钠
- B: 苯妥英钠
- C: 卡马西平
- D: 拉莫三嗪

答案：A

52. 已知对乙酰氨基酚的成人剂量为一次 400mg。一个体重为 10kg 的 11 个月大的婴儿感冒发热，按体表面积计算该患儿的处方剂量应为

- A: 100mg
- B: 50mg
- C: 90mg
- D: 75mg

答案：A

53. 用于循证医学评价证据强弱分级的是()

- A: CLHD 公式
- B: NCEMERP 标准
- C: CoChrAnE 分级
- D: CoCkroft-GAut 公式

答案：C

54. 视疲劳所呈现的显著临床特征是

- A: 视物时症状加重
- B: 复视
- C: 泪液减少
- D: 眼睑沉重、痉挛

答案：A

55. 患者，女，35 岁，临床诊断为高甘油三酯血症，用非诺贝特微粒型胶囊调节血脂治疗，下列给药正确的用法与用量为

- A: 0.5gqd
- B: 0.5gtid
- C: 0.2gqd
- D: 0.1gtid

答案：C

56. 就餐前 15~30 分钟给药的是

- A: 瑞格列奈
- B: 阿卡波糖
- C: 胰岛素
- D: 二甲双胍

答案：C

57. 下列药物使用方式，正确的是

- A: 酵母片在餐后整片用水送服
- B: 滴眼液打开使用后，可以连续使用 3 个月
- C: 硝酸甘油片在心绞痛发作的紧急情况下嚼碎用水送服
- D: 维生素 C 泡腾片用 150ml 温开水浸泡溶解后服用

答案：D

58. 有助于药师明确被问询问题的咨询服务方法步骤是

- A: 对文献进行评价、分析和整理
- B: 形成答案并以口头形式提供给询问者
- C: 确立有效的检索方法、查阅文献

D: 对问题进行确定并归类

答案: A

59. 高三酰甘油血症，首选的治疗药物是

A: ω -3 脂肪酸

B: 他汀类

C: 烟酸

D: 贝特类

答案: D

60. 用药错误 I 级（9 级）的标准

A: 客观环境或条件可能引发差错

B: 发生差错但未发给患者，或已发给患者但未使用

C: 差错导致患者死亡

D: 差错导致患者永久性伤害

答案: C

61. 患者，女，60 岁，现病史：近日因摔倒而致左腕骨骨折。骨科处理；因背痛加重接受口服止痛治疗。骨密度已 L1~L4 椎体 T 值-2. 7SD，BMD749(mg / cm²)；股骨颈 T 值-2. 2SD，BMD602(mg / cm²)。医生诊断为：绝经后骨质疏松症。

A: 绝经期超过 2 年以上的妇女可以应用

B: 患有血栓栓塞性疾病者禁用

C: 肝、肾功能不全者可应用

D: 妊娠期妇女禁用

答案: C

62. 1 类手术切口应用第三代头孢菌素，应评判为

- A: 有禁忌证用药
- B: 联合用药不适宜
- C: 过度治疗用药
- D: 无适应证用药

答案：D

63. 妊娠后 3~5 周服用容易导致胎儿出现肢体、耳、内脏畸形的药物是

- A: 氯霉素
- B: 四环素
- C: 叶酸拮抗剂
- D: 沙利度胺

答案：D

64. (2016 年真题) 患者，女，64 岁，患 2 型糖尿病，高脂血症，给予二甲双胍肠溶片 0.5gtidpo，瑞格列奈片 1mg tidpo，阿托伐他汀钙片 20mg qdpo 等药物治疗。

- A: 根据血糖水平调整低精蛋白锌胰岛素用量
- B: 每 3-5 天调整 1 次
- C: 每次调整 1-4 单位
- D: 开启使用中的低精蛋白锌胰岛素必须放入冷藏保存

答案：D

65. 应用华法林抗凝过程中，出现严重出血时，可应用急救的药物是

- A: 维生素 K1
- B: 维生素 K4
- C: 维生素 K3
- D: 维生素 B1

答案：A

66. 帕金森病患者跌倒的最常见原因为

- A: 体位性低血压
- B: 不宁腿综合征
- C: 姿势反射障碍
- D: 神经精神障碍

答案：C

67. 用于中度疼痛和癌性疼痛宜选用的药物是

- A: 吗啡
- B: 可待因
- C: 多奈哌齐
- D: 阿司匹林

答案：B

68. 患者，女性，46岁。半年来食欲减退、易疲劳，查体发现多处淋巴结肿大，尤以颈部淋巴结为甚。骨髓抽取及切片、放射线检查（X线、淋巴摄影）后诊断为恶性淋巴瘤。

- A: 环磷酰胺
- B: 奥沙利铂
- C: 他莫昔芬
- D: 卡莫司汀

答案：A

69. 下列止咳药中，夜间咳嗽患者宜选用的是

- A: 喷托维林
- B: 可待因

C: 氨溴索

D: 右美沙芬

答案: D

70. 对氟乙酰胺中毒进行解毒的药物是()。

A: 阿托品

B: 毒扁豆碱

C: 乙酰胺

D: 卡马西平

答案: C

71. 蒽环类抗生素容易引起急、慢性心脏毒性，可导致左心室功能受损、心衰等，可以采用何种药物预防（）

A: 辅酶 Q

B: 普萘洛尔

C: 阿托品

D: 硝苯地平

答案: A

72. 属于癌症第二阶梯止痛药物的是

A: 对乙酰氨基酚

B: 二氢可待因

C: 美沙酮

D: 谷维素

答案: B

73. 患者，男，69 岁，BMI27.8kg/m²，既往有骨性关节炎病史。近期爬山后，再次出现膝关节疼痛，患者热敷后疼痛未缓解，前来咨询如何选用“止痛药”。

- A: 姑息治疗
- B: 对症治疗
- C: 对因治疗
- D: 缓和治疗

答案：B

74. 能增强华法林的抗凝作用的食物是

- A: 维生素 K
- B: 韭菜
- C: 芒果
- D: 地瓜

答案：C

75. 服药时饮茶可降低疗效的是

- A: 维生素 A
- B: 格列本脲
- C: 硫酸亚铁
- D: 西咪替丁

答案：C

76. (2018 年真题) 药师应掌握处方中常用的外文缩写，“每晚”用药的缩写是 ()

- A: qid
- B: prn
- C: qn

D: qd

答案: C

77. 少数人用后可出现视力降低和辨色困难

A: 布洛芬

B: 硝酸甘油

C: 西咪替丁

D: 金刚烷胺

答案: A

78. 患者，男，35 岁。于午饭后即开始出现胃部疼痛，胀满食少，后感觉脐周硬结、闷痛、拒按，于 1 日无改善情况下，前来医院就诊。诊断结果：因蛋白质进食过多而导致的继发性消化不良。

A: 复方消化酶制剂送服时不宜用热水

B: 多潘立酮可能引起心脏相关风险

C: 胰酶口服时应嚼碎服用

D: 助消化药与吸附剂合用须间隔 2~3h

答案: C

79. 以下所列药物中，使用不当可能导致新生儿出现溶血的是

A: 阿莫西林

B: 维生素 C

C: 吲哚美辛

D: 苯妥英钠

答案: C

80. 可用于治疗高氨血症的药物是

A: 开塞露

B: 硫酸镁

C: 番泻叶

D: 乳果糖

答案：D

81. 在患者入院、转科和出院时,药师通过核对新开的医嘱和已有的医嘱,核对患者目前的整体用药情况,避免漏用药物、重复用药。剂量错误和不良药物相互作用等,以保证患者用药安全的药学服务过程,属于
()

A: 药物利用评价

B: 处方审核

C: 药物重整

D: 药学干预

答案：C

82. 从事药学服务的药师应具备较好的投诉应对能力。正确妥善地应对投诉的重要意义是

A: 提高用药顺应性

B: 使患者获得有关用药的指导

C: 警惕与防范用药错误

D: 增进患者对药师工作的信任

答案：D

83. H

A: 法莫替丁

B: 铝碳酸镁

C: 埃索美拉唑

D: 多潘立酮

答案：A

84. 用于治疗氰化物中毒的解救药物是

- A: 亚硝酸钠
- B: 盐酸烯丙吗啡
- C: 谷胱甘肽
- D: 双解磷

答案：A

85. 下尿路感染的最突出表现是（）

- A: 发热
- B: 伴明显腰痛
- C: 肾区叩击痛
- D: 膀胱刺激征

答案：D

86. 为防止血管扩张、促进毒物吸收。应用 1%氯化钠溶液洗胃应该避免的是

- A: 溶液事先加热
- B: 减小注入压力
- C: 最多不超过 500ml
- D: 多次反复进行冲洗

答案：A

87. 可了解工作效果，并可进一步完善之后工作的咨询服务方法步骤是

- A: 形成答案并以口头形式提供给询问者
- B: 随访工作效果，并建立档案

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 对问题进行确定并归类

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/118126007045007022>