

2024 年天津市普通高校专科升本科大学医学综合模拟试卷

一、单选题

1、Brudzinski征阳性的表现是（）

- (A)趾背伸四趾屈曲
- (B)颈部抵抗增强
- (C)股四头肌收缩
- (D)伸膝受阻伴疼痛
- (E)髋关节及膝关节屈曲

2、手术患者术前 8~12 小时禁食、4 小时禁水的目的是（）

- (A)防止麻醉时呕吐引起窒息
- (B)防止术后腹胀
- (C)减少术后感染
- (D)防止术后伤口裂开

3、成人心肺复苏时，胸外按压与人工呼吸的比例是【】

- (A) 30：2
- (B) 30：1
- (C) 30：3
- (D) 30：4
- (E) 30：5

4、阻塞性通气功能障碍患者肺功能改变的特点是（）

- (A)一秒率降低
- (B)通气/血流比例失调
- (C)气速指数 >1.0

(D)残气量减少

(E)肺活量增加

5、抗利尿激素促进水重吸收的部位是【】

(A) 肾小球

(B) 近曲小管和髓袢粗段

(C) 远曲小管和集合管

(D) 髓袢细段升降支

(E) 肾小囊

6、下列与心指数直接相关的参数是【】

(A) 体重

(B) 年龄

(C) 体表面积

(D) 身高

(E) 能量

7、三尖瓣所在的位置是（）

(A)左房室口

(B)肺动脉口

(C)主动脉口

(D)冠状窦口

(E)右房室口

8、女，30岁。寒战、发热4天。查体：右侧肋脊点、肋腰点压痛阳性。首选的辅助检查是（）

(A)肾功能

(B)腹部 B 超

(C)粪便常规

(D)尿常规

(E)结肠镜

9、符合诊断急性呼吸窘迫综合征指标的是 ()

(A) $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 \leq 200 \text{mmHg}$

(B)一般吸氧治疗无效

(C)胸片显示有广泛点、片状阴影

(D)双肺可闻及湿啰音

(E)呼吸频率逐渐加快

10、下列关于丹毒的描述，正确的是 ()

(A)好发于下肢与面部

(B)感染多发生于皮下

(C)金黄色葡萄球菌是常见病原菌

(D)切开引流是治疗的关键

11、不属于机体内环境的体液是 ()

(A)淋巴液

(B)组织液

(C)血浆

(D)脑脊液

(E)细胞内液

12、关于术后早期活动，不正确的选项为 ()

(A)延缓切口愈合

(B)减少下肢静脉血栓形成

(C)减少肺部并发症

(D)改善血液循环

(E)减少腹胀及尿潴留

13、具有横突肋凹的椎骨是（）

(A)骶骨

(B)尾骨

(C)胸椎

(D)颈椎

(E)腰椎

14、动作电位跳跃式传导的部位是（）

(A)有髓纤维

(B)无髓纤维

(C)终板膜

(D)缝隙连接

(E)肌节

15、呼吸过程中肺内压最低值出现的时期是（）

(A)呼气末

(B)呼气中期

(C)吸气初

(D)吸气中期

(E)吸气末

16、大量胸腔积液患者不易出现的体征是（）

- (A)患侧闻及胸膜摩擦音
- (B)气管向健侧移位
- (C)患侧语音震颤减弱
- (D)患侧胸廓扩张度减弱
- (E)患侧肋间隙增宽

17、女，80岁。头晕、心悸就诊。心电图如下。最可能的诊断是【】 (A) 窦性心动过缓

- (B) 二度 I 型房室传导阻滞
- (C) 三度房室传导阻滞
- (D) 二度 II 型房室传导阻滞
- (E) 窦房传导阻滞

18、根据烧伤早期补液的原则，第一个 8 小时内，应该输入第一天总液体量的【】

- (A) 1 / 6
- (B) 1 / 3
- (C) 1 / 4
- (D) 1 / 5
- (E) 1 / 2

19、男，50岁。体重 70kg。该患者体内的细胞外液量约为 ()

- (A)16000mL
- (B)12000mL
- (C)14000mL
- (D)20000mL
- (E)18000mL

20、无尿的定义是 ()

- (A)24小时尿量少于 100mL
- (B)12小时尿量少于 200mL
- (C)24小时尿量少于 500mL
- (D)每小时尿量少于 50mL
- (E)每小时尿量少于 17mL

21、引起左锁骨上窝淋巴结肿大的常见病症是（）

- (A)牙髓炎
- (B)气管炎
- (C)结肠癌
- (D)食管炎
- (E)食管癌

22、手术中识别输卵管的标志是（）

- (A)输卵管漏斗
- (B)输卵管峡
- (C)输卵管伞
- (D)输卵管壶腹
- (E)输卵管腹腔口

23、腹部移动性浊音不正确的检查方法是（）

- (A)变换体位后继续原方向叩诊
- (B)叩诊音变浊音后改变体位
- (C)自腹中部沿脐水平面叩诊
- (D)变换体位时板指不应移动
- (E)受检者首先需采取平卧位

24、男，62岁。急性心肌梗死第2天，排便中突发呼吸困难。查体：BP90/70mmHg，P120次/分，呼吸急促，双肺满布湿啰音及哮鸣音。最可能的诊断是()

(A)乳头肌功能不全

(B)支气管哮喘

(C)急性心脏压塞

(D)急性左心衰竭

25、某患者因上腹痛就诊。查体：按压右肋弓与腹直肌外缘交界处，患者深呼气因疼痛而受限。最可能的诊断是【】

(A)十二指肠溃疡

(B)下尿路感染

(C)急性胆囊炎

(D)急性胰腺炎

(E)胆管结石

26、烧伤患者早期抗休克应先补充()

(A)电解质溶液

(B)血浆

(C)5%葡萄糖溶液

(D)10%葡萄糖溶液

(E)全血

27、男，31岁。既往无心脏病史，上班途中突发心悸、胸闷。心电图示QRS波形态与时限均正常，P波为逆行性，频率220次/分。该患者的诊断为()

(A)室上性心动过速

(B)窦性心动过速

(C)快速心房颤动

(D)室性心动过速

(E)快速心房扑动

28、接受有效刺激后可产生动作电位的细胞是（）

(A)脂肪细胞

(B)部分腺细胞

(C)红细胞

(D)肌细胞

(E)神经细胞

29、主动脉瓣关闭不全心脏杂音的特点是【】

(A) 胸骨左缘第2肋间最明显

(B) 向下颌及左上肢传导

(C) 为递减性叹气样杂音

(D) 多在舒张晚期出现

(E) 左侧卧位时听诊最清楚

30、关于术后早期活动，不正确的选项为（）

(A)延缓切口愈合

(B)减少下肢静脉血栓形成

(C)减少肺部并发症

(D)改善血液循环

(E)减少腹胀及尿潴留

31、开口于上鼻道的鼻旁窦是【】

(A) 上颌窦

- (B) 额窦
- (C) 蝶窦
- (D) 筛窦后群
- (E) 筛窦前中群

32、最常见于老年人额头部的灰黑色斑块是 ()

- (A) 乳头状疣
- (B) 黑色素瘤
- (C) 老年斑
- (D) 黑痣
- (E) 皮肤癌

33、肺门的所在部位是 ()

- (A) 肺的膈面
- (B) 肺的纵隔面
- (C) 肺的胸肋面
- (D) 肺底
- (E) 肺尖的内面

34、某胸痛患者的心电图示：II、III、aVF导联ST段抬高，T波倒置，病理Q波形成。

最可能的诊断是 ()

- (A) 肥厚型梗阻性心肌病
- (B) 急性心包炎
- (C) 急性心肌梗死
- (D) 变异型心绞痛
- (E) 急性肺栓塞

、某患者腹壁曲张静脉分布于腹壁两侧，脐上和脐下静脉血流方向均向上。最可能的原因是【】

- (A) 肝静脉血栓
- (B) 胃底静脉开放
- (C) 脾肾静脉分流
- (D) 下腔静脉阻塞
- (E) 门静脉癌栓

36、不属于肝门静脉属支的是（）

- (A)肝静脉
- (B)肠系膜上静脉
- (C)胆囊静脉
- (D)脾静脉
- (E)附脐静脉

37、属于升主动脉的分支是【】

- (A) 右锁骨下动脉
- (B) 左颈总动脉
- (C) 右颈总动脉
- (D) 左锁骨下动脉
- (E) 冠状动脉

38、增加冠脉血流量最主要的因素是（）

- (A)交感神经兴奋
- (B)迷走神经兴奋
- (C)血管紧张素 II 分泌增多

(E)血管升压素分泌增多

39、红细胞双凹圆碟形的形状改变可影响其功能特性的是 ()

(A)对促红细胞生成素的敏感性

(B)叠连的速度

(C)渗透脆性

(D)表面抗原的类型

(E)可塑性变形能力

40、自身调节情况下对刺激产生反应的类型是【】

(A) 应激反应

(B) 旁分泌反应

(C) 自分泌反应

(D) 应急反应

(E) 适应性反应

二、多选题

41、属于检查肾小球功能的实验室项目有 ()

(A)血肌酐

(B)尿渗透压

(C)内生肌酐清除率

(D)血尿素氮

42、胃和小肠共有的运动形式有 ()

(A)分节运动

(B)紧张性收缩

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/118127040142006131>