专业《执业药师之西药学专业二》考试题库，word格式可自由下载编辑，附完整答案！

2024年安徽省定远县《执业药师之西药学专业二》考试题库带答案（综合卷）

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.异烟肼的作用特点是

A：对细胞内外的结核杆菌均有效

B：只对细胞外的结核杆菌有效

C：对大多数革兰阴性菌有效

D：结核杆菌不易产生耐药性

答案：A

2.属于GLP-1受体激动剂的是()。

A：二甲双胍

B：艾塞那肽

C：阿卡波糖

D：那格列奈

答案：B

3.下列药物可用于治疗小细胞肺癌首选的是

A：奥沙利铂

B：依托泊苷

C：替尼泊苷

D：长春新碱

答案：B

4.丙磺舒可影响赛洛多辛的代谢，延长赛洛多辛在体内存在时间，这是因为丙磺舒抑制

A：UGT287

B：血浆蛋白

C：p一糖蛋白

D：CYP3A4

答案：A

5.与避孕药同时服用，不会导致避孕失败的药物是

A：环孢素

B：苯巴比妥

C：四环素

D：利福平

答案：A

6.既可用于消化道肿瘤又可用于卵巢癌的药物是

A：阿糖胞苷

B：氟尿嘧啶

C：甲氨蝶呤

D：利妥昔单抗

答案：B

7.用于流脑，阻碍细菌二氢叶酸合成酶的药物是

A：磺胺嘧啶

B：拉米夫定

C：利巴韦林

D：氟康唑

答案：A

8.（2019年真题）患者，女，55岁，2型糖尿病史5年，心律失常病史2年，长期使用胺碘酮治疗。关于胺碘酮的不良反应的说法，错误的是（）

A：可致肺毒性，早期一般表现为咳嗽，但病情发展时可出现发热和呼吸困难，表现为急性肺炎

B：可致甲状腺功能减退，较为常见，发病隐匿

C：可掩盖低血糖症状（如心悸、手抖），但低血糖的其他症状（如出汗）仍然存在

D：可致甲状腺功能亢进，同时会加重心房颤动或出现快速室性心律失常

答案：C

9.用于真菌感染的药物是

A：拉米夫定

B：磺胺嘧啶

C：利巴韦林

D：氟康唑

答案：D

10.心律失常发生的机制是

A：潜在起搏点搏动频率加快

B：心肌兴奋过度导致窦房结搏动异常

C：心肌兴奋冲动形成异常或传导异常

D：心肌兴奋过度导致异常

答案：C

11.夫西地酸最常见的不良反应是

A: 静脉炎

B: 黄疸

C: 腹部不适

D: 血小板减少

答案：A

12.下列药物中，能促进食物消化的是()

A: 胶体果胶铋

B: 兰索拉唑

C: 乳酶生

D: 雷尼替丁

答案：C

13.维生素 A 的适应症不包括

A: 夜盲症

B: 甲状旁腺功能不全引起的低钙血症

C: 干眼病

D: 角膜软化

答案：B

14.需尽快建立一个肠道正常菌群，宜用

A: 双歧三联活菌胶囊

B: 酪酸菌

C: 双歧杆菌

D: 地芬诺酯

答案：A

15.罗格列酮的降糖作用机制是

A: 提高靶组织对胰岛素的敏感性

B: 竞争性抑制a葡萄糖苷酶

C: 刺激胰岛β细胞释放胰岛素

D: 直接补充胰岛素

答案：A

16.通过阻断血管紧张素Ⅱ受体而逆转心肌肥厚，减轻心力衰竭的药物是

A: 美托洛尔

B: 地高辛

C: 氨力农

D: 氯沙坦

答案：D

17.风湿性心脏病重度二尖瓣狭窄宜

A: 快速洋地黄化

B: 停用洋地黄

C: 常规剂量的洋地黄

D: 不宜使用洋地黄

答案：D

18.用于治疗妊娠期妇女子痫和先兆子痫的首选药物是

A: 依那普利

B: 丙戊酸钠

C: 普萘洛尔

D: 硫酸镁

答案：D

19.关于使用依折麦布的说法，错误的是

A: 剂量超过 10mg / d 对降低 LDL 水平无增效作用

B: 成人剂量一次 10mg。一日 1 次

C: 需空腹服用

D: 可单独服用或与他汀类联合应用

答案：C

20.关于万古霉素，描述错误的是

A: 作用机制是阻碍细菌细胞壁的合成

B: 属于杀菌剂

C: 肾功能不全者无需调整剂量

D: 可用于对甲氧西林耐药的葡萄球菌引起的感染

答案：C

21.抑制 H+，K+-ATP 酶活性的药物是

A: 奥美拉唑

B: 雷尼替丁

C: 氢氧化铝

D: 哌仑西平

答案：A

22.可增高甲氨蝶呤血浆浓度的药物不包括

A: 碳酸氢钠

B: 氯霉素

C: 磺胺类

D: 水杨酸类

答案：A

23.锥体外系疾病、亨廷顿病者禁用的药物是

A：吗氯贝胺

B：氟西汀

C：文拉法辛

D：吡拉西坦

答案：D

24.（2015年真题）属于选择性5-羟色胺再摄取抑制剂的是（）。

A：文拉法辛

B：氟西汀

C：吗氯贝胺

D：阿米替林

答案：B

25.（2021年真题）属于阳离子型表面活性剂，可用于治疗咽喉炎的药物是（）e

A：羟甲唑啉

B：西地碘

C：氨溴索

D：度米芬

答案：D

26.盐酸多柔比星属于

A：抗代谢类抗肿瘤药物

B：烷化剂

C：生物碱类

D：抗肿瘤抗生素类

答案：D

27.作用于对青霉素敏感的革兰阳性菌以及部分革兰阴性杆菌的药物是()

A：阿莫西林

B：克拉维酸

C：亚胺培南

D：氨曲南

答案：A

28.可使前者作用加强或延长的是

A：氯丙嗪

B：他莫昔芬

C：维生素C

D：红霉素

答案：A

29.弥散性血管内凝血早期可选用()

A：叶酸

B：维生素K

C：尿激酶

D：肝素

答案：D

30.为克服服药初期的类早孕反应，双炔失碳酯肠溶片成分中增加了

A：去氧孕烯

B：甲羟孕酮和炔雌醇

C：维生素B6

D：炔雌醇

答案：C

31.阿托品引起便秘的原因是()

A：抑制排便反射

B：抑制胃肠道腺体分泌

C：使括约肌兴奋

D：松弛肠道平滑肌

答案：D

32.属于外周多巴胺受体阻断剂，直接阻断胃肠道多巴胺D

A：多潘立酮

B：甲氧氯普胺

C：莫沙必利

D：昂丹司琼

答案：A

33.可明显降低血浆甘油三酯的药物是()

A：抗氧化剂

B：胆汁酸螯合剂

C：苯氧酸类

D：贝特类

答案：D

34.糖皮质激素在临床上一般不用于

A：支气管哮喘

B：全身性红斑狼疮

C：真菌感染

D：中毒性感染

答案：C

35.可用于治疗乙型肝炎病毒感染的药物是

A：更昔洛韦

B：阿昔洛韦

C：金刚烷胺

D：恩替卡韦

答案：D

36.属于第四代头孢菌素的药物是

A：头孢氨苄

B：头孢哌酮

C：头孢吡肟

D：头孢拉定

答案：C

37.需慎用司坦唑醇的是()

A：高血压患者

B：肝、肾病患者

C：低血压患者

D：代谢性酸中毒患者

答案：B

38.雌激素的适应证是

A：痛经

B：功能性子宫出血

C：先兆性流产

D：消耗性疾病

答案：B

39.（2020年真题）患者，女，68岁。近期有急性心肌梗死病史。目前正在服用阿司匹林、氯吡格雷、普伐他汀和美托洛尔。近日因偶尔出现胃灼热不适感而就医，该患者应避免使用的药物是

A：法莫替丁

B：雷尼替丁

C：雷贝拉唑

D：奥美拉唑

答案：D

40.地西泮用于

A：神经源性尿崩症

B：慢性脑功能不全

C：早期帕金森病

D：特发性震颤

答案：D

41.可用于中、重度细菌性感染，半衰期长，可以一日1次给药的是

A：厄他培南

B：西司他丁

C：亚胺培南

D：美罗培南

答案：A

42.（2019年真题）长期大量使用可致泌尿系统尿酸盐、半胱氨酸盐或草酸盐结石的维生素是（）

A：维生素

B: 维生素 A

C: 维生素 B6

D: 维生素 B2

答案：A

43.糖尿病患者低血糖时，可导致患者不适甚至生命危险，也是血糖达标的主要障碍。为了预防低血糖事件的发生，应用胰岛素或促胰岛素分泌剂时，需要注意的事项不包括

A: 有可能误餐时应提前做好准备

B: 个体化给药，直接给予所需治疗剂量

C: 患者应定时定量进餐

D: 谨慎地调整剂量

答案：B

44.甲氨蝶呤主要用于

A: 慢性粒细胞性白血病

B: 室管膜瘤

C: 儿童急性白血病

D: 神经母细胞瘤

答案：C

45.可抑制蛋白质合成全过程，具繁殖期和静止期杀菌作用的药物是

A: 环丙沙星

B: 替加环素

C: 多黏菌素

D: 庆大霉素

答案：D

46.有关可乐定的叙述，错误的是

A：可乐定可用于治疗中度高血压

B：可乐定可用于治疗高血压危象

C：可乐定是中枢性降压药

D：可乐定可用于治疗重度高血压

答案：D

47.鲑降钙素对骨质疏松症进行治疗期间，为防继发性甲状旁腺功能亢进需要补充

A：铁剂

B：双膦酸盐类骨吸收抑制剂

C：钙剂

D：维生素 D

答案：C

48.应用高剂量的 β2 受体激动剂可导致的严重典型不良反应是

A：低钙血症

B：高钙血症

C：低钾血症

D：低镁血症

答案：C

49.降低心脏前、后负荷，对急性心肌梗死及高血压所致的慢性心力衰竭效果较好()

A：多巴酚丁胺

B：氨力农

C：地高辛

D：硝普钠

答案：D

50.与吲达帕胺合用，可导致心律失常的是

A：拟交感药

B：多巴胺

C：考来烯胺

D：胺碘酮

答案：D

51.患者，男，42 岁，胃癌根治术后，病理检查结果为胃窦低分化腺癌，肝肾功能正常。化疗方案为奥沙利铂+氟尿嘧啶+亚叶酸钙。

A：直肠癌的首选药之一

B：与氯化钠和碱性溶液(特别是氟尿嘧啶)之间存在配伍禁忌

C：其神经系统毒性与剂量大小无关

D：应给予预防性或治疗性的止吐用药

答案：C

52.（2017 年真题）眼部病毒感染宜选用（）

A：托吡卡胺滴眼剂

B：碘苷滴眼剂

C：氯霉素滴眼剂

D：拉坦前列素滴眼剂

答案：B

53.组胺 H

A：肠激惹综合征

B：失眠

C：消化性溃疡

D: 变态反应性疾病

答案：C

54.唯一被批准用于临床的选择性肝固醇吸收抑制剂是()

A: 小剂量阿托伐他汀

B: 大剂量阿托伐他汀

C: 依折麦布

D: 小剂量氟伐他汀

答案：C

55.抗高血压药物不包括

A: 血管紧张素转化酶抑制药

B: 肾素抑制药

C: 血管收缩药

D: α、β 受体阻断药

答案：C

56.烟酸缺乏时发生

A: 成人佝偻病

B: 脚气病

C: 夜盲症

D: 糙皮病

答案：D

57.关于 NSAIDS 类药物所致不良反应的说法，正确的是()

A: 选择性 COX-2 抑制剂导致胃及十二指肠溃疡和出血的风险高于非选择性 NSAIDS 类药物

B: 非选择性 NSAIDS 类药物导致的心血管风险高于选择性 COX-2 抑制剂

C: NSAIDs 类药物所致的胃肠道不良反应中，以萎缩性胃炎最为常见

D: 非选择性 NSAIDS 类药物可导致胃及十二指肠溃疡和出血等风险

答案：D

58.孟鲁司特的作用机制是

A: 抑制磷酸二酯酶

B: 阻断 α 受体

C: 阻断白三烯受体

D: 阻断 M 受体

答案：C

59.（2017 年真题）属于抗雄性激素的肿瘤药是（）

A: 氟他胺

B: 他莫昔芬

C: 阿那曲唑

D: 炔雌醇

答案：A

60.甲氧苄啶与磺胺甲

A: 促进分布

B: 促进吸收

C: 抗菌谱不相似

D: 双重阻断敏感菌的叶酸代谢

答案：D

61.以下所列药物中，能促进小肠对维生素 D 的吸收是

A：硫糖铝

B：矿物油

C：考来烯胺

D：雌激素

答案：D

62.禁用于妊娠妇女和小儿的药物是()

A：氨基糖苷类

B：头孢菌素类

C：大环内酯类

D：氟喹诺酮类

答案：D

63.（2019年真题）竞争性抑制胃肠道的α-葡萄糖苷酶活性减慢肠道内多糖、寡糖或双糖的降解从而延缓单糖的吸收，可降低餐后血糖的药物是（）

A：格列吡嗪

B：二甲双胍

C：吡格列酮

D：伏格列波糖

答案：D

64.关于治疗功能性胃肠病药的叙述，不正确的是

A：匹维溴铵宜空腹吞服

B：曲美布汀可使胃排空功能的减弱得到改善

C：匹维溴铵可用于对症治疗与胆道功能紊乱有关的疼痛

D：匹维溴铵为钡灌肠做准备时，应于检查前3日开始用药

答案：A

65.环孢素合用可使赛洛多辛血药浓度升高，这是因为环孢素抑制

A：p一糖蛋白

B：UGT287

C：血浆蛋白

D：CYP3A4

答案：A

66.属于α-葡萄糖甘酶抑制剂的是

A：阿卡波糖

B：西格列汀

C：二甲双胍

D：罗格列酮

答案：A

67.属于第一代头孢菌素口服制剂的是()。

A：头孢拉定

B：头孢克肟

C：头孢吡肟

D：头孢克洛

答案：A

68.秋水仙碱的注意事项错误的是

A：不可用于长期痛风的预防

B：尽量避免静脉注射和长期口服给药

C：肾功能下降时可造成蓄积

D：可致可逆性维生素B

答案：D

69.治疗普通型奈瑟球菌脑膜炎是()

A: 磺胺嘧啶

B: 复方磺胺甲噁唑

C: 柳氮磺吡啶

D: 磺胺米隆

答案：A

70.氟喹诺酮类

A: 禁用于 18 岁以下儿童及青少年

B: 禁用于胆道阻塞患者

C: 禁用于 8 岁以下儿童

D: 禁用于早产儿、新生儿

答案：A

71.适用于重症哮喘、慢性反复发作哮喘、激素依赖性哮喘的是

A: 沙丁胺醇

B: 孟鲁司特

C: 色甘酸钠

D: 吸入性糖皮质激素

答案：D

72.（2018 年真题）耐甲氧西林金黄色葡萄球菌（MRSA）高检出率的医疗机构,进行人工瓣膜置换术时,为预防 MRSA 感染,可选用（）

A: 氨曲南

B: 青霉素 G

C: 万古霉素

D: 头孢唑林

答案：C

73.轻度阻滞Na+通道的药物是

A：胺碘酮

B：普萘洛尔

C：利多卡因

D：普鲁卡因胺

答案：C

74.须用专属性极强的解毒剂右雷佐生保护心肌的药物是

A：环磷酰胺

B：吉非替尼

C：多柔比星

D：曲妥珠单抗

答案：C

75.广泛用于各种吸虫药的治疗，还能用于绦虫病的药物是

A：吡喹酮

B：乙胺嘧啶

C：甲硝唑

D：三苯双脒

答案：A

76.调血脂药中，升高HDL-ch作用最强，且具有降低脂蛋白a作用的是

A：烟酸

B：苯扎贝特

C：阿昔莫司

D: 依折麦布

答案：A

77.硝酸酯类药物扩张血管是通过

A: 阻滞 Ca2+通道

B: 产生一氧化氮，使细胞内环磷酸鸟苷升高

C: 促进前列环素的生成

D: 直接作用于血管平滑肌

答案：B

78.患者，男，57 岁，身高 175cm，体重 87kg，诊断为 2 型糖尿病。医生给予二甲双胍片口服，500mg，bid。

A: 随餐服用

B: 餐后半小时

C: 餐后 2 小时

D: 餐前半小时

答案：A

79.（2015 年真题）属于 α-葡萄糖甘酶抑制剂的是（）。

A: 阿卡波糖

B: 二甲双胍

C: 西格列汀

D: 罗格列酮

答案：A

80.属于噻唑烷二酮类胰岛素增敏剂的是

A: 沙格列汀

B: 瑞格列奈

C：格列美脲

D：罗格列酮

答案：D

81.影响毛细血管通透性的促凝血药是

A：卡巴克络

B：鱼精蛋白

C：血凝酶

D：维生素 K

答案：A

82.硫脲类药物的不良反应不包括()

A：过敏反应

B：诱发甲亢

C：粒细胞减少

D：发热

答案：B

83.（2016 年真题）属于多巴胺受体阻断剂的止吐药是

A：维生素 B6

B：托烷司琼

C：阿瑞吡坦

D：甲氧氯普胺

答案：D

84.（2021年真题）患者，男，48岁，入院接受结肠癌手术，术后因合并肺部感染，静脉给予头孢哌酮舒巴坦钠治疗6天，观察到手术切口和静脉输液穿刺部位有少量渗血，实验室检验结果显示凝血功能异常。针对此症状，宜选用的治疗药物是（）

A：维生素B12

B：维生素K1

C：重组链激酶

D：重组人促红素

答案：B

85.（2017年真题）主要降低总胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇的调血脂药是（）

A：依折麦布

B：瑞舒伐他汀

C：阿昔莫司

D：利血平

答案：B

86.患者男性，29岁，阴茎头部出现下疳两个月就诊。有不洁性接触史。临床诊断为梅毒。立即给予青霉素注射治疗，十分钟后患者出现胸闷，全身瘙痒、面部发麻，查体：血压85/60mmHg，脉率110次/分。

A：给予糖皮质激素

B：减少药物剂量

C：给予肾上腺素

D：吸氧，给予普萘洛尔

答案：C

87.四环素类的主要作用靶点是

A: 核糖体的 50S 亚基

B: 细胞壁丙氨酰丙氨酸

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/125031304123012033