

2024 贵州省从江县《执业药师之西药学专业二》考试必刷 200 题真题加答案

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 少数病人首次用药出现首剂效应的是

- A: 氨氯地平
- B: 卡托普利
- C: 哌唑嗪
- D: 地高辛

答案：C

2. 属于促动力药的是()

- A: 胶体果胶铋
- B: 奥美拉唑
- C: 胃蛋白酶
- D: 莫沙必利

答案：D

3. 为预防甲氨蝶呤所致的肾毒性，在化疗期间，除大量水化和利尿外，还应同时给予的尿路保护剂是

- A: 氯喹酮
- B: 坦洛新
- C: 美司钠
- D: 呋塞米

答案：C

4. 有明显的镇痛作用，可用于肿瘤骨转移所致的高钙血症和痛性骨质疏松症治疗的药物是

- A: 雷洛昔芬
- B: 阿仑膦酸钠
- C: 降钙素
- D: 骨化三醇

答案：C

5. 目前治疗肺孢子菌病首选的药物是

- A: 复方磺胺甲噁唑
- B: 特比萘芬
- C: 氟曲南
- D: 卡泊芬净

答案：A

6. 大剂量糖皮质激素冲击疗法用于

- A: 中毒性感染和休克
- B: 顽固性支气管哮喘
- C: 变态反应性疾病
- D: 湿疹

答案：A

7. 防止耐药现象的发生，持续用药须有 12h 以上间歇期

- A: 硝酸甘油
- B: 氨氯地平
- C: 依那普利
- D: 哌唑嗪

答案：A

8. 属于长效糖皮质激素的是

- A: 尼尔雌醇
- B: 地塞米松
- C: 泼尼松龙
- D: 甲羟孕酮

答案: B

9. 长期服用呋塞米易发生的不良反应是 ()

- A: 高氯血症
- B: 低钾血症
- C: 低尿酸血症
- D: 高钠血症

答案: B

10. 皮肤用糖皮质激素禁忌不正确的是

- A: 不能用于有皮肤萎缩的部位
- B: 超强效激素宜大面积使用
- C: 不能用于局部有明显细菌感染的疾病
- D: 不能用于皮肤溃疡的部位

答案: B

11. 变异型心绞痛不宜选用的是

- A: 硝酸甘油
- B: 普萘洛尔
- C: 胍乙啶
- D: 硝苯地平

答案: B

12. 对革兰阳性菌作用弱，而对革兰阴性菌作用强的药物是

- A: 第四代头孢菌素
- B: 第二代头孢菌素
- C: 第一代头孢菌素
- D: 第三代头孢菌素

答案：D

13. 蒙脱石散是

- A: 抗动力药
- B: 抗分泌药
- C: 微生态制剂
- D: 吸附剂

答案：D

14. 高血压伴消化性溃疡患者不宜选用的药物是()

- A: 哌唑嗪
- B: 利血平
- C: 卡托普利
- D: 普萘洛尔

答案：B

15. (2018 年真题) 肾结石患者禁用的药物是 ()

- A: 苯溴马隆
- B: 非布索坦
- C: 别嘌醇
- D: 秋水仙碱

答案：A

16. 属于白三烯受体阻断剂的是

- A: 孟鲁司特
- B: 右美沙芬
- C: 奥关拉唑
- D: 乙酰半胱氨酸

答案：A

17. 治疗心绞痛急性发作的首选药物是()

- A: 维拉帕米
- B: 地尔硫
- C: 硝酸甘油
- D: 普萘洛尔

答案：C

18. 长期使用可引起维生素 K 缺乏的药物是

- A: 二甲双胍
- B: 阿司匹林
- C: 华法林
- D: 头孢哌酮

答案：D

19. 治疗慢性心力衰竭，ACEI 和()联合有协同作用。

- A: 留钾利尿剂
- B: 噻嗪类利尿剂
- C: β 受体阻断剂
- D: 人促红素

答案：C

20. (2017 年真题) 可杀灭疥虫的药物是 ()

- A: 林旦
- B: 阿苯达唑
- C: 维 A 酸
- D: 甲苯达唑

答案: A

21. 高血压伴有肾功能不全者最好选用

- A: 卡托普利
- B: 氢氯噻嗪
- C: 利血平
- D: 胍乙啶

答案: A

22. 可抑制花生四烯酸转化为白三烯 ()

- A: 维 A 酸
- B: 阿达帕林
- C: 异维 A 酸
- D: 过氧苯甲酰

答案: B

23. 容易引起球后神经炎的抗结核药物是

- A: 利福平
- B: 链霉素
- C: 异烟肼
- D: 乙胺丁醇

答案: D

24. 罗格列酮的降糖作用机制是

- A: 提高靶组织对胰岛素的敏感性
- B: 竞争性抑制 α 葡萄糖苷酶
- C: 直接补充胰岛素
- D: 刺激胰岛 β 细胞释放胰岛素

答案：A

25. 全身用药毒性大，仅局部用的抗病毒药是()

- A: 金刚烷胺
- B: 阿昔洛韦
- C: 碘苷
- D: 阿糖腺苷

答案：C

26. 患者，女，56 岁，血清总胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇异常，初诊医师建议首先改变生活方式(控制饮食，增强运动)。一个月后复查血脂水平仍未达标，医师处方辛伐他汀片 20mg / d 治疗。

- A: 20mg
- B: 40mg
- C: 100mg
- D: 80mg

答案：D

27. 关于多柔比星治疗时使用右雷佐生的叙述，不正确的是

- A: 与多柔比星同时给药
- B: 使用右雷佐生的目的是保护心肌
- C: 右雷佐生水解后能与多柔比星螯合

D: 右雷佐生剂量应为多柔比星剂量的 10 倍

答案: A

28. 军团菌和支原体混合感染宜首选的抗菌药物是()。

A: 利奈唑胺

B: 头孢曲松

C: 罗红霉素

D: 头孢他啶

答案: C

29. 关于容积性泻药的叙述，错误的是

A: 服用容积性泻剂的同时应摄入足够水分

B: 促进钙和铁的吸收

C: 可能会影响华法林的吸收

D: 主要用于轻度便秘患者的治疗

答案: B

30. 毒性大，不能注射用的抗真菌药是

A: 咪康唑

B: 灰黄霉素

C: 制霉菌素

D: 克霉唑

答案: C

31. 多柔比星的异构体，适应证同多柔比星，疗效相等或略高，但对心脏毒性及脱发都明显低于多柔比星的药物是

A: 柔红霉素

B: 多柔比星

C: 表柔比星

D: 吡柔比星

答案: C

32. 服用他汀类药物需要监测肌毒性，该临床指标是

A: 肌酸激酶

B: 尿淀粉酶

C: 碱性磷酸酶

D: 乳酸脱氢酶

答案: A

33. 维持和调节腹膜透析液渗透压的主要物质的是

A: 脂肪乳

B: 葡萄糖

C: 果糖

D: 维生素

答案: B

34. 属于 β 受体激动剂的非强心苷类的正性肌力药是()

A: 依那普利

B: 地高辛

C: 多巴酚丁胺

D: 米力农

答案: C

35. 有关阿莫西林特点的说法正确的是()

A: 耐酸、耐酶

B: 口服吸收差，生物利用度小

C: 对耐药金黄色葡萄球菌有效

D: 广谱青霉素，对革兰阴性菌也有效

答案：D

36. 氟喹诺酮类

A: 禁用于早产儿、新生儿

B: 禁用于胆道阻塞患者

C: 禁用于 18 岁以下儿童及青少年

D: 禁用于 8 岁以下儿童

答案：C

37. 用于治疗慢性功能性便秘，也可用于高氨血症的治疗的是

A: 酚酞

B: 聚乙二醇 4000

C: 乳果糖

D: 开塞露

答案：C

38. 在胃黏膜表面形成屏障的药物是

A: 枸橼酸铋钾

B: 奥美拉唑

C: 谷丙胺

D: 法莫替丁

答案：A

39. 以下药物治疗高血压时，给药次数为一日 2 次给药的是

A: 非洛地平缓释片

B: 硝苯地平控释片

C: 硝苯地平缓释片

D: 氨氯地平片

答案: C

40. 下述药物中属于减鼻充血药的是

A: 盐酸麻黄碱溶剂

B: 色甘酸钠溶剂

C: 链霉素溶剂

D: 复方薄荷樟脑溶剂

答案: A

41. 患者女性，30 岁。以肺结核收治入院，给予抗结核治疗，链霉素肌肉注射后，10 分钟后患者出现头晕、耳鸣、乏力、呼吸困难等症状，继而出现意识模糊、晕倒、血压下降、心律失常等症状。

A: 葡萄糖

B: 胺碘酮

C: 利多卡因

D: 葡萄糖酸钙

答案: D

42. (2017 年真题) 可能导致牙龈出血的药物是 ()

A: 普萘洛尔

B: 拉西地平

C: 依诺肝素

D: 普伐他汀

答案: C

43. 内分泌平衡障碍及精神神经失调所致的失眠

- A: 谷维素
- B: 氯美扎酮
- C: 夸西泮
- D: 氟西泮

答案：A

44. 四环素类首选用于()

- A: 鼠疫、土拉菌病
- B: 布鲁菌病
- C: 钩端螺旋体病
- D: 伤寒、副伤寒

答案：B

45. 患者，女，40 岁。癫痫病史 3 年，近来常觉头痛，测量血压为 170 / 110mmHg。

- A: 尼莫地平
- B: 氨氯地平
- C: 硝苯地平
- D: 维拉帕米

答案：A

46. 下列药物除哪项外都属于钙拮抗剂()

- A: 维拉帕米
- B: 硝苯地平
- C: 溴苄胺
- D: 地尔硫

答案：C

47. 维生素 K 参与合成的凝血因子不包括

- A: 凝血因子 II
- B: 凝血因子 VII
- C: 凝血因子 VIII
- D: 凝血因子 IX

答案：C

48. 阿司匹林抗血栓形成的机制是

- A: 使环氧酶失活，减少 TXA₂ 生成，产生抗血栓形成作用
- B: 直接对抗血小板聚集
- C: 降低凝血酶活性
- D: 激活抗凝血酶

答案：A

49. （2019 年真题）长期使用可引起听力减退、肾功能下降的抗结核药物是（）

- A: 利福平
- B: 吡嗪酰胺
- C: 链霉素
- D: 乙胺丁醇

答案：C

50. 患者，男性，23 岁。患者 2 年前出现咳嗽，低热，气喘，胸闷隐痛，盗汗。经 X 线诊断为“肺结核”，以抗结核药物治疗。

- A: 吡嗪酰胺
- B: 链霉素
- C: 青霉素
- D: 乙胺丁醇

答案：D

51. 长期频繁使用可致眼部真菌感染的药物是

- A: 四环素可的松
- B: 氯霉素
- C: 更昔洛韦
- D: 利巴韦林

答案：A

52. 阿卡波糖是

- A: 中效类胰岛素
- B: α -葡萄糖苷酶抑制剂
- C: 磺酰脲类
- D: 长效类胰岛素

答案：B

53. 可导致新生儿药物性黄疸的是

- A: 磺胺嘧啶
- B: 头孢他啶
- C: 阿莫西林
- D: 林可霉素

答案：A

54. 碘化物的主要不良反应是

- A: 粒细胞下降
- B: 丙硫氧嘧啶
- C: 血管神经性水肿
- D: 甲状腺素

答案：C

55. 普萘洛尔

- A: 使甲状腺组织退化、血管减少、腺体缩小变韧
- B: 对甲状腺激素代谢无作用，仅能改善甲状腺功能亢进症的症状
- C: 抑制甲状腺过氧化物酶，从而抑制甲状腺激素的生物合成
- D: 使甲状腺腺泡上皮萎缩、减少分泌

答案：B

56. 异甘草酸镁作为保护肝细胞药的作用机制是

- A: 降低血清丙氨酸氨基转移酶（ALT）水平
- B: 作为细胞膜的重要组分，特异性地与肝细胞膜结合，促进肝细胞膜再生，协调磷脂和细胞膜功能，降低脂肪浸润，增强细胞膜的防御能力，起到稳定、保护、修复细胞膜的作用
- C: 促进胆汁分泌，减轻胆汁淤滞
- D: 通过各种机制发挥抗炎作用，有类似激素的作用

答案：D

57. 对浅部真菌和深部真菌均有抗菌作用的是（）

- A: 庆大霉素
- B: 阿昔洛韦
- C: 红霉素
- D: 咪康唑

答案：D

58. 对抗胰岛素降血糖作用的药物是

- A: 口服降血糖药
- B: 磺胺类药

C: 甲状腺素

D: 蛋白同化激素

答案：C

59. 皮肤念珠菌病可选用()

A: 酮康唑

B: 林旦霜

C: 维 A 酸

D: 阿达帕林

答案：A

60. (2019 年真题) 沙库巴曲缬沙坦钠片说明书的部分内容节选如下，请结合问题作答。

A: 轻、中度肾功能不全患者可使用沙库巴曲缬沙坦

B: 沙库巴曲缬沙坦不能与阿替洛尔、吲哚美辛或西咪替丁合用

C: 轻、中度肝功能损害患者可使用沙库巴曲缬沙坦

D: 从 ACEI 转换为沙库巴曲缬沙坦时，应停用 ACEI 36 小时后方可转换

答案：B

61. 肝功能不全者应禁用氯化铵，是因为氯化铵

A: 可降低血氨浓度，诱发肝性脑病

B: 可增加血氨浓度，诱发肝性脑病

C: 可升高门脉压力，诱发出血

D: 可降低门脉压力，诱发出血

答案：B

62. 下述药物中不可用于治疗疥疮的是

A: 硫黄软膏

- B: 林旦霜
- C: 苯甲酸苄酯
- D: 过氧苯甲酰

答案：D

63. (2016 年真题) 哮喘急性发作首选的治疗药物是

- A: 磷酸二酯酶抑制剂
- B: 短效 β_2 受体激动剂
- C: 吸入性糖皮质激素
- D: 白三烯受体阻断剂

答案：B

64. 患者，男性，45 岁。有支气管哮喘病史 20 余年。因阵发性室上性心动过速入院治疗，出院后又多次发作，应选用预防反复发作的治疗药物是

- A: 利多卡因
- B: 维拉帕米
- C: 普萘洛尔
- D: 美西律

答案：B

65. 2 岁以下儿童腹泻，禁用的药品是

- A: 双歧三联活菌胶囊
- B: 地衣芽孢杆菌胶囊
- C: 盐酸洛哌丁胺胶囊
- D: 双八面体蒙脱石散

答案：C

66. 与其他袪利尿药相比，不良反应更大，因此临床使用受到限制，主要用作对磺酰胺类药物过敏或不耐受患者替代药物的是

- A: 托拉塞米
- B: 依他尼酸
- C: 布美他尼
- D: 呋塞米

答案：B

67. 丙硫氧嘧啶最严重的不良反应是

- A: 胃肠道反应
- B: 关节痛
- C: 头痛
- D: 粒细胞缺乏症

答案：D

68. 可引起血钾、血钙降低，血尿素氮、肌酐及尿酸升高的是

- A: 氢氯噻嗪
- B: 依他尼酸
- C: 乙酰唑胺
- D: 醛固酮

答案：A

69. (2021 年真题) 患者，女，27 岁，孕 34 周。诊断为轻度便秘，宜选用的药物是 ()

- A: 乳果糖
- B: 普芦卡必利
- C: 蓖麻油
- D: 硫酸镁

答案：A

70. (2017 年真题) 属于 α -葡萄糖苷酶抑制剂的药物是 ()

- A: 利拉鲁肽
- B: 那格列奈
- C: 伏格列波糖
- D: 阿格列汀

答案：C

71. (2015 年真题) 患者，男，56 岁。有高血压病史 4 年。体检：血压 156/96mmHg，无主动脉狭窄。医师处方依那普利片控制血压。该患者用药过程中可能发生的典型不良反应是 ()。

- A: 光过敏
- B: 干咳
- C: 水肿
- D: 低血糖

答案：B

72. 维生素 C 缺乏时引起

- A: 成人佝偻病
- B: 脚气病
- C: 角膜软化症
- D: 坏血病

答案：D

73. 低剂量用药时对中枢和外周多巴胺 D₂ 受体有拮抗作用，而高剂量用药时有较弱的 5-HT₂ 受体阻断作用，可用于化疗所致恶心呕吐的是

- A: 劳拉西泮

B: 帕洛诺司琼

C: 甲氧氯普胺

D: 氯丙嗪

答案: C

74. 肝癌晚期患者疼痛剧烈，可以选用的镇痛药物是

A: 阿司匹林

B: 布桂嗪

C: 哌替啶

D: 可待因

答案: C

75. (2017 年真题) 口角炎可以使用的治疗药物是 ()

A: 维生素 A

B: 维生素 B1

C: 维生素 B2

D: 维生素 D

答案: C

76. 可降低极低密度脂蛋白胆固醇和三酰甘油，主要升高高密度脂蛋白胆固醇的调血脂药是

A: 瑞舒伐他汀

B: 利血平

C: 阿昔莫司

D: 依折麦布

答案: C

77. 窄谱抗菌药是

- A: 异烟肼
- B: 磺胺嘧啶
- C: 氯霉素
- D: 头孢菌素

答案：A

78. 抗菌谱较广，还可用于治疗自身免疫性疾病

- A: 阿霉素
- B: 环磷酰胺
- C: 丝裂霉素
- D: 放线菌素 D

答案：B

79. 禁用于妊娠期高血压疾病者的是

- A: 氯化钾
- B: 氯化钙
- C: 硫酸镁
- D: 氯化钠

答案：D

80. 使用时可引起单抗药综合征的是

- A: 阿那曲唑
- B: 氟他胺
- C: 他莫昔芬
- D: 曲妥珠单抗

答案：D

81. 用于肾移植的排异反应和类风湿关节炎的是()

- A: 环孢素
- B: 环磷酰胺
- C: 甲泼尼龙
- D: 硫唑嘌呤

答案：D

82. 治疗厌氧菌引起的严重感染最适合的是

- A: 克林霉素
- B: 万古霉素
- C: 克拉霉素
- D: 红霉素

答案：A

83. 关于维生素的使用，正确的是

- A: 长期服用维生素 C 应随访监测暗适应试验
- B: 大量应用维生素 E 可致血清胆固醇及三酰甘油降低
- C: 肌肉注射维生素 B1 需做皮肤敏感试验，静脉注射不需要
- D: 维生素 C 以空腹服用为宜

答案：D

84. 下述不属于质子泵抑制剂的是

- A: 法莫替丁
- B: 泮托拉唑
- C: 雷贝拉唑
- D: 奥美拉唑

答案：A

85. 属于头孢二代的是

- A: 拉氧头孢
- B: 头孢曲松
- C: 头孢呋辛
- D: 头孢唑林

答案：C

86. 白女士，74 岁，以“间断性腹胀 1 月余”主诉入院。患者 1 个月前无明显诱因出现腹胀，既往有乙肝病史 14 年。诊断：肝硬化失代偿期；腹水（大量）。医嘱：

- A: 高钠血症
- B: 高钾血症
- C: 充血性心力衰竭
- D: 预防急性肾衰竭

答案：A

87. 黄体酮属于

- A: 雌激素
- B: 孕激素
- C: 雄性激素
- D: 皮质激素

答案：B

88. 属于硝基呋喃类的是()

- A: 磺胺甲噁唑
- B: 夫西地酸
- C: 呋喃妥因
- D: 甲硝唑

专业《执业药师之西药学专业二》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

答案：C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/125103110114012033>