

2023-24 年海南省东方市《执业药师之西药学综合知识与技能》考试题库带解析答案

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 运动员禁用药物中， β 受体阻断剂产生的危害是
- A: 能使伤口进一步恶化、导致呼吸困难和药物依赖
 - B: 长期使用后突然停药，则会引发心跳过速、心肌梗死，乃至突然死亡
 - C: 诱发高血压、冠心病、心肌梗死、脑动脉硬化和脑血管破裂，以及引起肝癌、肾癌等疾患
 - D: 易造成人体严重脱水、肾衰竭

答案：B

2. 维生素 B12 注射剂每次肌内注射 50~200 μg ，每支规格标识为 0.1mg，药师应告知患者每次注射
- A: 1~2 支
 - B: 4~6 支
 - C: 1/2~2 支
 - D: 2~6 支

答案：C

3. 审核发现严重滥用药品的处方，药师应该
- A: 拒绝调配此处方，并依照有关规定报告
 - B: 依照此处方调配药品、发出药品
 - C: 修改、调配此处方并发出药品
 - D: 拒绝调配此处方

答案：A

4. (2015 年真题) 伴有高血压的患者应慎用的是 () 。

- A: 氯苯那敏
- B: 阿司匹林
- C: 含伪麻黄碱的复方制剂
- D: 对乙酰氨基酚

答案：C

5. 药物信息按照其最初来源通常分为三级，即以期刊发表的原创性论著为主的一级信息源、引文和摘要服务为主的二级信息源以及参考书和数据库为主的三级信息源。

- A: 很方便地对所需要的信息资料进行筛选
- B: 查阅时需要利用所提供参考文献去验证
- C: 内容广泛、使用方便
- D: 提供的信息最新

答案：D

6. 会干扰乙醇代谢过程导致双硫仑样反应, 用药期间不宜饮酒的药物是 ()

- A: 阿奇霉素
- B: 甲硝唑
- C: 阿司匹林
- D: 对乙酰氨基酚

答案：B

7. 治疗痔疮的常用内服药是

- A: 地奥司明

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

- B: 联苯苄唑乳膏
- C: 九华膏
- D: 聚甲酚磺醛栓

答案: A

8. 不可震荡的是
- A: 甘露醇注射剂
 - B: 降钙鼻喷雾剂
 - C: 乙醚
 - D: 重组人促红素

答案: D

9. 患者，男，58岁，高血压病史5年；吸烟史40年，日均40支。2小时前出现左侧肢体无力，并逐渐加重，不能站立；家属发现其说话迟钝、言语含混，左侧鼻唇沟变浅；意识清楚。急送医院急诊，BP170/100mmHg；血常规基本正常；头颅CT检查未见高密度病灶。诊断为脑梗死。

- A: 阿司匹林肠溶片 100mgqdpo
- B: 华法林片 3mgqdpo
- C: 氯吡格雷片 75mgqdpo
- D: 阿司匹林肠溶片 300mgqdpo

答案: A

10. (2018年真题) 患者，女，34岁，因易疲劳、体重增加、反应迟钝、肌肉痉挛就诊，化验结果显示TSH增高，FT3、FT4减低，临床诊断为甲状腺功能减退。使用左甲状腺素钠100 μ gqd治疗。药师对该患者的用药指导，正确的是()

- A: 早餐前半小时，顿服

- B: 晚餐后顿服
- C: 睡前顿服
- D: 早餐后半小时, 顿服

答案: A

11. 患者, 女, 69 岁, 近一个月出现入睡困难, 白天有头昏、疲倦等不适感, 尝试非药物治疗无改善, 推荐的药物治疗方案是()

- A: 唑吡坦 5mgpoqn
- B: 地西洋 5mgpoqn
- C: 氯硝西洋 2mgpoqn
- D: 苯巴比妥 100mgpoqn

答案: A

12. 下列复方药物中, 可使高血压患者血压升高的是

- A: 复方酚咖伪麻胶囊
- B: 银菊清解片
- C: 速克感冒胶囊
- D: 速感宁胶囊

答案: A

13. 不宜咽或吞下所用药品; 用药后不宜马上吃食或饮水的是

- A: 舌下片
- B: 阴道栓剂
- C: 含漱剂
- D: 咀嚼片

答案: C

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

14. 填写具体；如患卵巢囊肿合并肺部感染注射头孢曲松引起不良反应，应填写肺部感染

- A: ADR / ADE 过程描述
- B: 用药起止时间
- C: 用药原因
- D: 不良反应 / 事件的结果

答案：C

15. 可使驾驶员视物模糊或辨色困难的药物是

- A: 苯噻啶
- B: 氨苯蝶啶
- C: 阿托品
- D: 西咪替丁

答案：C

16. 合并闭角型青光眼的前列腺增生患者不宜选用的药物是()

- A: 托特罗定
- B: 坦索罗辛
- C: 非那雄胺
- D: 多沙唑嗪

答案：A

17. (2018 年真题) 患者, 女, 25 岁, 产后 2 个月, 哺乳期, 因尿路感染需要给予抗感染治疗, 首选的药物是 ()

- A: 头孢呋辛
- B: 左氧氟沙星
- C: 多西环素
- D: 阿米卡星

答案：A

18. 下列临床试验分期中，属于上市后药品临床再评价阶段的是

- A: III期临床试验
- B: IIa 期临床试验
- C: IV期临床试验
- D: I 期临床试验

答案：C

19. 患儿，男，5个月，体重9.0kg，平素健康，近日出现多汗、夜哭、易惊。体检：前囟平软，颅骨有“乒乓球”感，枕秃，肋骨串珠。人工喂养，尚未添加任何辅食，平素较少出门。

- A: 4000IU
- B: 400IU
- C: 6000IU
- D: 10000IU

答案：A

20. 患者，男，59岁，哮喘病史8年，近日因急性脑梗死就诊住院治疗2周后出院。对于该患者脑血管病的二级预防，宜选用的抗血小板药物是()

- A: 阿司匹林
- B: 对乙酰氨基酚
- C: 华法林
- D: 氯吡格雷

答案：D

21. 磷化锌经口中中毒的典型临床表现是

- A: 腐蚀性口腔炎
- B: 口内有金属味
- C: 抽搐
- D: 呕吐物有蒜臭味

答案：D

22. 患者，女，55岁，因“反复发作胸骨后疼痛2年，伴反酸、胃灼热、间断积食”来诊，食管测压提示食管下段括约肌压力小于6mmHg，结合胃镜检查结果，临床诊断为胃食管反流病。医师处方：奥美拉唑20mgbid 强化抑酸治疗。

- A: 控制体重
- B: 戒烟酒
- C: 避免高脂饮食
- D: 餐中多饮水

答案：D

23. 患者，男，72岁，以“间断发热、纳差、精神抑郁半年，再发高热1天”为主诉入院，既往体健，无高血压、糖尿病、冠心病史。入院时查体：T36.9℃，P88次/分，R22次/分，BP112/77mmHg，可触及颈部、锁骨上、腋下多部位浅表淋巴结肿大。经实验室检查、影像学检查，确诊为非霍奇金淋巴瘤。

- A: 右雷佐生
- B: 苯海拉明
- C: 美司钠
- D: 维生素B6

答案：B

24. 稳定型心绞痛的临床表现不包括

- A: 针刺或刀扎样锐性痛
- B: 压迫、发闷
- C: 胸痛
- D: 持续 3~5 分钟

答案：A

25. 隔日一次用药的外文规范缩写的是

- A: q. n
- B: q. h
- C: q. o. d
- D: q. d

答案：C

26. 下列治疗痤疮的药物中，患者在治疗期间及治疗结束后 1 个月应避免献血的是：

- A: 异维 A 酸
- B: 红霉素
- C: 克林霉素
- D: 过氧甲苯酰

答案：A

27. 瘦肉精（克仑特罗）中毒时，可采用的解毒药是

- A: 普萘洛尔
- B: 氟马西尼
- C: 乙酰半胱氨酸
- D: 乙酰胺

答案：A

28. 患者女，6岁，因发热体温 38.6℃、头痛、鼻塞、流清涕咳嗽、无痰就诊。实验室检查：白细胞、中性粒细胞计正常。临床诊断为普通感冒。

- A: 头孢克洛干混悬剂
- B: 感冒清热冲剂
- C: 葡萄糖酸锌口服液
- D: 维生素 C 片

答案：A

29. 酮康唑、氟康唑、伊曲康唑可导致

- A: 药源性神经损害
- B: 药源性血损害
- C: 药源性肾损害
- D: 药源性肝损害

答案：D

30. 头痛，伴颈部僵硬、恶心、发热和全身痛，可能有

- A: 脑肿瘤
- B: 脑血管意外
- C: 动脉瘤
- D: 脑膜炎

答案：D

31. 下列对于轻度沙眼疗效最好的药物是

- A: 酞丁安
- B: 磺胺醋酰钠
- C: 硫酸锌
- D: 红霉素

答案：A

32. 起效快，可迅速缓解急性哮喘发作和支气管平滑肌痉挛的药品是

- A: 沙丁胺醇
- B: 布地奈德
- C: 羧甲司坦
- D: 扎鲁司特

答案：A

33. 营养性巨幼细胞性贫血主要因为缺乏

- A: 维生素 C
- B: 鞣酸
- C: 叶酸和(或)维生素 B
- D: 白细胞

答案：C

34. 在一定范围内,其水平与动脉粥样硬化和冠心病的发生、发展呈负相关的指标是 ()

- A: LDL-C
- B: HDL-C
- C: TG
- D: HbA1c

答案：B

35. 处方常见的外文缩写中“生理盐水”的英文缩写是

- A: NS
- B: OU
- C: Aa

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: 0L

答案: A

36. 选择性地作用于骨性关节、有直接抗炎作用的处方药是

A: 可待因

B: 硫酸氨基葡萄糖

C: 阿司匹林

D: 塞来昔布

答案: B

37. 其含量用视黄醇当量(RE)表示的是

A: 维生素 A

B: 维生素 D

C: 维生素 B

D: 维生素 E

答案: A

38. 归属公共网络资源的是

A: www.google.com

B: www.ashp.org

C: www.merck.com

D: www.cmt.tom.cn

答案: A

39. 上市后药品再评价阶段属于

A: II 期临床试验

B: IV 期临床试验

C: I 期临床试验

D: III期临床试验

答案: B

40. 消化不良很常见，半数以上人群在生命过程中曾因此病症而就诊，其主要症状有上腹饱胀、食欲缺乏等表现。

A: 微生物制剂不可用于消化不良的治疗

B: 过量的干酵母和乳酶生可以引起腹泻

C: 乳腺癌、机械性肠梗阻患者禁用多潘立酮

D: 胰酶片必须用肠溶衣片，口服时不可嚼碎，应整片吞下

答案: A

41. 患者，女，60岁。现病史：近日因摔倒而致左腕骨骨折。骨科处理：因背痛加重接受口服止痛治疗。骨密度：L1-4椎体 T 值 - 2.7SD，BMD749 (mg/cm²)；股骨颈 T 值 - 2.2SD，BMD602 (mg/cm²)。医生诊断：绝经后骨质疏松症。

A: 钙制剂

B: 双膦酸盐

C: 甲状旁腺素

D: 氟制剂

答案: B

42. 治疗咳嗽应依据咳嗽的频率和程度选药，剧咳者宜首选的非处方止咳药是

A: 苯丙哌林

B: 吗啡

C: 右美沙芬

D: 可待因

答案: A

43. 清晨始升高，午后达高峰，凌晨跌低谷，是指

- A: 胰岛 B 细胞的分泌规律
- B: 糖皮质激素的分泌规律
- C: 肝脏合成胆固醇的规律
- D: 胃酸的分泌规律

答案：A

44. 有机磷中毒的特效解毒剂是

- A: 氯磷定
- B: 乙酰胺
- C: 烯丙吗啡
- D: 维生素 K1

答案：A

45. 作用于靶器官的多巴胺受体，神经系统副作用罕见的是

- A: 甲氧氯普胺
- B: 西沙必利
- C: 多潘立酮
- D: 莫沙必利

答案：C

46. 长期服用可导致或加重胃溃疡的药物是

- A: NSAID
- B: 质子泵抑制剂
- C: 米索前列醇
- D: 抗酸剂

答案：A

47. 药物治疗结核病标准方案中，间歇疗法的含义是

- A: 一周用药 1 次
- B: 一日用药 1~2 次
- C: 一周用药 2~3 次
- D: 一日用药 1 次

答案：C

48. 药物不良反应胶体果胶铋（）

- A: 溢乳现象
- B: 睡眠障碍
- C: 黑便
- D: 性功能障碍

答案：C

49. 粪外观所对应的疾病，上消化道出血(>50ml)

- A: 白陶土便
- B: 柏油便，黑色有光泽
- C: 暗红果酱色
- D: 米泔水样

答案：B

50. 塞来昔布在体内代谢的主要肝药酶是

- A: CYP2C9
- B: CYP2C8
- C: CYP1A2
- D: CYP2C19

答案：A

51. (2016 年真题) 服药期间饮酒，最容易出现肝损伤的药物是 ()。

- A: 伪麻黄碱
- B: 氯苯那敏
- C: 对乙酰氨基酚
- D: 布洛芬

答案: C

52. 肺结核最常见的传播方式为

- A: 血液传播
- B: 垂直传播
- C: 呼吸道传播
- D: 消化道

答案: C

53. 饮酒可使其吸收明显减少的药物是

- A: 苯妥英钠
- B: 维生素 B1、维生素 B2
- C: 卡马西平
- D: 利血平

答案: B

54. 促进肾小管对钠的重吸收，引起高血压的药物是

- A: 伪麻黄碱
- B: 咖啡因
- C: 糖皮质激素
- D: 重组人促红细胞生成素

答案: C

55. 在体内有抗凝血作用、体外没有抗凝血作用的药物是

- A: 肝素
- B: 链激酶
- C: 噻氯匹定
- D: 华法林

答案：D

56. 患者，男，64岁，因“右足肿痛”就诊。查体：右足第一跖趾关节红肿、触痛明显。化验结果：血尿酸 $588.1 \mu\text{mol/L}$ 。诊断为“急性痛风性关节炎”。患者既往有高血压、高胆固醇血症、冠心病病史，目前正服用氢氯噻嗪片 25mgqd、美托洛尔缓释片 47.5mgqd、赖诺普利片 20mgqd、辛伐他汀片 10mgqd、阿司匹林肠溶片 100mgqd。

- A: 阿司匹林片（300mg）
- B: 双氯芬酸钠片
- C: 别嘌醇片
- D: 贝诺酯片

答案：B

57. 药师应对处方进行审核、依照处方准确、快速地调配，体现处方的

- A: 经济性
- B: 技术性
- C: 法律性
- D: 有效性

答案：B

58. 以下有关高血压的药物治疗方案的叙述中，不正确的是

- A: 首先选用血管扩张剂和中枢性抗高血压药

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

- B: 药物治疗高血压时要考虑患者的并发症
- C: 可采用两种或两种以上药物联合用药
- D: 采用最小有效剂量，使不良反应减至最小

答案：A

59. 阿莫西林等水溶性药物血浆中游离药物浓度较成人低，其机制是

- A: 体液及细胞外液容量大
- B: 胃排空快
- C: 肝脏的相对重量约为成人的 2 倍
- D: 胃酸分泌少

答案：A

60. 患者，女，53 岁，因“冠状动脉粥样硬化性心脏病、急性心肌梗死”住院治疗。医师处方：硝酸甘油片、比索洛尔片、注射用重组链激酶冻干粉针剂、依那普利片、肝素钠注射液、辛伐他汀片依那普利的主要不良反应是

- A: 出血
- B: 高钾血症
- C: 横纹肌溶解症
- D: 心动过缓、二至三度房室传导阻滞

答案：B

61. 高血压伴痛风的患者慎用的药物是()

- A: 硝苯地平
- B: 氢氯噻嗪
- C: 普萘洛尔
- D: 卡托普利

答案：B

62. 患者，男，68 岁，既往体健，因“受凉后咳嗽、咳黄脓痰，伴发热 2 天”入院。查体：体温 39.1℃，血压 138 / 80mmHg，心率 102 次 / 分，呼吸 32 次 / 分，左肺可闻及湿性啰音。化验结果：白细胞计数 $11.2 \times 10^9 / L$ ，中性粒细胞百分比 85%。胸部 x 线：左肺下叶渗出性阴影。痰培养结果待归。入院诊断：社区获得性肺炎。

- A: 阿莫西林-克拉维酸钾+阿奇霉素
- B: 多西环素
- C: 阿奇霉素
- D: 左氧氟沙星+阿奇霉素

答案：A

63. 患者，女，48 岁，身高 158cm，体重 72kg。最近因感觉易疲劳、怕冷、嗜睡、记忆力逐渐减退等情况前来就医。医生检查发现，患者眼睑和手部皮肤水肿，声音嘶哑、毛发稀落。实验室检查示：血清 TSH 水平升高。确诊为甲状腺功能减退症。

- A: 碘化钾
- B: 丙硫氧嘧啶
- C: 甲巯咪唑
- D: L-T₄

答案：D

64. 马来酸氯苯那敏（扑尔敏）用于良性前列腺增生症患者，导致尿滞留，属于

- A: 过度治疗用药
- B: 有禁忌证用药
- C: 超适应证用药
- D: 无适应证用药

答案：B

65. 提示首次取硝酸甘油片的患者"要随身携带、在心绞痛发作时含于舌下"，是针对

- A: 交代药品贮存条件与方法
- B: 交代用药途径及用药方法
- C: 交代药物的用量
- D: 交代用药注意事项

答案：B

66. 有时需要利用所提供的参考文献去验证信息的正确性是指

- A: 二级信息源
- B: 一级信息源
- C: 四级信息源
- D: 三级信息源

答案：D

67. 中度贫血的评价指标是血红蛋白（Hb）含量为（g/L）

- A: 30~60
- B: 90~120
- C: 60~90
- D: <30

答案：C

68. 以下用药，属于“禁忌证用药”的是

- A: 脂肪乳用于急性肝损伤、脂质肾病、脑卒中
- B: 无治疗指征盲目补钙
- C: 治疗感冒、咳嗽给予抗菌药

D: 黄体酮用于输尿管结石

答案: A

69. 以下的论述哪项是错误的

A: 普萘洛尔不可抑制肾素的分泌

B: 氢氯噻嗪不可与普萘洛尔合用于治疗高血压

C: 硝普钠可用于高血压危象和慢性心功能不全

D: 氢氯噻嗪作为基础降压药可单用于轻度高血压，也可与其他降压药合用，提高疗效，减少不良反应

答案: B

70. (2017 年真题) 患者女，68 岁体重 54kg，因慢性阻塞性肺病急性加重再次入院，入院后生化检查 ALT20IU/L，血肌酐 (Cr) 1.8mg/dL，痰培养为铜绿假单胞菌。临床选用头孢他啶。头孢他啶药品说明书成人常用剂量为 1 日 1.5~6g，分 2~3 次给药肌酐清除率为 31~50ml/min 时剂量为每 12 小时 1g；肌酐清除率为 16~30ml/min 时剂量为每 24 小时 1g；肌酐清除率为 6~15ml/min 时量为每 24 小时 0.5g；肌酐清除率 ≤5ml/min 时剂量为每 48 小时 0.5g。

A: 每 24 小时 1g

B: 每 12 小时 1g

C: 每 24 小时 0.5g

D: 每 8 小时 2g

答案: A

71. (2019 年真题) 患者，男，64 岁，因右足肿痛就诊。查体：右脚第一趾关节红肿，触痛明显。化验结果：血尿酸 $588.1 \mu\text{mol/L}$ 。诊断为急性痛风性关节炎。患者合并高血压、高胆固醇血症、冠心病，目前正在服用氢氯噻嗪片 25mgqd、美托洛尔缓释 47.5mgqd、赖诺普利片 20mgqd、辛伐他汀片 10mgqd、阿司匹林肠溶片 100mgqd。

- A: 美托洛尔和赖诺普利
- B: 氢氯噻嗪和阿司匹林
- C: 氢氯噻嗪和辛伐他汀
- D: 美托洛尔和辛伐他汀

答案：B

72. 治疗流行性脑脊髓膜炎首选药是

- A: 替硝唑
- B: 磺胺多辛
- C: 磺胺甲噁唑
- D: 磺胺嘧啶

答案：D

73. 药源性疾病是由药物诱发的疾病，是指在预防、诊断、治疗或调节生理功能过程中出现与用药有关的人体功能异常或组织损伤所引起的一系列临床症状。引起药源性疾病的因素主要有患者因素、药物因素。

- A: 月经期服用常规剂量的避孕药和地西泮，药理效应增强
- B: 慢乙酰化者服异烟肼半衰期延长至 2~4.5 小时
- C: 肝硬化患者应用利多卡因，可引起严重的中枢神经系统疾病
- D: 假胆碱酯酶遗传性缺陷者应用琥珀胆碱出现呼吸暂停

答案：C

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

74. 用于解救苯二氮草类药物中毒的特殊解毒剂是

A: 乙酰半胱氨酸

B: 氟马西尼

C: 纳洛酮

D: 亚甲蓝

答案: B

75. 医学检查发现柏油样黑便并有光泽，通常见于

A: 肛裂

B: 直肠息肉

C: 胃溃疡

D: 痔疮

答案: C

76. 归属于药历“患者基本情况”内容的是

A: 临床诊断

B: 医保和费用支付情况

C: 联合用药

D: 主要实验室检查数据

答案: B

77. 患者，男，60岁，有糖尿病家族史。出现口干，多饮，多尿，体重下降6个月，BMI值29.0。空腹血糖10.2mmol/L，餐后2小时血糖16.7mmol/L，血压115/80mmHg。

A: 胰岛素

B: 双胍类降糖药

C: α -葡萄糖苷酶抑制剂

D: 磺酰脲类降糖药

答案: B

78. 尿液是人体泌尿系统排除的代谢废物，正常人每日排出尿液 1000～3000ml。其中 97% 为水分，而在 3% 的固体物质中，主要含有两大类物质：有机物（尿素、尿酸、肌酐等蛋白质代谢产物）和无机物（氯化钠、磷酸盐、硫酸盐、铵盐等）。

- A: 硫酸镁
- B: 氯化钾
- C: 氯化铵
- D: 氯化钠

答案：C

79. 药师应对处方进行审核、依照处方准确、快速地调配

- A: 经济性
- B: 有效性
- C: 技术性
- D: 法律性

答案：C

80. 氨茶碱注射剂和片剂所表现的是()。

- A: 同一药物，剂型不同，其副作用、毒性不同
- B: 同一药物，制成同一剂型，由于制备工艺不同而表现不同
- C: 同一药物，制成同一剂型，由于处方组成不同而表现不同
- D: 同一药物，剂型不同，其起效的快慢、作用强度和持续时间不同

答案：D

81. 对紧张性头痛，长期精神比较紧张者、神经痛，推荐合并应用的非处方药是

- A: 苯妥英钠
- B: 麦角胺咖啡因

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 谷维素

D: 阿司匹林

答案: C

82. 引起急性支气管炎的常见病原体是

A: 呼吸道合胞病毒

B: 铜绿假单胞菌

C: 肺炎链球菌

D: 结核杆菌

答案: A

83. 患者，男，45岁，临床诊断肝内胆管梗阻。下列指标最可能出现的是

A: 肌酸激酶降低

B: γ -谷氨酰转移酶升高

C: 血肌酐降低

D: 白蛋白升高

答案: B

84. 一般给予肠外营养的热氮比为

A: 150kcal:1gN

B: NPC5: 5

C: 100kcal:1gN

D: NPC7:3

答案: A

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/125112030131012033>