专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试题库，word格式可自由下载编辑，附完整答案！

2024河南省驿城区《执业药师之西药学综合知识与技能》考试通关秘籍题库附答案（综合题）

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.一旦误服中毒，必须用硫酸镁洗胃的是

A：急性汞中毒

B：急性铅中毒

C：香豆素类杀鼠药

D：磷化锌等杀鼠药

答案：B

2.可出现痤疮样皮疹的是（）

A：博来霉素

B：吉非替尼

C：阿霉素

D：氟尿嘧啶

答案：B

3.通过拮抗a受体而用于前列腺增生症治疗的药物是

A：非那雄胺

B：特拉唑嗪

C：前列康

D：黄酮哌酯

答案：B

4.多数非甾体抗炎药适宜

A: 餐前服用

B: 餐后服用

C: 餐中服用

D: 清晨服用

答案：B

5.核苷酸类HIV逆转录酶抑制剂（）

A: NRTIs

B: PIs

C: FIs

D: NNRTIs

答案：A

6.（2017年真题）因可提高血液携氧量,被长跑运动员用于提高成绩,因而被列为兴奋剂管理的药物是（）

A: 甲睾酮

B: 人促红素

C: 哌替啶

D: 可卡因

答案：B

7.患者,男,69岁,因高血压长期服用抗高血压药,近日患者出现足踝部水肿引起此不良反应的药物是()

A: 普萘洛尔

B: 多沙唑嗪

C: 卡托普利

D: 非洛地平

答案：D

8.患者，女，69岁，体型偏胖，BMI30.1kg/m2，患者诉平卧时常有反酸、烧心、胸痛，偶感背痛半年，近1周出现夜间咳嗽、咽部有异物感。自用止咳糖浆无效。查体：咽红，声音嘶哑；双肺听诊未闻及干、湿性啰音，偶有哮鸣音。既往史：高血压病史12年，服用氨氯地平片5mgqd，平素血压可控制在140/85mmHg左右；高脂血症病史10年，服用阿托伐他汀钙片20mgqd。

A: 奥美拉唑肠溶胶囊

B: 多潘立酮片

C: 布地奈德干粉吸入剂

D: 单硝酸异山梨酯缓释片

答案：A

9.三环类抗抑郁药的致死量通常高于

A: 1g

B: 1.5g

C: 2g

D: 2.5g

答案：C

10.糖尿病合并肾病患者首选的口服降血糖药为

A: 格列吡嗪

B: 格列美脲

C: 格列齐特

D: 格列喹酮

答案：D

11.急性缺血性脑卒中溶栓治疗的时间窗为（）

A：1h

B：0.5h

C：3h

D：2h

答案：C

12.某患者，男，64岁，身高174cm，体重92kg，既往有高血压、高脂血症及心肌梗死病史，近日因反复胸闷就诊。临床处方：阿司匹林肠溶片、辛伐他汀片、特拉唑嗪片、氨氯地平片、曲美他嗪片、单硝酸异山梨酯注射液进行治疗。

A：氨氯地平片

B：特拉唑嗪片

C：曲美他嗪片

D：阿司匹林肠溶片

答案：B

13.某口服避孕药复方制剂，其成分为：每片含屈螺酮3mg和炔雌醇0.03mg。说明书部分内容节选如下，请回答问题。

A：尽快同时服用两片药,然后在常规时间继续服药,在以后的7天内要加用屏障避孕法

B：在常规时间20:00服用4月25日的药片,不用补服4月24日的药片

C：不再继续服用此周期药物,经过一个7天的停药期,再开始继续服用下一周期的药物

D：尽快同时服用两片药,然后在常规时间继续服药,不需要使用额外的避孕措施

答案：D

14.对于尿液的描述正确的是

A: 正常人的尿量变化幅度不大

B: 尿量的多少主要取决于肾小球滤过率和肾小管的重吸收

C: 正常人的新鲜尿液呈弱碱性

D: 正常人每日排出尿液 1～2L，其中 50%为水分

答案：B

15.（2019 年真题）关于处方开具和调剂的说法，正确的是

A: 应使用淡红色处方开具第二类精神药品

B: 处方开具后 7 日内有效

C: 调剂处方时应做到“四查十对“

D: 查处方时“四查”是指查对药名、剂型、规格和数量

答案：C

16.患者，女，33 岁，患有高铁血红蛋白血症，可选用的治疗药物是

A: 亚甲蓝

B: 纳洛酮

C: N-乙酰半胱氨酸

D: 青霉胺

答案：A

17.患者，女，8岁，体重22kg，因出现咳嗽、呼吸困难急诊就诊，症状在2天内逐步加重。出现这些症状前，先出现病毒性上呼吸道感染的症状（咽喉痛、流涕和咳嗽）3天。在过去的2年，患者有过几次急性支气管炎发作，并在3个月前因肺炎住院。患者目前未接受任何药物治疗。查体：中度呼吸窘迫伴呼气喘鸣音，偶尔咳嗽，呼气相延长，胸部过度膨胀，胸骨上窝、锁骨上窝和肋间隙凹陷。听诊时可闻及双侧吸气和呼气喘鸣声，左侧呼吸音减弱。呼吸30次/分、血压110/83mmHg、心率130次/分、体温37.8℃，动脉血气分析血氧饱和度（SaO2）90%。

A: 雾化沙丁胺醇

B: 孟鲁司特咀嚼片

C: 沙丁胺醇静脉注射

D: 茶碱片

答案：A

18.解救经口急性铅中毒的洗胃液是

A: 1%硫酸镁

B: 1%硫酸铜

C: 3%过氧化氢

D: 1%氯化钠

答案：A

19.混合型高脂血症，首选用的药物是

A: 他汀类

B: 贝特类

C: 烟酸

D: ω-3脂肪酸

答案：A

20.患者，女，55岁，因"反复发作胸骨后疼痛2年，伴反酸，胃灼热，间断积食"而就诊。食管测压提示食管下括约肌(LES)压力<6mmHg，结合胃镜检查结果，临床诊断为胃食管反流病，医师处方：奥美拉唑肠溶片20mgbid强化抑酸治疗。

A: 用药后可能出现口干，便秘等不良反应

B: 长期用药后可能会出现维生素K缺乏

C: 适宜餐前30分钟服用

D: 应正片吞服

答案：B

21.解救氰化物中毒的是

A: 盐酸戊乙奎醚

B: 亚硝酸异戊酯

C: 二巯丁二钠

D: 单价抗毒血清

答案：B

22.患者，男，70岁，右手抖动和行走缓慢3个月，经过神经科检查后诊断为帕金森病，既往前列腺肥大史3年，临床上对该患者不宜选用：

A: 苯海索

B: 司来吉兰

C: 多巴丝肼

D: 左旋多巴

答案：A

23.结肠癌

A: 白细胞增多

B: 上皮细胞

C: 真菌

D: 红细胞

答案：D

24.选择性单胺氧化酶A抑制剂

A：氟伏沙明

B：米氮平

C：吗氯贝胺

D：氯米帕明

答案：C

25.有关尿沉渣管型和尿沉渣结晶的叙述正确的是

A：正常人尿沉渣中的磷酸盐、尿酸盐、草酸盐最为常见

B：常见的尿沉渣管型有透明细胞管型、白细胞管型、红细胞管型、上皮细胞管型等

C：尿沉渣中的无机物沉渣主要为结晶体，多来自于食物代谢的结果

D：尿沉渣管型是尿液中的沉渣在肾小管内聚集而成，尿液中出现管型是肾实质性病变的证据

答案：A

26.指本次不良反应经采取相应的医疗措施后的结果；如不良反应已经好转，后患者又死于原患疾病或与此不良反应无关的并发症，此栏应填"好转"

A：不良反应/事件的结果

B：用药起止时间

C：ADR/ADE过程描述

D：用药原因

答案：A

27.患者，男，18岁，因鼻塞症状就诊，医生处方1%盐酸麻黄碱滴鼻液。下列关于该滴鼻液用药指导的说法，错误的是()

A：萎缩性鼻炎患者可增加给药次数

B: 滴管头不要碰到鼻部，以避免污染药液

C: 滴鼻后，要静卧 3～5 分钟

D: 用药前要将鼻腔分泌物清理干净

答案：A

28.（2019 年真题）下列分析方法中，不属于药物经济学评价方法的是

A: 最小成本分析法

B: 成本-效益分析法

C: 成本-效用分析法

D: 成本-效应分析法

答案：D

29.发表在《中国药理学学报》上有关紫杉醇的综述文章，属于

A: 二级信息

B: 五级信息

C: 三级信息

D: 四级信息

答案：C

30.博来霉素

A: 溶血性尿毒症

B: 心脏毒性

C: 出血性膀胱炎

D: 肺纤维化

答案：D

31.切勿嚼碎、咀嚼，宜在进餐时用水吞服，不宜睡前吞服的 IBS 治疗药物是

A：环孢素A

B：匹维溴铵

C：地芬诺酯

D：蒙脱石散

答案：B

32.酒的主要成分为乙醇，饮用后人体先是兴奋，随之对中枢神经出现抑制，并扩张血管，刺激或抑制肝药酶代谢系统；另外，有些药也可延迟酒的代谢和分解。总体上，药与酒的相互作用结果有两个：一是降低药效；二是增加发生不良反应的几率。

A：庆大霉素

B：克林霉素

C：呋喃唑酮

D：依替米星

答案：C

33.甲巯咪唑的初治剂量是一日

A：30～60mg

B：25～80mg

C：5～15mg

D：15～60mg

答案：A

34.麻醉药品处方印刷用纸是

A：淡黄色

B：淡橙色

C：淡绿色

D：淡红色

答案：D

35.可能导致局部缺血性结肠炎（药源性胃肠道疾病）的药物是

A：利血平

B：阿洛司琼

C：呋塞米

D：依他尼酸

答案：B

36.患者，男，28岁，主诉：发作性四肢抽搐2年，加重2月，化验结果显示TSH增高，FT3，FT4减低，临床诊断为甲状腺功能减退，欲使用左甲状腺素钠治疗。药师对该患者的用药指导，正确的是

A：100μg，qd，早餐后半小时，顿服

B：100mg，qd，睡前顿服

C：100mg，qd，晚餐后顿服

D：100μg，qd，早餐前半小时，顿服

答案：D

37.患者，女性，62岁，自述近日常有一过性黑矇，雾视、视野中有黑点，一侧面部无力、麻木。医师诊断为短暂性脑缺血。

A：200～300mg/d

B：300mg/d

C：75～150mg/d

D：300～500mg/d

答案：C

38.在夏季，用前宜其置入冰水或冰箱中10～20分钟；给药后1～2小时内尽量不排尿

A：膜剂

B：阴道栓剂

C：气雾剂

D：泡腾片

答案：B

39.根据血红蛋白含量评估缺铁性贫血程度重度贫血为

A：120～160g/L

B：90～120g/L

C：60～90g/L

D：30～60g/L

答案：D

40.甲基多巴

A：嗜酸性粒细胞减少

B：中性粒细胞减少

C：血小板减少

D：血红蛋白量增多

答案：A

41.脂肪乳用于急性肝损伤、急性胰腺炎、脂质肾病患者

A：超适应证用药

B：无适应证用药

C：有禁忌证用药

D：过度治疗用药

答案：C

42.患者，男，35岁。血压180/100mmHg，经服硝苯地平及血管紧张素转化酶抑制剂治疗3周后血压降至120/80mmHg，关于停药的问题应是

A: 可以停服降压药

B: 为避免血压下降过低，应停药

C: 继续服药，血压平稳控制1～2年后再逐渐减少剂量至停服1种药，如血压不稳定，即表明需长期服用能保持血压稳定的最小剂量

D: 停药后血压增高再服

答案：C

43.患者，男，60岁，有糖尿病家族史。出现口干，多饮，多尿，体重下降6个月，BMI值29.0。空腹血糖10.2mmol/L，餐后2小时血糖16.7mmol/L，血压115/80mmHg。

A: 高血脂

B: 1型糖尿病

C: 2型糖尿病

D: 高血压

答案：C

44.药酶的活性可被部分药品所增强或灭活，能增强肝药酶活性的药品是

A: 丙磺舒

B: 左氧氟沙星

C: 多潘立酮

D: 利福平

答案：D

45.钙制剂

A: 激素替代剂

B：骨形成刺激剂

C：促进骨矿化剂

D：骨吸收抑制剂

答案：C

46.是人体储存能量的形式，直接参与胆固醇和胆固醇酯合成的为

A：极低密度脂蛋白胆固醇

B：三酰甘油酯

C：低密度脂蛋白胆固醇

D：血清总胆固醇

答案：B

47.疱疹性脑炎的致病原为

A：VZV

B：HCV

C：HSV-1

D：HSV-2

答案：C

48.（2015年真题）细菌感染腹泻患者宜选用（）。

A：小檗碱

B：乳果糖

C：阿苯达唑

D：干酵母

答案：A

49.进一步验证药物对目标适应证患者的治疗作用和安全性是指

A：Ⅲ期临床试验

B: Ⅰ期临床试验

C: Ⅱ期临床试验

D: 临床预试验

答案：A

50.治疗指数低者静脉滴注给药；治疗指数高者分次给药，以保证血药浓度始终高于最低有效浓度针对

A: 半衰期大于24小时

B: 半衰期8～24小时

C: 半衰期小于30分钟

D: 半衰期大于30小时

答案：C

51.餐后0.5～1小时给药的是

A: 胰岛素

B: 二甲双胍

C: 瑞格列奈

D: 阿卡波糖

答案：B

52.急性传染病的恢复期可呈现

A: 单核细胞增多

B: 中性粒细胞增多

C: 淋巴细胞增多

D: 嗜酸性粒细胞增多

答案：A

53.依据生物钟规律，适宜睡前服用的药品是

A: 苯海拉明
B: 沙丁胺醇
C: 奥利司他
D: 氟伏沙明
答案：B

54.患者，女，55岁，诊断为类风湿性关节炎，既往有十二指肠溃疡病史。医生给予甲氨蝶呤+柳氮磺吡啶治疗。甲氨蝶呤用法用量正确的是()
A: 7.5mgqw
B: 7.5mgqod
C: 75mgqd
D: 7.5mgtid
答案：A

55.治疗大肠埃希菌所致的尿路感染，不宜选用的抗菌药物是
A: 阿奇霉素
B: 左氧氟沙星
C: 头孢呋辛
D: 阿莫西林
答案：A

56.最可能引起血小板计数减少的药物是
A: 氯丙嗪
B: 阿司匹林
C: 阿莫西林
D: 乳酸钠
答案：B

57.饮茶可减少其吸收的药物是

A：硫酸亚铁

B：阿莫西林

C：阿仑膦酸钠

D：去氨加压素

答案：A

58.（2016年真题）患者，男，50岁，诊断为高血压、冠心病。

A：对乙酰氨基酚片

B：华法林片

C：氯吡格雷片

D：双嘧达莫片

答案：C

59.振奋精神增加供氧能力的兴奋剂是

A：苯丙胺

B：吠塞米

C：阿托品

D：甲睾酮

答案：A

60.（2015年真题）观察人体对新药的耐受程度和药动学评价阶段是（）。

A：Ⅰ期临床试验

B：Ⅲ期临床试验

C：Ⅳ期临床试验

D：Ⅱ期临床试验

答案：A

61.少数人用后可出现视力降低和辨色困难

A：硝酸甘油

B：西咪替丁

C：布洛芬

D：金刚烷胺

答案：C

62.患者治疗3天后,感染控制不佳,痰培养及药敏报告提示病原菌为对青霉素高水平耐药的肺炎链球菌,可将抗菌药物调整为（）

A：哌拉西林他唑巴坦

B：头孢哌酮舒巴坦

C：阿奇霉素

D：莫西沙星

答案：D

63.与两性霉素B合用需要严密监测血钾

A：酮康唑

B：碳酸氢钠

C：强心苷

D：链霉素

答案：C

64.可卡因属于兴奋剂中的

A：麻醉药品

B：精神刺激剂

C：利尿剂

D: β 受体阻断剂

答案：B

65.用药与反应发生时间关系密切，有文献资料佐证；但引发ADR的药品不止一种，或原患疾病病情进展因素不能除外；此ADR因果关系可评价为

A: 可能无关

B: 待评价

C: 很可能

D: 可能

答案：D

66.（2016年真题）患者，男，45岁，因男性乙型肝炎给予干扰素治疗，治疗1个月后，患者出现脱发，停用干扰素后，脱发症状好转，再次给予干扰素治疗，患者再次出现脱发。该ADR的因果关系评价结果是（）。

A: 很可能

B: 可能无关

C: 肯定

D: 可能

答案：C

67.真菌引起阴道炎（）

A: 咪康唑

B: 甲硝唑

C: 聚甲酚磺醛

D: 庆大霉素

答案：A

68.仅用于绝经后妇女，不适用于男性患者的抗骨质疏松药物是

A：帕米磷酸二钠

B：雷洛昔芬

C：骨化三醇

D：阿法骨化醇

答案：B

69.以下有关肝功能不全患者用药原则的叙述中，不正确的是

A：选用从肝脏排泄的药物

B：特别应避免与肝毒性的药物合用

C：定期检查肝功能，及时调整治疗方案

D：避免或减少使用对肝脏毒性大的药物

答案：A

70.重度贫血，Hb 为（）

A：60~120g/L

B：小于 60g/L

C：60~90g/L

D：90~120g/L

答案：B

71.可用于紫癜辅助治疗的药物是

A：维生素

B：复合维生素 B

C：维生素 A

D：维生素 C

答案：D

72.（2018年真题）患者,男,16岁,因急性细菌性扁桃体炎使用青霉素钠治疗,用药前进行青霉素皮试。关于青霉素皮试液浓度和给药方法的说法正确的是（）

A: 浓度5000U/ml,肌内注射0.1ml

B: 浓度500U/ml,皮内注射0.1ml

C: 浓度5000U/ml,皮内注射0.1ml

D: 浓度500U/ml,肌内注射0.1ml

答案：B

73.妊娠早期初始，受精后半个月以内，患者用药不当的影响是

A: 女性生殖系统发育迟缓

B: 可导致颅面部畸形、腭裂等

C: 中枢神经系统发育迟缓

D: 几乎见不到药物的致畸作用

答案：D

74.妊娠期女性患泌尿系统感染，需给予氨苄西林治疗，给药剂量需要适当增加，主要原因是

A: 分布更广

B: 排泄更快

C: 代谢更快

D: 吸收降低

答案：B

75.可降低性传播疾病感染风险的个体避孕措施是

A: 宫内节育器

B: 外用杀精剂

C: 口服复方短效避孕药

D: 使用避孕套

答案：D

76.(抗高血压药物的不良反应)，服用哌唑嗪可能引起

A: 直立性低血压

B: 免疫失调

C: 多毛症

D: 房室传导阻滞

答案：A

77.可引起胎儿肢体、耳、内脏畸形的药物是

A: 苯巴比妥

B: 沙利度胺

C: 雌激素、孕激素、雄激素

D: 叶酸拮抗剂

答案：B

78.患儿，男，6个月，体重9．0kg，平素健康，近日出现多汗、夜哭、易惊。体检：前囟平软，颅骨有乒乓球感，枕秃，肋骨串珠。人工喂养，尚未添加任何辅食，平素较少出门。

A: 智障

B: 脑瘫

C: 佝偻病

D: 坏血病

答案：C

79.经皮下注射，主要用于控制一餐饭后高血糖的胰岛素制剂是

A: 地特胰岛素
B: 精蛋白锌胰岛素
C: 门冬胰岛素
D: 低精蛋白锌胰岛素
答案：C

80.(解救常见毒物中毒的催吐措施)，可用1%硫酸铜溶液催吐用于解救的中毒是
A: 磷化锌中毒
B: 三唑仑中毒
C: 丙戊酸钠中毒
D: 丙米嗪中毒
答案：A

81.根据老年人的特殊生理变化，80岁以上老年人用药的初始剂量应为成人剂量的
A: 45355
B: 45293
C: 45387
D: 1／5～1／4
答案：B

82.关于该患者的治疗方案错误的是（）
A: 在病原学送检后,可立即实施经验性抗菌治疗
B: 当体温正常48~72h,且达到肺炎临床稳定标往后,可停用抗菌药物
C: 病情稳定后可从静脉给药转为口服序贯治疗
D: 抗菌药物应持续用至胸片X线病灶完全吸收
答案：D

83.药物经济学研究的4种方法主要差别在于()。

A: 用药成本的不同测量上

B: 计算不同类型的成本

C: 对于用药结果的不同测量

D: 所采用的实验研究方法不同

答案：C

84.患者男性，35岁，髋关节置换术后7天，患者右侧下肢肿胀、疼痛，抬高患肢后可好转。

A: 抗菌药物

B: 布洛芬

C: 阿司匹林

D: 糖皮质激素

答案：D

85.服用药物对粪外观的影响,利福平

A: 橘红至红色

B: 变红或黑色

C: 红至黑色

D: 黄色

答案：A

86.最常见的急性肾盂肾炎致病菌是

A: 变形杆菌

B: 大肠杆菌

C: 粪肠球菌

D: 葡萄球菌

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/125230040114012033