

选择题（共 50 题，共 100 分）

1. 采集病史过程中，下列提问不妥的是：（ ）

- ☐ A 你病了多长时间了？
- ☐ B 你感到哪儿不舒服？
- ☒ C 你的粪便发黑吗？
- ☐ D 你一般在什么时候发热？

参考答案：C；考生答案：C；试题分数：2；考生得分：2

2. 下列各项属于主观资料的是：（ ）

- ☐ A 肝脏肿大
- ☐ B 肝功能异常
- ☐ C 蜘蛛痣
- ☒ D 恶心

参考答案：D；考生答案：D；试题分数：2；考生得分：2

3. 大咯血是指一次咯血量达 300～500ml，或每日咯血量达：（ ）

- ☒ A 500ml 以上
- ☐ B 450ml 以上
- ☐ C 400ml 以上
- ☐ D 300ml 以上

参考答案：A；考生答案：A；试题分数：2；考生得分：2

4. 幽门梗阻所致呕吐的特点为：（ ）

- ☐ A 进餐后即刻发生
- ☐ B 剧烈呈喷射状
- ☒ C 多为宿食，常于夜间发生
- ☐ D 胃排空后仍干呕不止

参考答案：C；考生答案：C；试题分数：2；考生得分：2

5. 导致呕血最常见的胃及十二指肠原因是：（ ）

- ☒ A 消化性溃疡

☐ B 胃底静脉曲张破裂

☐ C 急性胃粘膜病变

☐ D 胃癌

参考答案: A; 考生答案: A; 试题分数: 2; 考生得分: 2

6. 引起发热最常见的原因: ()

☒ A 感染性发热

☐ B 免疫反应所致发热

☐ C 吸收热

☐ D 自主神经功能紊乱所致发热

参考答案: A; 考生答案: A; 试题分数: 2; 考生得分: 2

7. 冷汗见于: ()

☐ A 结核病

☒ B 虚脱

☐ C 甲状腺功能亢进

☐ D 维生素 A 缺乏

参考答案: B; 考生答案: B; 试题分数: 2; 考生得分: 2

8. 辗转体位见于: ()

☐ A 心绞痛

☒ B 胆道蛔虫症

☐ C 心、肺功能不全

☐ D 脊椎疾病

参考答案: B; 考生答案: B; 试题分数: 2; 考生得分: 2

9. 鉴别深昏迷与浅昏迷最有价值的项目是: ()

☐ A 能否被唤醒

☒ B 深浅反射是否全部消失

☐ C 有否排便、排尿失禁

☐ D 肌肉松弛与否

参考答案: B; 考生答案: B; 试题分数: 2; 考生得分: 2

10. 强迫仰卧位见于: ()

☒ A 急性腹膜炎

☐ B 胆道蛔虫症

☐ C 心、肺功能不全

☐ D 脊椎疾病

参考答案: A; 考生答案: A; 试题分数: 2; 考生得分: 2

11. 强迫坐位见于: ()

☐ A 心绞痛

☐ B 胆道蛔虫症

☒ C 心、肺功能不全

☐ D 脊椎疾病

参考答案: C; 考生答案: C; 试题分数: 2; 考生得分: 2

12. 双侧瞳孔散大伴对光反射消失见于: ()

☐ A 有机磷农药中毒

☐ B 阿托品药物反应

☐ C 毒蕈中毒

☒ D 濒死状态

参考答案: D; 考生答案: D; 试题分数: 2; 考生得分: 2

13. 右锁骨上淋巴结肿大多见的癌肿转移为: ()

☒ A 肺癌

☐ B 胃或食管癌

☐ C 乳腺癌

☐ D 肝癌

参考答案: A; 考生答案: A; 试题分数: 2; 考生得分: 2

14. 肿大的淋巴结常位于颈部，呈多发性，质地较硬，大小不等，可互相粘连，或与周围组织粘连，常见于：（ ）

- ☐ A 淋巴瘤
- ☐ B 恶性肿瘤淋巴结转移
- ☒ C 淋巴结结核
- ☐ D 白血病

参考答案：C；考生答案：C；试题分数：2；考生得分：2

15. 口腔内有烂苹果味，见于：（ ）

- ☐ A 有机磷农药中毒
- ☒ B 糖尿病酮症酸中毒
- ☐ C 尿毒症
- ☐ D 肝性昏迷

参考答案：B；考生答案：B；试题分数：2；考生得分：2

16. 左锁骨上淋巴结肿大常见的癌肿转移为：（ ）

- ☐ A 肺癌
- ☒ B 胃或食管癌
- ☐ C 乳腺癌
- ☐ D 肝癌

参考答案：B；考生答案：B；试题分数：2；考生得分：2

17. 双侧胸廓扩张受限多见于：（ ）

- ☐ A 胸膜炎
- ☒ B 肺气肿
- ☐ C 肺炎
- ☐ D 肺不张

参考答案：B；考生答案：B；试题分数：2；考生得分：2

18.

不会出现触觉语颤增强的病变是 （ ）

- ☐ A 大叶性肺炎
- ☐ B 肺栓塞
- ☐ C 靠近胸壁的肺内巨大空腔
- ☒ D 大量胸腔积液

参考答案: D; 考生答案: D; 试题分数: 2; 考生得分: 2
19.

提示下呼吸道部分阻塞、痉挛或狭窄的呼吸音是 ()

- ☐ A 肺泡呼吸音增强
- ☐ B 肺泡呼吸音消失
- ☒ C 呼气音延长
- ☐ D 支气管呼吸音

参考答案: C; 考生答案: C; 试题分数: 2; 考生得分: 2
20. 第一心音减弱可见于: ()

- ☐ A 主动脉硬化
- ☐ B 二尖瓣狭窄
- ☐ C 甲亢
- ☒ D 二尖瓣关闭不全

参考答案: D; 考生答案: D; 试题分数: 2; 考生得分: 2
21. 无脉主要见于: ()

- ☐ A 心包积液
- ☒ B 严重休克
- ☐ C 主动脉瓣狭窄
- ☐ D 室间隔缺损

参考答案: B; 考生答案: B; 试题分数: 2; 考生得分: 2
22.

抬举样搏动作为可靠体征，发生的病理改变是：（ ）

- ☒ A 左室肥大
- ☐ B 右室肥大
- ☐ C 右房肥大
- ☐ D 左房肥大

参考答案：A; 考生答案：A; 试题分数：2; 考生得分：2

23. 确定第一心音最有价值的是：（ ）

- ☐ A 持续时间长
- ☐ B 心尖部声音最强
- ☐ C 音调比第二心音低
- ☒ D 与心尖搏动同时出现

参考答案：D; 考生答案：D; 试题分数：2; 考生得分：2

24. 心尖部第一心音增强见于：（ ）

- ☒ A 二尖瓣狭窄
- ☐ B 二尖瓣关闭不全
- ☐ C 主动脉瓣关闭不全
- ☐ D 甲亢

参考答案：A; 考生答案：A; 试题分数：2; 考生得分：2

25. 腹部叩诊鼓音范围明显缩小，可见于：（ ）

- ☐ A 胃肠高度胀气
- ☐ B 胃肠穿孔
- ☐ C 人工气腹
- ☒ D 腹腔内大量积液

参考答案：D; 考生答案：D; 试题分数：2; 考生得分：2

26. 肠鸣音亢进见于：（ ）

- ☐ A 急性肠炎

☒ B 机械性肠梗阻

☐ C 腹泻

☐ D 胃肠道大出血

参考答案: B; 考生答案: B; 试题分数: 2; 考生得分: 2

27. 大量腹水患者仰卧时, 腹部外形呈: ()

☐ A 球状腹

☒ B 蛙腹

☐ C 舟状腹

☐ D 平坦腹

参考答案: B; 考生答案: B; 试题分数: 2; 考生得分: 2

28. 腹式呼吸消失可见于: ()

☐ A 腹水

☒ B 急性腹膜炎

☐ C 肠麻痹

☐ D 腹腔内巨大肿块

参考答案: B; 考生答案: B; 试题分数: 2; 考生得分: 2

29. 反跳痛示炎症累及: ()

☐ A 脏器浆膜层

☐ B 腹壁皮肤

☐ C 腹膜脏层

☒ D 腹膜壁层

参考答案: D; 考生答案: D; 试题分数: 2; 考生得分: 2

30. 角膜反射完全消失, 见于: ()

☒ A 深昏迷者

☐ B 浅昏迷者

☐ C 中度昏迷者

☐ D 昏睡者

参考答案: A; 考生答案: A; 试题分数: 2; 考生得分: 2

31. 爪形手可见于: ()

☐ A 类风湿性关节炎

☐ B 正中神经损伤

☒ C 尺神经损伤

☐ D 痛风

参考答案: C; 考生答案: C; 试题分数: 2; 考生得分: 2

32. 脑膜刺激征见于: ()

☒ A 脑脊液压力增高

☐ B 锥体束受损

☐ C 小脑疾病

☐ D 震颤麻痹

参考答案: A; 考生答案: A; 试题分数: 2; 考生得分: 2

33. 类风湿性关节炎的手部特征性改变为: ()

☐ A 爪形手

☒ B 梭形关节

☐ C 杵状指

☐ D 垂腕

参考答案: B; 考生答案: B; 试题分数: 2; 考生得分: 2

34. 体格检查时触诊肌肉坚实, 被动运动阻力增加, 为: ()

☒ A 肌张力增强

☐ B 肌张力减弱

☐ C 肌力增强

☐ D 肌力减弱

参考答案: A; 考生答案: A; 试题分数: 2; 考生得分: 2

35. 消瘦是指体重低于标准体重的：（ ）

- ☒ A 10%
- ☐ B 20%
- ☐ C 30%
- ☐ D 40%

参考答案：A；考生答案：A；试题分数：2；考生得分：2

36. 正常情况下，叩诊清音见于：（ ）

- ☐ A 肝脏
- ☐ B 心脏
- ☒ C 肺
- ☐ D 腹部

参考答案：C；考生答案：C；试题分数：2；考生得分：2

37. 肥胖是指体重超过标准体重的：（ ）

- ☐ A 10%
- ☒ B 20%
- ☐ C 30%
- ☐ D 40%

参考答案：B；考生答案：B；试题分数：2；考生得分：2

38. 正常情况下，叩诊实音见于：（ ）

- ☒ A 肝脏
- ☐ B 腹部
- ☐ C 肺部
- ☐ D 胃泡区

参考答案：A；考生答案：A；试题分数：2；考生得分：2

39. 正常情况下，叩诊鼓音见于：（ ）

- ☐ A 肝脏
- ☒ B 腹部

☐ 肺脏

☐ D 心脏

参考答案：B; 考生答案：B; 试题分数：2; 考生得分：2

40. I 导联是较深的负向波，III导联是正向波，电轴：（ ）

☐ A 正常

☒ B 左偏

☐ C 右偏

☐ D 极度右偏

参考答案：C; 考生答案：B; 试题分数：2; 考生得分：0

41. 肢导联电极安放的正确方法是自右上肢开始顺时针方向依次为：（ ）

☒ A 红、黄、绿、黑

☐ B 黄、绿、黑、红

☐ C 绿、黑、红、黄

☐ D 黑、红、黄、绿

参考答案：A; 考生答案：A; 试题分数：2; 考生得分：2

42. 下列关于护理诊断“清理呼吸道无效”的相关因素的描述，错误的是：（ ）

☐ A 清理呼吸道无效：与腹部手术后切口疼痛有关

☐ B 清理呼吸道无效：与痰液粘稠有关

☐ C 清理呼吸道无效：与无力咳嗽有关

☒ D 清理呼吸道无效：与肺气肿伴上呼吸道感染有关

参考答案：D; 考生答案：D; 试题分数：2; 考生得分：2

43. 下列关于一上消化道出血伴柏油样便病人的护理诊断的陈述，正确的是：（ ）

☐ A 上消化道出血：与消化性溃疡有关

☒ B 排便异常：柏油样便：与进食不规则所致消化性溃疡有关

☐ C 上消化道出血：柏油样便：与进食不规则所致消化性溃疡有关

☐ 排便异常：与消化性溃疡有关

参考答案：B; 考生答案：B; 试题分数：2; 考生得分：2

44. 患者一般护理记录单的记录频率,依病情而定,一般要求二级护理患者至少:()

☐ A 每日1次

☐ B 每日2次

☐ C 每周1次

☒ D 每周2次

参考答案：D; 考生答案：D; 试题分数：2; 考生得分：2

45. 下列属于自我概念的分类的是: ()

☐ A 真实自我、社会自我、表现自我

☒ B 真实自我、期望自我、表现自我

☐ C 真实自我、期望自我、社会自我

☐ D 表现自我、期望自我、社会自我

参考答案：B; 考生答案：B; 试题分数：2; 考生得分：2

46. 能反映个体思维能力的是: ()

☐ A 自我概念

☒ B 认知水平

☐ C 情绪与情感

☐ D 压力应对

参考答案：B; 考生答案：B; 试题分数：2; 考生得分：2

47. 下列属于焦虑和抑郁共有症状的是: ()

☐ A 惊慌

☐ B 易激惹

☐ C 无助感

☒ D 睡眠障碍

参考答案：D; 考生答案：D; 试题分数：2; 考生得分：2

48. 自我概念的组成中最不稳定，易受疾病、手术或外伤影响的部分是（ ）

- ☐ A 身体意象
- ☒ B 社会认同
- ☐ C 自我认同
- ☐ D 自尊

参考答案：A; 考生答案：B; 试题分数：2; 考生得分：0

49. 对个体社会属性的评估的内容应包括：（ ）

- ☒ A 个性、角色、压力、环境
- ☐ B 情绪情感、角色、家庭、文化
- ☐ C 角色、文化、家庭、环境
- ☐ D 文化、语言、家庭、角色

参考答案：C; 考生答案：A; 试题分数：2; 考生得分：0

50. 分泌性腹泻的特点为：（ ）

- ☐ A 腹泻量大呈水样
- ☐ B 多有黏液与脓血
- ☐ C 与进食有关
- ☒ D 常伴里急后重

参考答案：A; 考生答案：D; 试题分数：2; 考生得分：0

选择题（共 50 题，共 100 分）

1. 关于问诊，下列错误的是：（ ）

- ☐ A 问诊是采集健康史的重要手段
- ☐ B 问诊一般从主诉开始，有目的、有序的进行
- ☒ C 问诊要全面，危重病人更应详细询问后再处理
- ☐ D 问诊中应注意与病人的非语言沟通

参考答案：C; 考生答案：C; 试题分数：2; 考生得分：2

2. 采集病史过程中，下列提问不妥的是：（ ）

- ☐ A 你病了多长时间了？

☐ 你感到哪儿不舒服？

☒ C 你的粪便发黑吗？

☐ D 你一般在什么时候发热？

参考答案：C；考生答案：C；试题分数：2；考生得分：2

3. 出现黑便提示一次上消化道出血量达：（ ）

☐ A 10~30ml 以上

☐ B 30~50ml 以上

☒ C 50~70ml 以上

☐ D 70~90ml 以上

参考答案：C；考生答案：C；试题分数：2；考生得分：2

4. 肾源性水肿的特点为：（ ）

☐ A 常伴颈静脉怒张、肝大等体循环淤血表现

☒ B 初为晨起眼睑与颜面水肿

☐ C 水肿发生前常有消瘦、体重减轻

☐ D 以低垂部位显著

参考答案：B；考生答案：B；试题分数：2；考生得分：2

5. 幽门梗阻所致呕吐的特点为：（ ）

☐ A 进餐后即刻发生

☐ B 剧烈呈喷射状

☒ C 多为宿食，常于夜间发生

☐ D 胃排空后仍干呕不止

参考答案：C；考生答案：C；试题分数：2；考生得分：2

6. 以口腔温度为例，超高热是指体温在：（ ）

☐ A 37.3~38℃

☐ B 38.1~39℃

☐ C 39.1~40℃

☒ 41℃以上

参考答案: D; 考生答案: D; 试题分数: 2; 考生得分: 2

7. 盗汗多见于: ()

☒ A 结核病

☐ B 虚脱

☐ C 甲状腺功能亢进

☐ D 维生素 A 缺乏

参考答案: A; 考生答案: A; 试题分数: 2; 考生得分: 2

8. 病人处于病理性睡眠状态, 唤醒后能正确回答问题和作出各种反应, 刺激停止后又很快入睡, 称为: ()

☐ A 意识模糊

☒ B 嗜睡

☐ C 昏睡

☐ D 谵妄

参考答案: B; 考生答案: B; 试题分数: 2; 考生得分: 2

9. 浅昏迷与昏睡最有价值的鉴别是: ()

☐ A 对光反射是否存在

☐ B 排便、排尿是否失禁

☐ C 吞咽反射是否存在

☒ D 病人能否被唤醒

参考答案: D; 考生答案: D; 试题分数: 2; 考生得分: 2

10. 多汗见于: ()

☐ A 休克

☐ B 脱水

☐ C 甲状腺功能亢进

☒ D 维生素 A 缺乏

参考答案: C; 考生答案: D; 试题分数: 2; 考生得分: 0

11. 强迫仰卧位见于：（ ）

- ☒ A 急性腹膜炎
- ☐ B 胆道蛔虫症
- ☐ C 心、肺功能不全
- ☐ D 脊椎疾病

参考答案：A；考生答案：A；试题分数：2；考生得分：2

12. 肿大的淋巴结常位于颈部，呈多发性，质地较硬，大小不等，可互相粘连，或与周围组织粘连，常见于：（ ）

- ☐ A 淋巴瘤
- ☐ B 恶性肿瘤淋巴结转移
- ☒ C 淋巴结结核
- ☐ D 白血病

参考答案：C；考生答案：C；试题分数：2；考生得分：2

13. 右锁骨上淋巴结肿大常见的癌肿转移为：（ ）

- ☒ A 肺癌
- ☐ B 胃或食管癌
- ☐ C 乳腺癌
- ☐ D 肝癌

参考答案：A；考生答案：A；试题分数：2；考生得分：2

14. 口唇呈樱桃红色见于：（ ）

- ☒ A 一氧化碳中毒
- ☐ B 心功能不全
- ☐ C 肺功能不全
- ☐ D 高铁血红蛋白血症

参考答案：A；考生答案：A；试题分数：2；考生得分：2

15. 左锁骨上淋巴结肿大常见的癌肿转移为：（ ）

- ☐ A 肺癌

☒ B 胃或食管癌

☐ C 乳腺癌

☐ D 肝癌

参考答案：B；考生答案：B；试题分数：2；考生得分：2

16. 口腔内有烂苹果味，见于：（ ）

☐ A 有机磷农药中毒

☒ B 糖尿病酮症酸中毒

☐ C 尿毒症

☐ D 肝性昏迷

参考答案：B；考生答案：B；试题分数：2；考生得分：2

17. 胸式呼吸运动减弱而腹式呼吸运动增强见于：（ ）

☐ A 腹膜炎

☐ B 大量腹水

☐ C 妊娠晚期

☒ D 胸腔疾病

参考答案：D；考生答案：D；试题分数：2；考生得分：2

18. 肺部叩诊呈过清音见于：（ ）

☒ A 肺气肿

☐ B 肺部大片炎症

☐ C 肺空洞

☐ D 气胸

参考答案：A；考生答案：A；试题分数：2；考生得分：2

19. 肺部叩诊呈鼓音，见于：（ ）

☐ A 肺空洞

☐ B 肺气肿

☒ C 气胸

☐ D 肺癌

参考答案: C; 考生答案: C; 试题分数: 2; 考生得分: 2

20. 正常人心尖搏动范围为: ()

☐ A 半径 2-2.5cm

☒ B 直径 2-2.5cm

☐ C 半径 0.5-1cm

☐ D 直径 1-2cm

参考答案: B; 考生答案: B; 试题分数: 2; 考生得分: 2

21. 心尖部第一心音增强见于: ()

☒ A 二尖瓣狭窄

☐ B 二尖瓣关闭不全

☐ C 主动脉瓣关闭不全

☐ D 甲亢

参考答案: A; 考生答案: A; 试题分数: 2; 考生得分: 2

22. 无脉主要见于: ()

☐ A 心包积液

☒ B 严重休克

☐ C 主动脉瓣狭窄

☐ D 室间隔缺损

参考答案: B; 考生答案: B; 试题分数: 2; 考生得分: 2

23. 触及奇脉常提示: ()

☐ A 右心衰

☐ B 主动脉瓣关闭不全

☒ C 缩窄性心包炎

☐ D 左心衰

参考答案: C; 考生答案: C; 试题分数: 2; 考生得分: 2

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/125301303230011330>