

2024 河南省驿城区《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背 200 题完整版附答案（完整版）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 患者，男，57 岁，因出现全身酸痛、乏力、高热等症状就诊。经流行病学调查及相关实验室检查，诊断为 H1N1 甲型流感。该患者可选用的神经氨酸酶抑制剂是

- A: 奥司他韦
- B: 利巴韦林
- C: 金刚乙胺
- D: 金刚烷胺

答案：A

2. 伴有高血压的患者应慎用的是

- A: 氯苯那敏
- B: 含伪麻黄碱的复方制剂
- C: 对乙酰氨基酚
- D: 阿司匹林

答案：B

3. 患者，男，66 岁，身高 170cm，体重 85kg，以“头晕、胸闷、乏力 1 周”为主诉入院治疗。空腹血糖 11.2mmol / L，餐后血糖 16.5mmol / L。诊断结果：2 型糖尿病。既往有磺胺类药过敏史，一直服用硝苯地平控释片、辛伐他汀片、阿司匹林肠溶片控制高血压和冠心病。医师处方：二甲双胍 0.5gbid、消渴丸 10 丸（规格 30g / 120 丸）bid、罗格列酮 4mgqd 治疗。

- A: 糖化血红蛋白（HbA1c）
- B: 空腹血糖
- C: 餐后血糖
- D: 白细胞计数

答案：A

4. 流行性结膜炎者宜选用的滴眼液是

- A: 色甘酸钠
- B: 维生素 B2
- C: 碘苷
- D: 磺胺醋酰钠

答案：C

5. 低危患者

- A: 先观察（血压及危险因素）数周，然后决定是否进行药物治疗
- B: 立即进行抢救治疗
- C: 立即使用抗高血压药物
- D: 观察相当一段时间，再决定是否进行药物治疗

答案：D

6. 以下有关高血压的药物治疗方案的叙述中，不正确的是

- A: 首先选用血管扩张剂和中枢性抗高血压药

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

- B: 采用最小有效剂量，根据需要可考虑逐渐增加
- C: 可采用两种或两种以上药物联合用药
- D: 药物治疗高血压时要考虑患者的合并症

答案：A

7. 抽烟可降低呋塞米的利尿作用，其主要原因是烟草中含有

- A: 烟碱
- B: 咖啡因
- C: 醛类成分
- D: 焦油

答案：A

8. 通过重整患者的医嘱或药疗方案，评估药物治疗的有效性、安全性和经济性，核查患者的用药依从性，属于

- A: 处方审核
- B: 药物治疗管理
- C: 药物利用研究和评价
- D: 药学干预

答案：B

9. “1 天给药 1 次；如需要立即达到治疗浓度，可首剂加倍”是针对

- A: 半衰期 8~24 小时的药品
- B: 半衰期大于 24 小时的药品
- C: 半衰期大于 30 小时的药品
- D: 半衰期小于 30 分钟的药品

答案：B

10. (2017 年真题) 患者，男 52 岁，身高 168cm，体重 85kg，痛风病史 6 年。近日因多饮、多尿就诊。实验室检查空腹血糖 7.8mmol/L (正常值: 3.9~6.1mmol/L)，餐后血糖 14.8mmol/L (正常值: <7.8mmol/L)，血尿酸 580 $\mu\text{mol/L}$ (正常值: 男性 180~440 $\mu\text{mol/L}$)，LDL-c 3.7mmol/L (正常值: 2.1~3.1mmol/L) 肌酐清除率 100ml/min。颈动脉彩超提示: 动脉粥样硬化有混合性脂质斑块。临床诊断 2 型糖尿病、痛风、高脂血症、动脉粥样硬化症。

- A: 心律失常
- B: 腹胀
- C: ALT 升高
- D: 低血糖

答案: B

11. 由美国卫生系统药师学会出版的三级文献是

- A: 《美国医院处方集服务处: 药物信息》
- B: 《马丁代尔药物大典》
- C: 《美国药典药物信息》
- D: 《新编药物学》

答案: A

12. 以下有关肝功能不全病人用药的叙述中，不正确的是

- A: 明确诊断，合理选药
- B: 静脉给药可不调整剂量
- C: 定期检查肝功能，及时调整治疗方案
- D: 避免或减少使用或合用对肝脏毒性大的药物

答案: B

13. 心力衰竭的风湿性心脏病禁用

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背 200 题题库，word 格式
可自由下载编辑，附完整答案！

A: 利尿剂

B: β 受体阻断剂

C: RAAS 抑制剂

D: 强心苷

答案：D

14. (2019 年真题) 通常开封启用 4 周后，不宜再继续使用的剂型是

- A: 含漱剂
- B: 直肠栓剂
- C: 软膏剂
- D: 滴眼剂

答案: D

15. 为使药物作用与胆固醇合成高峰期同步，普伐他汀等适宜

- A: 清晨服用
- B: 餐前服用
- C: 餐后服用
- D: 睡前服用

答案: D

16. (2015 年真题) 非甾体抗炎药引起的典型药源性疾病是 ()。

- A: 血液系统疾病
- B: 神经系统疾病
- C: 胃肠类疾病
- D: 肝病

答案: C

17. 非核苷酸类 HIV 逆转录酶抑制剂 ()

- A: NRTIs
- B: PIs
- C: NNRTIs
- D: FIs

答案: C

18. 美金刚的主要不良反应是

- A: 心律不齐
- B: 幻觉
- C: 呼吸抑制
- D: 血脂升高

答案：B

19. 下列处方中常见的外文缩写，其含义是"每晚用药"的是

- A: qh
- B: qs
- C: qd
- D: qn

答案：D

20. 低 HDL-C 血症，宜选用的药物是

- A: 他汀类
- B: 贝特类
- C: ω -3 脂肪酸
- D: 烟酸

答案：D

21. 女性，32 岁，3 年来月经量多，乏力、心悸。检查面色较苍白。血红蛋白 80g/L，呈小细胞低色素性贫血，白细胞 7×10^9

- A: 尽量空腹服用亚铁盐，以促进吸收
- B: 钙剂可促进铁剂吸收
- C: 碳酸氢钠抑制铁剂吸收
- D: 正常人维持体内铁平衡需要每天从食物摄铁 2~2.5mg

答案：C

22. 新生儿肾脏有效循环血量及肾小球滤过率较成人低

A: 30%~40%

B: 40%~50%

C: 20%~30%

D: 10%~20%

答案：A

23. 患者，女，32 岁，2 天前无明显诱因出现尿频、尿急、尿痛，伴腰痛。查体：T38℃，肾区叩击痛。血常规见 WBC $15 \times 10^9 / L$ ，中性粒细胞百分比 85%。尿常规见尿液浑浊，尿蛋白阳性，镜检白细胞满视野。

A: 急性肾盂肾炎

B: 急性膀胱炎

C: 急性肾小球肾炎

D: 慢性肾盂肾炎

答案：A

24. 胶囊壳染料可引起固定性药疹

A: 药物的使用

B: 药物制剂因素

C: 生活和饮食习惯

D: 生理因素

答案：B

25. (2016 年真题) 关于癌症疼痛患者止痛药使用原则的说法，错误的是 ()。

- A: 提倡无创给药方式，尽量口服
- B: 按阶梯给药
- C: 疼痛时用药，不痛时不需用药
- D: 应个体化用药

答案：C

26. 毒物引起严重腹泻者

- A: 禁止洗胃
- B: 不能催吐
- C: 不能用强利尿剂
- D: 不能导泻

答案：D

27. 治疗药物评价的内容，一般不包括的项目是：

- A: 经济型
- B: 依从性
- C: 安全性
- D: 有效性

答案：B

28. 药师调剂处方时必须做到"四查十对"。以下对"四查十对"的叙述中，不正确的是

- A: 查用药合理性，对临床诊断
- B: 查处方，对科别、姓名、年龄
- C: 查配伍禁忌，对药品性状、用法用量
- D: 查临床诊断，对用药适宜性

答案：D

29. 下列不属于痛风的非药物治疗方法的是

- A: 禁酒
- B: 保持理想体重
- C: 多饮水，每日保持尿量 2~3L
- D: 运动治疗

答案：D

30. 患者，男，70 岁，良性前列腺增生症病史 5 年，应用 α_1 肾上腺素能受体阻断剂特拉唑嗪治疗，可能导致的不良反应是

- A: 尿潴留
- B: 乳腺增生
- C: 干咳
- D: 体位性低血压

答案：D

31. 服用帕罗西汀等选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂的患者，如果欲更换用单胺氧化酶抑制剂，必须先停用（）

- A: 10 天
- B: 5 天
- C: 7 天
- D: 14 天

答案：D

32. 静脉滴注两性霉素 B 的适宜溶媒是

- A: 0.9%氯化钠注射液
- B: 5%葡萄糖注射液
- C: 复方氯化钠注射液
- D: 50%葡萄糖注射液

答案：B

33. 患者，女，59 岁，一月前患胃溃疡，近日查体发现血脂异常化验结果：TC7.2mmol/L，TG1.7mmol/L，LDL-C4.3mmol/L，ALT56U/L，AST80U/L。该患者首选的调脂药是()

- A: 阿昔莫司胶囊
- B: 非诺贝特片
- C: 普罗布考片
- D: 阿托伐他汀钙片

答案：D

34. 应在睡前服用，疗效较好的是

- A: 维生素 B1
- B: 硫酸镁
- C: 噻氯匹定
- D: 沙丁醇胺

答案：D

35. 以下所列“WHO 公布的有关艾滋病传播途径”中，不正确的是

- A: 蚊虫叮咬
- B: 母婴传播
- C: 吸毒
- D: 性行为

答案：A

36. 血红蛋白的正常值参考范围是

- A: 男性 120~160g/L，女性 110~150g/L
- B: 男性 100~160g/L，女性 90~150g/L

- C: 男性 100~150g/L, 女性 90~150g/L
D: 男性 110~150g/L, 新生儿 170~200g/L

答案: A

37. 目前推荐治疗失眠的一线药物为 ()

- A: 硝西泮
B: 多塞平
C: 艾司唑仑
D: 佐匹克隆

答案: D

38. 判别"大三阳"区别于"小三阳"的主要检查项目是

- A: 抗-HBe(+)
B: HBeAg(+)
C: 抗-HBc(+)
D: 抗-HBs(+)

答案: B

39. 门诊处方药品用量一般不宜超过

- A: 15 日用量
B: 7 日用量
C: 1 日用量
D: 3 日用量

答案: B

40. 静脉注射两性霉素 B 的适宜溶媒是

- A: 5%葡萄糖注射液
B: 复方氨基酸注射液

C: 50%葡萄糖注射液

D: 0.9%氯化钠注射液

答案：A

41. 下列关于口服阿仑膦酸钠使用注意事项的说法,错误的是()

A: 应避免同时使用两种双膦酸盐

B: 随餐服用,并大量饮水,可增加吸收、减少胃肠道刺激

C: 口服后 30 分钟内应保持立位或坐位

D: 食管炎为典型不良反应

答案：B

42. 属于 HIV 整合酶链转移抑制剂的是 ()

A: 多替拉韦

B: 洛匹那韦

C: 阿巴卡韦

D: 奈韦拉平

答案：A

43. 抗生素的理论效价指纯品的质量与效价单位的折算比率。以其特定的"盐"1 μg 作为 1IU 抗生素是

A: 链霉素

B: 红霉素

C: 土霉素

D: 四环素

答案：D

44. 患者，男，42 岁。患艾滋病，进行抗病毒治疗。以下药物不属于核苷酸类逆转录酶抑制剂的是

- A: 双脱氧胞苷
- B: 拉米夫定
- C: 替诺福韦
- D: 奈韦拉平

答案：D

45. 轻度冻疮患者可以选用的非处方药是

- A: 维 A 酸软膏
- B: 樟脑软膏
- C: 杆菌肽软膏
- D: 红霉素软膏

答案：B

46. 以下引起药源性疾病的影响因素中，主要是药物相互作用的是

- A: 二甘醇是"亮菌甲素"事件的祸首
- B: 服用阿司匹林引起哮喘、慢性荨麻疹
- C: 同服氟西汀与华法林的患者呈现牙龈出血
- D: 着色胶囊剂引起固定性药疹

答案：C

47. (2015 年真题) 患儿，女，4 岁半，身高 110cm，体重 15kg，一天前开始发热 (39.1℃)，咽稍痛，无咳嗽，无吐泻，家长在家选用退烧药对症治疗。发热 20h 左右出现腹泻，约 2~3h 一次大便，量少，黄色粘液便，呕吐 1 次。体格检查，T38.8℃，P118 次/分，R28 次/分，咽微充血。出现轻微脱水症状。双肺呼吸音清，腹平软，肝脾未触及，肠鸣音活跃。实验室检查：WBC $18.5 \times 10^9/L$ (参考值 $4.0 \times 10^9 \sim 10.0 \times 10^9$)，粪便镜检可见红、白细胞。

- A: 腹泻可致电解质丢失，故须特别注意补充

- B: 药用炭可以吸附细菌和毒素，可与抗生素同时服用
- C: 小檗碱和鞣酸蛋白不宜同时服用
- D: 首选口服补液，必要时静脉补液

答案：B

48. 有双侧肾动脉狭窄的高血压患者不宜选用

- A: 多沙唑嗪
- B: 卡托普利
- C: 哌唑嗪
- D: 维拉帕米

答案：B

49. 用于轻度内痔属风热及湿热下注所致的少量便血、肛门肿痛、下坠感的药物是

- A: 草木犀流浸液片
- B: 痔康片
- C: 金玄痔科熏洗散
- D: 九味痔疮胶囊

答案：B

50. (2019 年真题) 患者，女，80 岁，高血压病史 28 年，近日自觉感憋气，昨夜出现呼吸困难，不能平躺，喘憋，咳粉红色泡沫样痰，诊断为心力衰竭，应选用的药物是

- A: 氟桂利嗪
- B: 硝酸异山梨酯
- C: 呋塞米
- D: 胺碘酮

答案：C

51. 下列病痛中，不适宜应用解热镇痛药治疗的是

- A: 关节痛
- B: 肠绞痛
- C: 肌肉痛
- D: 牙痛

答案：B

52. 护士用药咨询的内容是

- A: 栓剂、气雾剂等外用剂型的正确使用方法
- B: 抗菌药物的合理使用
- C: 不宜选用氯化钠注射液溶解的药品
- D: 减肥、补钙、补充营养素

答案：C

53. 患者,女,49岁,近日因发热、咳嗽、咳黄痰就诊,临床诊断为下呼吸道细菌性感染,处方如下:

- A: 甲硝唑餐后服用
- B: 甲硝唑餐前服用
- C: 铋剂餐后服用
- D: 质子泵抑制剂餐后服用

答案：A

54. 接种乙肝疫苗可产生哪种抗体()。

- A: HBeAg
- B: HBeAb
- C: HBsAb
- D: HBsAg

答案：C

55. 下列药品中，属于药品类易制毒化学品的兴奋剂是

- A: 麻黄碱
- B: 芬太尼
- C: 可待因
- D: 螺内酯

答案：A

56. 患者，女，35 岁，因感冒所致流涕、咳嗽发热等症状到药店购药，药师应推荐的药品是()

- A: 氯苯那敏片
- B: 萘甲唑啉滴鼻液
- C: 对乙酰氨基酚片
- D: 酚麻美敏片

答案：D

57. 某男性，53 岁，参加婚礼后 5 小时突发左脚第 1 跖趾关节剧痛，3 小时后局部出现红、肿、热、痛和活动困难。实验室检查示血尿酸为 $500 \mu\text{mol/L}$ ；足部 x 线示非特征性软组织肿胀。

- A: 类风湿关节炎
- B: 假性痛风
- C: 痛风
- D: 风湿性关节炎

答案：C

58. (2016 年真题) 患者，女，5 岁，体重 25kg。两天前受凉后发热，最高体温 38.9℃，并伴有鼻塞、咳嗽、喷嚏、流鼻涕等感冒症状。家长到药店购买酚麻美敏口服溶液、小儿氨酚黄那敏颗粒、对乙酰氨基酚混悬滴剂和盐酸麻黄碱滴鼻液。

- A: 每天用药最多不应超过 5 次，用药不超过 3 天
- B: 每天用药最多不应超过 3 次，用药不超过 3 天
- C: 每天用药最多不应超过 4 次，用药不超过 3 天
- D: 每天用药最多不应超过 6 次，用药不超过 3 天

答案：C

59. 巴比妥类重度中毒时出现的中枢神经系统症状为

- A: 昏迷、血压降低、呼吸抑制、心动缓慢和晕厥
- B: 可引起狂躁发作
- C: 可见心律失常、心搏骤停
- D: 呼吸减慢、变浅不规则，或呈潮式呼吸

答案：B

60. 用药后不会出现畸形胎儿的时间是在受精后

- A: 15 天之内
- B: 15 天之后
- C: 20 天之内
- D: 10 天之后

答案：A

61. 儿童退热的用药选择和单次用量，正确的是()

- A: 对乙酰氨基酚 25~50mg/kg
- B: 阿司匹林 30~60mg/kg
- C: 对乙酰氨基酚 10~15mg/kg

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: 布洛芬 0.4~0.6g (12 岁以上儿童)

答案: C

62. 以下关于调剂资格的叙述正确的是

- A: 具有本科(药学或相关专业)以上学历即可从事处方调剂
- B: 具有专科(药学或相关专业)以上学历即可从事处方调剂
- C: 具有执业药师资格或取得药学专业技术职务任职资格者可从事处方调剂
- D: 具有中专(药学专业)以上学历即可从事处方调剂

答案：C

63. 患儿，男，6 个月，体重 9.0kg，平素健康，近日出现多汗、夜哭、易惊。体检：前囟平软，颅骨有乒乓球感，枕秃，肋骨串珠。人工喂养，尚未添加任何辅食，平素较少出门。

- A: 6000IU
- B: 4000IU
- C: 10000IU
- D: 400IU

答案：B

64. 杨某，男性，25 岁，间断上腹痛 2 年，表现为两餐之间出现上腹痛，持续至下餐进餐后缓解，以秋冬季多发。

- A: PPI+克拉霉素+阿莫西林+铝碳酸镁？
- B: PPI+西咪替丁+阿莫西林+铋剂？
- C: PPI+克拉霉素+呋喃唑酮？
- D: PPI+克拉霉素+阿莫西林+铋剂？

答案：D

65. (2015 年真题) 下列关于甲状腺功能减退患者激素替代治疗的说法，错误的是 ()。

- A: 服用过量可能出现甲状腺功能亢进症状
- B: 需要终身服药
- C: 左甲状腺素应于早餐前半小时空腹服用
- D: 妊娠期父母必须联合使用丙硫氧嘧啶

答案：D

66. 便秘患者长期使用可引起结肠黑变病的药物是

- A: 番泻叶
- B: 聚乙二醇 4000
- C: 硫酸镁
- D: 多库酯

答案：A

67. 抑制磷脂酶 A2，减少单核细胞和中性白细胞释放前列腺素和白三烯

- A: 丙磺舒
- B: 阿司匹林
- C: 秋水仙碱
- D: 别嘌醇

答案：C

68. 预混胰岛素 30R 的组成为()

- A: 70%超短效胰岛素，30%中效胰岛素
- B: 70%中效胰岛素，30%短效胰岛素
- C: 30%中效胰岛素，70%短效胰岛素
- D: 30%超短效胰岛素，70%中效胰岛素

答案：B

69. (2018 年真题) 患者, 女, 53 岁, 冠心病史 2 年, 目前服用硝酸异山梨酯、阿托伐他汀钙。近三个月因胃痛心境低落、有自杀倾向就诊, 临床诊断为消化性溃疡、抑郁症。给予奥美拉唑肠溶片 40mgqdp0 文拉法辛缓释片 150mgqdp0, 谷维素片 10mg tidpo 治疗, 患者用药后出现血压升高可能导致该患者血压升高的药物是 ()

- A: 奥美拉唑肠溶片
- B: 文拉法辛缓释片
- C: 阿托伐他汀钙片
- D: 硝酸异山梨酯片

答案: B

70. 患者, 女, 31 岁, 因丙型病毒性肝炎使用 α 干扰素联合利巴韦林治疗。下列关于用药期间避孕和备孕措施的说法, 正确的是 ()

- A: 干扰素、利巴韦林较为安全, 停药 3 个月后可备孕
- B: 干扰素、利巴韦林较为安全, 停药后即可备孕
- C: 干扰素、利巴韦林易引起畸胎或者胚胎致死效应, 治疗期间和治疗后 6 个月内, 必须采取避孕措施
- D: 干扰素、利巴韦林较为安全, 不必停药, 即可备孕

答案: C

71. 低比重尿主要见于

- A: 尿崩症
- B: 急性肾小球肾炎
- C: 糖尿病
- D: 急性肾衰竭少尿期

答案: A

72. 从疗效和费用等因素考虑, 应首选的 DMARDs 是

- A: 甲氨蝶呤
- B: 柳氮磺吡啶
- C: 青霉胺
- D: 来氟米特

答案：A

73.（2018 年真题）下列药物中，可以增加缺血性脑卒中发作风险的药物是（）

- A: 阿司匹林
- B: 口服避孕药
- C: 银杏叶片
- D: 叶酸

答案：B

74. 服用 α 受体阻断剂后，如果服用西地那非，建议服药间隔时间应为

- A: 4 小时
- B: 1 周
- C: 48 小时
- D: 24 小时

答案：A

75. 应用麻醉药利多卡因时宜

- A: 少食醋
- B: 不饮酒
- C: 不吸烟
- D: 少食盐

答案：C

76. 慢性肝炎尤其是肝硬化时，肝功能检查结果可能显示的是

- A: AST、ALT 同时上升
- B: AST 上升幅度高于 ALT
- C: ALT 上升幅度大
- D: AST 上升幅度大

答案：B

77. 药品浓度表示方法不当，归属于

- A: 产品缺陷
- B: 患者经济拮据
- C: 管理缺失
- D: 操作失误

答案：A

78. 患儿，男，3 岁半，身高 95cm，体重 16kg 一天前开始发热，20h 左右出现腹泻，约 3h 一次大便，量少，黄色黏液便，呕吐 1 次。检查结果：体温 38.8℃，脉搏 118 次/分，呼吸 28 次/分，出现轻微脱水症状，白细胞计数 $18.5 \times 10^9/L$ （参考值 $4.0 \times 10^9/L$ - $10.0 \times 10^9/L$ ），粪便镜检可见红、白细胞。

- A: 鞣酸蛋白
- B: 洛哌丁胺
- C: 药用炭
- D: 小檗碱

答案：B

79. 摄入过多可增加体内血容量，促发充血性心力衰竭或高血压的是

- A: 酒

B: 食盐

C: 食醋

D: 脂肪

答案：B

80. 医院获得性肺炎无感染高危因素患者的最常见病原体为

A: 大肠杆菌

B: 肺炎链球菌

C: 金黄色葡萄球菌

D: 流感嗜血杆菌

答案：B

81. 季节性过敏性鼻炎主要的诱因是

A: 尘埃

B: 季节

C: 真菌

D: 花粉

答案：D

82. (消化性溃疡并发症)，幽门梗阻

A: 疼痛性质改变，明显消瘦、贫血

B: 突发上腹剧痛，继而至全腹

C: 规律性上腹痛

D: 餐后加重的上腹胀痛，呕吐物有隔夜食物

答案：D

83. 可提示肝细胞性黄疸的是

A: $34.2 \mu\text{mol/L} \sim 171 \mu\text{mol/L}$

B: $17.1 \mu\text{mol/L} \sim 34.2 \mu\text{mol/L}$

C: $>342 \mu\text{mol/L}$

D: $17.1 \mu\text{mol/L} \sim 171 \mu\text{mol/L}$

答案：D

84. 药物治疗结核病的原则及早用药以利于杀灭结核菌株

A: 早期

B: 适量

C: 规律

D: 联合

答案：A

85. 填写具体；如患卵巢囊肿合并肺部感染注射头孢曲松引起不良反应，应填写肺部感染

A: 不良反应 / 事件的结果

B: 用药起止时间

C: 用药原因

D: ADR/ADE 过程描述

答案：C

86. 营养性巨幼细胞性贫血主要因为缺乏

A: 鞣酸

B: 叶酸和(或)维生素 B

C: 维生素 C

D: 白细胞

答案：B

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背 200 题题库，word 格式
可自由下载编辑，附完整答案！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/126145031054011030>