

血液透析专科习题（含答案）

一、单选题（共 100 题，每题 1 分，共 100 分）

1、（ ）应严格限制病人补液量，并准确记录 24 小时出入液量

- A、肾功能良好者
- B、留置尿管者
- C、大量蛋白尿
- D、尿潴留
- E、肾衰竭、尿少、全身水肿者

正确答案：E

2、中心静脉留置导管换药消毒范围直径（ ）

- A、>6cm
- B、>8cm
- C、>10cm
- D、>9cm
- E、>5cm

正确答案：C

3、血液透析患者出现下列哪些症状不是发生肾性骨病的指征（ ）

- A、高磷血症
- B、甲状旁腺亢进
- C、促红细胞生成素治疗抵抗
- D、高钙血症
- E、心力衰竭

正确答案：E

4、腹膜透析患者发生腹痛、腹胀的原因正确的是（ ）

- A、便秘、肠胀气
- B、腹腔压力增高
- C、透析液温度过高或过低
- D、透析液 PH 值正常
- E、透析液渗出

正确答案：C

5、GRF 下降到 70ml / min，血醛固酮增加几倍（ ）

- A、4 倍
- B、5 倍
- C、1 倍

D、3 倍

E、2 倍

正确答案：D

6、分子吸附再循环技术应用先用的透析技术，模拟肝脏解毒过程，通过（ ）和白蛋白透析技术，实现了选择性地有效清除体内代谢毒素的目的。

A、PMMA 膜

B、再生纤维素膜

C、MARS 膜

D、PAN 膜

E、醋酸纤维素膜

正确答案：C

7、血浆分离速度与跨膜压（TMP）大小呈正相关，临床中将 TMP 控制在（ ）

A、50-100mmHg 左右

B、180-200mmHg 左右

C、150-180mmHg 左右

D、250mmHg 以上

E、20-50mmHg 左右

正确答案：A

8、采用半自动复用程序，低通量透析器复用次数应不超过（ ）

A、8 次

B、6 次

C、5 次

D、7 次

E、9 次

正确答案：C

9、水处理设备系统中考虑砂滤罐堵塞，砂罐前后压力差大于（ ）

A、 $>2.5\text{kgf/cm}^2$

B、 $>1.5\text{kgf/cm}^2$

C、 $>2\text{kgf/cm}^2$

D、 $>1\text{kgf/cm}^2$

E、 $>0.5\text{kgf/cm}^2$

正确答案：E

10、一般情况下，主要影响收缩压高低的是（ ）

- A、外周阻力
- B、心包
- C、脉搏量
- D、心率
- E、大动脉弹性

正确答案：C

11、以下不属于血液净化中心护士工作职责内容的是（ ）

- A、熟练掌握血液透析机及各种血管通路的护理、操作
- B、透析中定期巡视患者，观察机器运转情况
- C、严格执行操作规程，透析医嘱
- D、做好透析记录
- E、负责透析病人干体重的确定

正确答案：E

12、血液透析适应症的疾病不包括（ ）

- A、脑出血
- B、急性肺水肿
- C、高胆红素血症
- D、难治性充血性心力衰竭
- E、肝性脑病

正确答案：A

13、监测内瘘血管通路功能的首选方法是（ ）

- A、内瘘自然血流量的测定
- B、动脉压
- C、再循环率
- D、静脉压
- E、跨膜压

正确答案：A

14、人工移植血管造瘘术后护理不正确的是（ ）

- A、手术后次日移植部位水肿明显
- B、术后应及时更换袖口宽松的卫衣
- C、防止切口感染
- D、手术后次日移植部位水肿不明显
- E、观察手术部位有无渗血

正确答案：D

15、呼气性呼吸困难的特点是（ ）

- A、三凹征
- B、呼吸浅快
- C、呼吸时间延长伴广泛哮鸣音
- D、劳累性呼吸困难
- E、鼻翼煽动

正确答案：C

16、下列哪项是颈内静脉置管的优点（ ）

- A、留置时间长
- B、易感染
- C、产生血栓
- D、对气管插管有影响
- E、易发生严重并发症

正确答案：A

17、自发性气胸的治疗应首选（ ）

- A、镇静止痛
- B、排气减压
- C、鼻塞给氧
- D、手术治疗
- E、镇咳祛痰

正确答案：B

18、目前临床上大多采用的 CRRT 机器治疗，都具有很好的监测与报警功能，静脉压报高的原因有（ ）

- A、静脉回路管道受阻
- B、静脉壶内滤网凝血堵塞
- C、患者静脉狭窄. 血栓形成. 中心静脉压增高
- D、患者侧卧体位. 静脉受压
- E、以上都是

正确答案：E

19、动静脉内瘘患者为预防血栓形成可以服用（ ）

- A、速力菲
- B、阿莫西林
- C、阿司匹林
- D、利伐沙班

E、博苏

正确答案：C

20、高血压是维持性血液透析患者的常见并发症，分为（ ）两类

A、A+B

B、A+B+C

C、肾素依赖性高血压

D、水钠潴留

E、容量依赖性高血压

正确答案：B

21、关于肺脓肿的病因及特征，下列选项正确的是（ ）

A、血源性肺脓肿的致病菌以链球菌最常见

B、吸人性肺脓肿常为多发性

C、支气管异物呼吸道阻塞是导致成人肺脓肿的重要因素

D、吸人性肺脓肿最为常见

E、急性肺脓肿以需氧菌感染占多数

正确答案：D

22、老年血液透析患者合并心血管系统疾病、肺心病，血液透析中血流量应控制在（ ）ml/分。

A、200-220

B、200-250

C、120-150

D、180-200

E、150-180

正确答案：E

23、患者女性，50 岁。幽门梗阻行持续胃肠减压半月余，每日补 10%葡萄糖 2500ml，5%葡萄糖盐水 1000ml，10%氯化钾 30ml。2 天前开始出现全腹膨胀，无压痛及反跳痛，肠鸣音消失，每日尿量 1500ml 左右，最可能的原因是（ ）

A、低钙血症

B、高钾血症

C、高钠血症

D、低钠血症

E、低钾血症

正确答案：E

24、低钾血症患者在补钾时尿量必须超过（ ）

- A、30ml/h
- B、20ml / h
- C、40ml / h
- D、5ml/h
- E、10ml/h

正确答案：A

25、普通肝素在血液透析结束前（ ）停止追加

- A、30--60min
- B、30min
- C、20--40min
- D、60min
- E、1--2 小时

正确答案：A

26、尿路器械检查或留置导尿引起肾盂肾炎的最常见的致病菌是（ ）

- A、螺旋杆菌
- B、大肠杆菌
- C、变形杆菌
- D、葡萄球菌
- E、副大肠杆菌

正确答案：D

27、患者女性，24 岁。因缺铁性贫血住院治疗，对患者进行饮食宣教，进食含铁丰富的食物。下列食物中含铁最少的是（ ）

- A、瘦肉
- B、牛奶
- C、木耳
- D、猪肝
- E、海带

正确答案：B

28、临终关怀是一个社会化的系统工程，需要（ ）的共同参与。

- A、只要医护人员
- B、只要政府部门
- C、患者本人
- D、全社会

E、只要家属

正确答案：D

29、临床上常用的肝素一般是多少单位（ ）

A、12500 单位

B、20000 单位

C、100 单位

D、10000 单位

E、5000 单位

正确答案：A

30、左心功能不全最早的表现是（ ）

A、夜间阵发性呼吸困难

B、劳力性呼吸困难

C、端坐呼吸

D、头昏、失眠

E、咳嗽咳痰

正确答案：B

31、采用局部枸橼酸钠抗凝时，不需要监测哪些项目（ ）

A、APTT

B、凝血功能 ACT

C、电解质

D、血气

E、血糖

正确答案：E

32、患者女性，78 岁。3 小时前突发心悸、喘憋、不能平卧，既往高血压病史 30 余年，医生确诊为高血压心脏病，急性左心衰，给予病人强心、利尿、扩血管等药物治疗，关于药物护理不正确的是（ ）

A、严格记录出入液量

B、加快输液速度以防止扩血管后发生低血压

C、注意电解质是否紊乱

D、观察患者有无恶心、呕吐、心悸、头痛等反应

E、硝普钠应每 4 小时重新配制一次

正确答案：B

33、动静脉内瘘使用时血流重复再循环率允许为多少时对透析效果影响不大（ ）

A、15-20%

B、20-30%

C、1-5%

D、10-15%

E、5-10%

正确答案：E

34、被 HBV 或 HCV 阳性患者血液、体液污染的利器刺伤，建议在（ ）小时内注射乙肝免疫高价球蛋白

A、12 小时

B、72 小时

C、36 小时

D、24 小时

E、48 小时

正确答案：D

35、透析液监测参数包括（ ）

A、流量

B、温度

C、以上都对

D、浓度（电导率）

E、压力

正确答案：C

36、患者女，25 岁，尿毒症病人，今日每天晨间出现恶心、呕吐，护士应如何指导患者（ ）

A、睡前食少许点心

B、晨间饮水 1-2 次

C、睡前勿进食，勿饮水

D、起床前先服止吐剂

E、睡前饮水 1-2 次

正确答案：E

37、对于老年血液透析患者，透析中持续性低血压者，应将透析液温度调到（ ）

A、35.0-35.5℃

B、36.5-37.0℃

C、35.5-36.5℃

D、37.0-37.5℃

E、35.5-36.0℃

正确答案：C

38、血液透析机体内出血的原因是（ ）

A、穿刺针固定不妥引起针头脱出

B、管路分支与机器连接不紧密

C、透析器漏血

D、患者全身肝素化

E、穿刺部位渗血

正确答案：D

39、以下关于浓缩液配制要求人员及使用时限不正确的是（ ）

A、浓缩B液应在配制后24小时内使用

B、透析浓缩液可由保洁员配制

C、透析浓缩液配制要专人核查登记

D、透析浓缩液应由经过培训的血透室护士或技术员实施

E、透析浓缩液配制要做好记录

正确答案：B

40、诊断急性肾盂肾炎最有价值的是（ ）

A、尿频、尿急、尿痛伴尿培养菌落计数大于10⁵/ml

B、尿频、尿急、尿痛伴亚硝酸盐试验阳性

C、畏寒、发热、腰痛伴尿培养菌落计数大于10⁵/ml

D、尿频、尿急、尿痛伴亚硝酸盐试验阴性

E、尿频、尿急、尿痛

正确答案：C

41、高通量血液透析减少β₂微球蛋白释放的机制在于（ ）

A、透析液流速快

B、对PTH清除量大

C、对透析用水和透析液质量要求高炎症因子和氧自由基释放减少，单核细胞分泌β₂微球蛋白减少

D、血流速快清除快

E、膜孔径大清除量加大

正确答案：C

42、下列哪项不属于糖尿病透析患者的眼部并发症（ ）

A、透析青光眼

- B、麦粒肿
- C、结膜炎
- D、眼底出血
- E、角膜炎

正确答案：B

43、肺气肿患者胸廓呈（ ）

- A、桶状胸
- B、一侧胸廓膨隆
- C、扁平胸
- D、漏斗胸
- E、鸡胸

正确答案：A

44、血透室医疗废弃物的管理不正确的是（ ）

- A、透析器管路预充 4 小时内使用
- B、为了节约费用，利器盒装满后再更换
- C、医疗废弃物放入黄色垃圾袋
- D、医疗垃圾袋每日定时更换
- E、废弃的透析相关卫耗材均按医疗废弃物处理

正确答案：B

45、透析用水的软水硬度及游离氯检测至少（ ）测定 1 次

- A、每月
- B、每年
- C、半年
- D、每天
- E、每周

正确答案：D

46、对病毒性心肌炎最有诊断价值的检查是（ ）

- A、心电图
- B、血清病毒中和抗体滴度
- C、胸部 X 线摄片
- D、超声心动图
- E、心音图

正确答案：B

47、库房室内的空气应（ ）消毒

- A、空气净化器
- B、臭氧
- C、紫外线
- D、消毒液
- E、红外线

正确答案：C

48、血液透析患者采用降压药治疗，建议控制血压于（ ）mmHg 以下比较合适

- A、150/80mmHg
- B、140/80mmHg
- C、130/80mmHg
- D、120/60mmHg
- E、140/90mmHg

正确答案：C

49、脓毒血症最适合的C R R T治疗模式（ ）

- A、C V V H D
- B、S C U F
- C、C V V H D F
- D、C H F D
- E、C V V H

正确答案：C

50、动静脉内瘘术后（ ）天拆线

- A、14~21 天
- B、10~14 天
- C、5~8 天
- D、3~5 天
- E、21~28 天

正确答案：A

51、慢性胃炎的临床表现是（ ）

- A、上腹痛或不适
- B、易饥饿感
- C、体重减轻
- D、黑便
- E、呕血

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/127120143025006040>