

产科专科护理理论考核试题

一、选择题

1. 心脏起搏点的正常位置是() [单选题]。

- A.房室结
- B.窦房结
- C.左束支
- D.右束支
- E.房室束

2. 试管婴儿是指() [单选题]。

- A.人工授精(AI)
- B.体外受精与胚胎移植(IVF-ETW)
- C.配子输卵管内移植(GIFT)
- D.配子宫腔内移植(GIUT)
- E.配子经阴道输卵管内移植(TV-GIFT)

3. 成人正常血钾浓度是() [单选题]。

- A. 0.5~1.0mmol/l
- B. 1~1.5mmol/l
- C. 2.5~3.0mmol/l
- D. 3.5~5.5mmol/l
- E. 6.5~7.0mmol/l

4 .心脏复苏的首选药物是（） [单选题]。

A.糖皮质激素

B.利多卡因

C.阿托品

D.碳酸氢钠

E.肾上腺素

5 .引起肾病综合征的病理生理反应不包括（） [单选题]。

A.低蛋白血症导致血浆胶体渗透压降低，水分外渗引起水肿

B.肝脏合成脂蛋白增加引起高脂血症

C.肾小球滤过膜通透性增加引起大量蛋白尿

D.肾素-血管紧张素分泌减少，小动脉收缩引起高血压

E.血浆蛋白从尿中丢失导致低蛋白血症

6 .雌激素的生理功能是（） [单选题]。

A.使子宫肌肉松弛

B.使子宫内膜由增生期变为分泌期

C.降低子宫对催产素的敏感性

D.使排卵后体温升高

E.使阴道上皮增生、角化、成熟

7 .出生时体重 2000g,该新生儿分类应属于（） [单选题]。

A.足月儿

8 .足月小样儿

C.正常体重儿

D.低出生体重儿 ✓

E.极低出生体重儿

9 .颅内压增高患者死亡的主要原因是（） [单选题]。

A.窒息

B.猝倒

C.脑疝 ✓

D.呼吸衰竭

E.循环衰竭

10 患者，女，50岁，因在家燃烧煤气取暖突然晕倒入院，患者面色潮红，口唇呈樱桃红色，脉快，多汗，

神志不清伴发热，确诊首选检查方法是（） [单选题]。

A.胸部CT

B.胸部核磁共振

C.血液碳氧血红蛋白测定 ✓

D.全血胆碱酯酶活力测定

E.脑电图检查

11 .闭合性损伤造成腹腔内出血的常见原因是（） [单选题]。

A.膀胱破裂

B.肠管破裂

C.肠系膜损伤

D.实质性脏器破裂 ✓

E.腹膜后血肿

12 .心脏骤停诊断的主要依据是（） [单选题] 。

- A.意识丧失
- B.无呼吸动作
- C.大动脉搏动消失,
- D.测不到血压
- E.瞳孔散大

13 .肛管周围脓肿是指（） [单选题] 。

- A.肛管直肠周围间隙感染所形成的脓肿 **V**
- B.内痔合并感染所形成的脓肿
- C.外痔合并感染所形成的脓肿
- D.直肠膀胱陷窝内的脓肿
- E.肛门旁粉瘤感染所形成的脓肿

14 .子宫颈癌的好发部位是（） [单选题] 。

- A.宫颈阴道部
- B.宫颈鳞柱状上皮交界处 **V**
- C.子宫颈管内
- D.子宫峡部
- E.子宫颈外口

15 .患者，女,29 岁。因车祸造成头部受力后仰引起颈椎骨折伴有脊髓损伤，该患者脊柱骨折的类型是

() [单选题] 。

- A.垂直压缩型
- B.屈曲牵拉型

C.屈曲压缩型

D.过伸型 ✓

E.屈曲型

16 .类风湿关节炎的叙述正确的（） [单选题]。

A.多累及大关节，愈后不佳

B.肾脏损害多见

C.是一种自身免疫性疾病 ✓

D.多数急性起病

E.男性发病多于女性

17 .长期无保护地接触 X 线可引起（） [单选题]。

A.骨脱钙

B.肺结核

C.骨髓抑制 ✓

D.表皮灼伤

E.营养不良

18 .有机磷农药引起中毒的机制是（） [单选题]。

A.高铁血红蛋白体内积蓄

B.交感神经过度兴奋

C.迷走神经过度兴奋

D.碳氧血红蛋白体内积蓄

E.胆碱酯酶活性受抑制 ✓

19 .患者,女,60岁。反复咳嗽,咳痰5年,以每年冬春季为重。1周前感冒后,出现逐渐加重的呼吸困难,查体:桶状胸,触觉语颤减弱,呼吸音降低,叩诊呈过清音,患者出现上述表现最可能的原因是（）

D.肺动脉瓣

E.联合瓣膜

22.原发性肾病综合征的病理生理变化不包括（） [单选题]。

A.水肿

B.大量糖尿 V

C.高脂血症

D.大量蛋白尿

E.低蛋白血症

23.患者，女，31岁。高处坠落，卢页前窝骨折，出现“熊猫眼征”，最可能的原因是（） [单选题]。

A.眼眶广泛淤血所致 ✓

B.耳后乳突区皮下出现淤血所致

C.枕下部出现皮下瘀血所致

D.颞部出现淤血所致

E.口部出现淤血所致

24 .1型糖尿病发病的机制是（） [单选题]。

A.老年人肾小管重吸收糖多

B.老年人肾小球排糖少

C.吃糖过多，短期无法排出

D.肝糖原快速释放糖

E.胰岛素分泌绝对不足 V

25 .尿道球部损伤的常见原因是（） [单选题]。

A.骨盆骨折

26 会阴部3奇跨伤 V

C.下腹部撞击

D.高处跌下

E.腹部挤压

26 .肾脏的结核感染主要来自于（） [单选题]。

A.肺结核 ✓

B.肠结核

C.骨结核

D.脑结核

E.淋巴结核

27 .我国肝硬化最常见的病因是（） [单选题]。

A.酒精中毒

28 乙型肝炎 ✓

C.胆汁淤积

D.化学毒物或药物

E.循环障碍

28.女性进入青春期的标志是（） [单选题]。

A.乳房丰满

B.阴毛、腋毛生长

C.月经初潮 ✓

D.皮下脂肪增多

E.声调变高

29.患者女，30岁。汽车撞伤左上腹4小时，面色苍白、肢端湿冷、脉搏细弱，血压70/50mmHg,诊断为

脾脏破裂合并休克。该患者的休克类型属于（） [单选题]。

A.低血容量性休克 ✓

B.感染性休克

C.心源性休克

D.过敏性休克

E.神经源性休克

30. 患儿,男,4个月,反复抽搐3天,抽搐期间神志不清,伴高热烦躁,临床诊断为化脓性脑膜炎,惊厥发作期间首选药物为() [单选题]。

A.苯巴比妥

B.水合氯醛

C.地西洋 ✓

D. 20%甘露醇

E.复发氯丙嗪

31 .对于低钾血症患者静脉补钾,最重要的参考指标是() [单选题]。

A.给药速度

B.给药浓度

C.患者尿量 ✓

D.用药总量

E.患者精神状态

32 .起于两侧子宫角的前面,终止于大阴唇前端,具有维持子宫前倾作用的韧带是() [单选题]。

A.子宫阔韧带

B.子宫主韧带

C.子宫圆韧带 ✓

D.骨盆漏斗韧带

E.子宫舐韧带

33 .下列属于甲类传染病的是（） [单选题]。

A.鼠疫、狂犬病

B.鼠疫、黑热病

C.炭疽、狂犬病

D.鼠疫、霍乱 ✓

E.霍乱、狂犬病

34 .患者，女，35岁。有风湿性心脏病史多年，近日出现胸闷、气促伴下肢浮肿，诊断为慢性心力衰竭。引起慢性心力衰竭最常见的诱因是（） [单选题]。

A.呼吸道感染 ✓

B.分娩

C.贫血

D.输液过多过快

E.情绪激动

35 .患者，男，33岁。胆总管结石病史5年。昨晚饱餐后突发上腹部持续剧烈疼痛，并向腰背部放射，伴恶心呕吐，呕吐物为胃内容物，吐后腹痛不缓解，来医院就诊。实验室检查：血清淀粉酶 650 U/L 。该患者最可能的诊断是（） [单选题]。

A.胰管结石

B.胆管结石 ✓

C.酗酒和暴饮暴食

D.急性胆囊炎

E.十二指肠液反流

36 .患者女，30岁，胸部严重创伤，伤后呼吸困难逐渐加重，胸壁处有一伤口，呼吸时气体只能进不能出，判断为（） [单选题]。

A.开放性气胸

B.闭合性气胸

C.多根肋骨骨折

D.单根肋骨骨折

E.张力性气胸 ✓

37 .目前认为吉兰-巴雷综合征的发病机制是（） [单选题]。

A.免疫功能缺陷性疾病

B.变态反应性疾病

C.过敏反应性疾病

D.结缔组织病

E.自身免疫性疾病，

38 .手指近端指间关节肿痛2年，加重2周，以类风湿关节炎收入院，医嘱给予泼尼松、布洛芬和青霉胺等药物治疗。现患者诉恶心、反酸和胃部，不适。护士向患者解释引起此症状的原因最可能的是（） [单选题]。

A.病情加重

B.青霉胺的不良反应

C.泼尼松的不良反应

D.布洛芬的不良反应，

E.未按照医嘱服药

39 .卵子从卵巢排出后,正常受精部位在() [单选题]。

A.输卵管峡部

B.输卵管壶腹部与峡部的连接处 **V**

C.输卵管伞部

D.输卵管间质部

E.子宫腔

40 .皮肤黏膜淋巴结综合征治疗时的首选药为() [单选题]。

A.青霉素

B.阿司匹林 **V**

C.丙种球蛋白

D.潘生丁

E.辅酶

41 .一氧化碳(Co)中毒的主要机制是() [单选题]。

A. CO 破坏红细胞膜

B. CO 与血红蛋白结合形成不能携带氧气的 COHb **V**

C. CO 破坏血红蛋白结构

D.CO 引起血液凝同性发生改变

E. CO 对脑细胞造成不可逆损伤

42 .阻塞性黄疸患者的尿液呈() [单选题]。

A.淡黄色

B.鲜红色

C.乳白色

D.黄褐色 ✓

E.红色或者棕色

43 .下列羊水栓塞的处理措施正确的是（） [单选题]。

A.解除肺动脉高压，纠正缺氧 ✓

B.立即终止妊娠，可提高治愈率

C.出血不止时，立即应用肝素抗凝

D.慎用肾上腺糖皮质激素

E.休克早期禁用低分子右旋糖酐

44 .应用 TAT 治疗破伤风的机制是（） [单选题]。

A.杀灭破伤风杆菌

B.解痉

C.中和游离毒素 ✓

D.提高人体免疫力

E.消除毒素来源

45 .血肌酐增高应考虑的是（） [单选题]。

A.肺功能不全

B.心功能不全

C.肾功能不全 ✓

D.甲亢

E.类风湿

46 .治疗新生儿破伤风，首选的抗生素是（） [单选题]。

A.红霉素

B.青霉素 ✓

C.氯霉素

D.庆大霉素

E.新霉素

47 .急腹症病人未明确诊断前应禁用（） [单选题]。

A.阿托品

B.安眠药

C.去痛片

D.吗啡 ✓

E.镇静药

48 .血清清蛋白显著降低应考虑的疾病是（） [单选题]。

A.肝硬化 ✓

B.肺炎

C.支气管炎

D.支气管哮喘

E.贫血

49 .对 ARDS 的诊断和病情判断有重要意义的检查是（） [单选题]。

A.肾功能监测

B.血流动力学监测

C.血气分析 ✓

D.X 线检查

E.心电图监测

50 .患者，女，35 岁。因觉心悸到医院行心电图检查，心电图结果为窦性心律、心率 125 次/分，诊断为心律失常，此患者的心律失常是（） [单选题]。

A.房性期前收缩

B.窦性心动过速 ✓

C.窦性心动过缓

D.窦性心律不齐

E.室性期前收缩

51 .决定心脏病患者是否妊娠，最重要的依据是（） [单选题]。

A.生育史

B.家族史

C.心脏病的种类

D.心功能分级 ✓

E.治疗情况

52 .急性腹膜炎发生休克的主要原因是（） [单选题]。

A.剧烈疼痛

B.麻痹性肠梗阻肠腔内积液

C.腹膜吸收大量毒素，血容量减少 ✓

D.原发病变

E.感染性休克

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/127133033153006041>