

2023-24 年山东省费县《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背 200 题附答案【典型题】

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 对多数药品而言，贮藏环境与药品保管的关系是

- A: 在 0℃ 以下时，温度越低，对保管越有利
- B: 在 2℃ 以上时，温度越低，对保管越有利
- C: 在 10℃ 以上时，温度越低，对保管越有利
- D: 在 8℃ 以上时，温度越低，对保管越有利

答案：B

2. 可引起尿液碱度增高的疾病是

- A: 痛风
- B: 代谢性碱中毒
- C: 呼吸性酸中毒
- D: 糖尿病

答案：B

3. 归属于药历“患者基本情况”内容的是

- A: 医保和费用支付情况
- B: 临床诊断
- C: 主要实验室检查数据
- D: 联合用药

答案：A

4. 药物相互作用包括发生在体内的药动学、药效学方面的作用；以及发生在体外的配伍变化，如引起理化反应使药品出现混浊、沉淀、变色和活性降低。

- A: 用药时同服甲氧氯普胺
- B: 依他尼酸合用华法林
- C: 磺胺类药与青霉素合用
- D: 抗酸药合用四环素类药

答案：B

5. (2018 年真题) 患者, 男, 58 岁, 体重 68kg, 高血压病史 5 年。5 天前出现咳嗽、咳痰, 伴发热, 入院查体 BP: 120/80mmHg, T38.9℃。化验结果: 白细胞计数 $14.6 \times 10^9/L$, 中性粒细胞百分比 86%。胸片示: 右下肺纹理增粗, 诊断为社区获得性肺炎, 青霉素皮试阳性。

- A: 莫西沙星
- B: 阿莫西林
- C: 氨苄西林
- D: 头孢吡肟

答案：A

6. 属于 B 级高危药品的是

- A: 50%葡萄糖注射液
- B: 血液透析液
- C: 5%葡萄糖注射液
- D: 全胃肠外营养液

答案：D

7. 患者正在使用的药物中, 可使血尿酸水平升高的是 ()

- A: 氢氯噻嗪和辛伐他汀

- B: 美托洛尔和辛伐他汀
- C: 美托洛尔和赖诺普利
- D: 氢氯噻嗪和阿司匹林

答案：D

8. 异环磷酰胺的主要毒副作用是（）

- A: 出血性膀胱炎
- B: 肺纤维化
- C: 心脏毒性
- D: 溶血性尿毒症

答案：A

9. （2017 年真题）治疗滴虫性阴道炎首选的药物是（）

- A: 伏立康唑片
- B: 吡喹酮片
- C: 甲硝唑栓
- D: 莫匹罗星软膏

答案：C

10. 过敏性肠炎、慢性菌痢等可引起

- A: 冻状便
- B: 米泔水样便
- C: 黏液便
- D: 稀糊状或水样粪便

答案：A

11. 消化不良患者宜选用

- A: 阿苯达唑

B: 乳果糖

C: 干酵母

D: 小檗碱

答案: C

12. 习惯性便秘

A: 开塞露

B: 比沙可啶

C: 羧甲基纤维素钠

D: 乳果糖

答案: B

13. 抗抑郁药物的合理使用适合治疗伴有焦虑症的抑郁患者的药物是

A: 丙米嗪

B: 帕罗西汀

C: 氟伏沙明

D: 阿米替林

答案: B

14. 患者，男，55岁，因支气管哮喘使用倍氯米松-福莫特罗干粉吸入剂治疗，症状控制良好，5个月内无急性发作，拟进行降级治疗。关于哮喘降级治疗原则的说法，错误的是

A: 通常每3个月减少倍氯米松剂量25%~50%

B: 首先降低激素剂量，再减少使用频率

C: 以最低剂量的福莫特罗维持治疗，直到最终停药

D: 降级治疗应选择适当时机，需避开患者呼吸道感染等情况

答案: C

15. (2019 年真题) 患者，女，45 岁，常有上腹部饱胀、恶心食欲不振等消化不良症状。宜选用的药物

- A: 复方阿嗝米特肠溶片
- B: 蒙脱石散
- C: 干酵母片
- D: 奥美拉唑肠溶胶囊

答案：C

16. 上消化道出血 (>50ml) 可呈现

- A: 白陶土便
- B: 柏油黑便
- C: 鲜血便
- D: 乳凝块便

答案：B

17. 患者，男，30 岁，因反复发作呼吸困难，咳嗽、胸闷入院。每年春季发作，持续 3 年，查体：双肺满布哮鸣音，HR80 次 / 分，律齐，无杂音。

- A: 慢性支气管炎合并肺气肿
- B: 阻塞性肺气肿
- C: 支气管哮喘
- D: 慢性支气管炎

答案：C

18. 布桂嗪属于

- A: 血管扩张药
- B: 镇痛药
- C: 抗组胺药

D: 利尿剂

答案：B

19. 消化不良很常见，半数以上人群在生命过程中曾因此病症而就诊，其主要症状有上腹饱胀、食欲缺乏等表现。

A: 雷尼替丁

B: 莫沙必利

C: 复方阿嗝米特肠溶片

D: 胰酶片

答案：A

20. 单纯饮食控制及体育锻炼治疗无效的 2 型糖尿病患者宜选用

A: 二甲双胍

B: 胰岛素

C: 格列本脲

D: 大剂量碘剂

答案：A

21. 痉挛性便秘可选

A: 比沙可啶

B: 乳果糖

C: 聚乙二醇粉

D: 硫酸镁

答案：C

22. 以下所列药物中，一般不会导致蛋白尿的是

A: 青霉素

B: 庆大霉素

C: 甲氨蝶呤

D: 多粘菌素

答案: A

23. 普萘洛尔联用硝苯地平抗高血压的机制是

A: 减少不良反应

B: 协同作用

C: 敏感化作用

D: 拮抗作用

答案: A

24. 其含量用生育酚当量表示的是

A: 维生素 D

B: 维生素 B

C: 维生素 E

D: 维生素 A

答案: C

25. 急性痛风性关节炎期首选药物是

A: 秋水仙碱

B: 苯溴马隆

C: 碳酸氢钠

D: 别嘌醇

答案: A

26. 适宜餐前给药的药物是

A: 复方铝酸铋

B: 法莫替丁

C: 缬沙坦

D: 二甲双胍

答案: A

27. 利巴韦林的通用名是

A: 阿霉素

B: 克毒星

C: 无环鸟苷片

D: 病毒唑

答案: D

28. 静脉滴注红霉素的适宜溶媒是

A: 0.9%氯化钠注射液

B: 50%葡萄糖注射液

C: 5%葡萄糖注射液

D: 复方氯化钠注射液

答案: C

29. 患者，女，65岁，52岁绝经，自诉腰痛半年，加重2月，腰椎影像学检查提示腰2和腰3椎体压缩性骨折，骨密度检查提示重度骨质疏松，既往有高血压、高脂血症和系统性红斑狼疮，长期口服缬沙坦80mgqd，阿托伐他汀20mgqn，阿司匹林10mgqd和泼尼松7.5mgqd。1个月前因反流性食管炎加用奥美拉唑20mgqd。否认不良嗜好，否认食物药物过敏史。

A: 阿司匹林

B: 泼尼松

C: 缬沙坦

D: 阿托伐他汀

答案：B

30. 患者女性，40 岁，既往有风湿性心脏病史，近 2 年来出现劳力性呼吸困难，1 天前因受凉出现发热、咳嗽，咳痰、咯血，头晕、心悸，不能平卧，查体：半卧位，口唇发绀，肺部湿性啰音。心脏体征：肺动脉瓣听诊区第二心音亢进及舒张期奔马律。

- A: 大叶性肺炎
- B: 急性心肌炎
- C: 急性左心衰竭
- D: 支气管哮喘

答案：C

31. 喝茶可降低多价金属离子、生物碱、苷类、胃蛋白酶、四环素类等药物的疗效，其机制主要是它们结合茶中的

- A: 鞣酸
- B: 咖啡因
- C: 蛋白质
- D: 茶碱

答案：A

32. 可卡因属于兴奋剂中的

- A: 麻醉药品
- B: β 受体阻断剂
- C: 精神刺激剂
- D: 利尿剂

答案：C

33. 通过阻断 β 受体，同时具有血管扩张作用的非苷类药物是

- A: 地高辛
- B: 卡维地洛
- C: 米力农
- D: 洋地黄毒苷

答案：B

34. 婴儿治疗佝偻病时，维生素 D 的初始口服剂量一般为

- A: 400IU (10 μ g) / d
- B: 2000~4000IU (50~100 μ g) / d
- C: 600IU (15 μ g) / d
- D: 8001200IU (20~30 μ g) / d

答案：B

35. 除常规检查外，需要检查有无瘪粒、变形、膨胀等变质现象的制剂是

- A: 丸剂
- B: 注射剂
- C: 软膏剂
- D: 胶囊剂

答案：D

36. 非霍奇金淋巴瘤的 CHOP 方案中不包括的治疗药物是

- A: 长春新碱
- B: 环磷酰胺
- C: 利妥昔单抗
- D: 阿霉素

答案：C

37. 患者,女,72 岁,有青霉素过敏史。主诉尿痛、尿频,尿常规检查示大量白细胞,尿细菌数 105cfu/m,诊断为急性膀胱炎。应选用的药物是

- A: 复方磺胺甲噁唑片
- B: 阿奇霉素片
- C: 莫西沙星片
- D: 阿莫西林胶囊

答案: A

38. 患者男性,45 岁,反复发作夜间呼吸困难 1 个月,加重 1 天就诊。体格检查:血压 180 / 110mmHg,呼吸急促,双肺散在哮鸣音,双肺底细湿啰音,心率 130 次 / 分。

- A: 肺炎还是肺间质纤维化
- B: 慢性支气管炎还是急性支气管炎
- C: 肺心病还是冠心病
- D: 支气管哮喘还是心源性哮喘

答案: D

39. 用于对组织无刺激性药物

- A: 腔内注射
- B: 肌内注射
- C: 静脉注射
- D: 动脉注药

答案: B

40. 患者,女,65 岁,因乳腺癌接受第二周期化疗。禁用的止吐药物是 ()

- A: 甲氧氯普胺
- B: 苯海拉明

C: 地塞米松

D: 昂丹司琼

答案: A

41. 长期使用后突然停药，可能引发心跳过速、心肌梗死的兴奋剂是

A: 人生长激素

B: 可卡因

C: 普萘洛尔

D: 麻黄碱

答案: C

42. 患者,男,65岁,因腹胀,呕吐就诊,医生处方,甲氧氯普胺片 20mg tid po 该处方属于()

A: 有禁忌证用药

B: 有配伍禁忌

C: 用法、用量不适宜

D: 无适应证用药

答案: C

43. 新生儿白细胞计数的正常范围值

A: $(11.0 \sim 12.0) \times 10^9/L$

B: $(15.0 \sim 20.0) \times 10^9/L$

C: $(10.0 \sim 20.0) \times 10^9/L$

D: $(3.5 \sim 10.0) \times 10^9/L$

答案: B

44. 患者，男，35 岁。于中饭后即开始有胃部疼，胀满食少，现感觉脐周硬、闷痛拒按，于 1 日无改善情况下，前来医院就诊。诊断结果：因饱食而导致的继发性消化不良。

- A: 莫沙必利
- B: 胰酶片
- C: 六味安消散
- D: 多潘立酮

答案：D

45. 上市前临床试验观测的指标限于实验设计内容，其他临床指标容易忽视，属于

- A: 管理漏洞
- B: 病例数目少
- C: 考察不全面
- D: 观察时间短

答案：C

46. 口服或静滴 β 受体阻断剂用于解救

- A: 麦角胺中毒
- B: 异烟肼中毒
- C: 瘦肉精中毒
- D: 亚硝酸盐中毒

答案：C

47. (2019 年真题) 患者，男，34 岁，有吸毒史。因过量使用阿片类药物昏迷入急诊抢救，表现为针尖样瞳孔、呼吸抑制，可选用的解救药物是

- A: 二巯丙醇

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

B: 维生素 K

C: 纳洛酮

D: 亚甲蓝

答案：C

48. 可致直立性低血压的抗焦虑药物为（）

A: 劳拉西泮

B: 丁螺环酮

C: 氟西汀

D: 阿米替林

答案：D

49. 切勿嚼碎、咀嚼，宜在进餐时用水吞服，不宜睡前吞服的 IBS 治疗药物是

A: 地芬诺酯

B: 匹维溴铵

C: 环孢素 A

D: 蒙脱石散

答案：B

50. 对急性心肌梗死引起的室性心律失常首选

A: 地高辛

B: 硝酸酯类

C: 普萘洛尔

D: 利多卡因

答案：D

51. 患者,女,25 岁,临床诊断为癫痫,给予丙戊酸钠 200mg tid 治疗。关于患者用药教育的说法错误的是 ()

- A: 不要随意增减剂量
- B: 必要时监测血药浓度
- C: 发作次数增多时应及时复诊
- D: 应于每日三餐前服用药物

答案: D

52. 过量服用维生素 D 导致中毒的典型临床表现是

- A: 骨质疏松或骨折
- B: 骨骼发育不良或骨软化
- C: 横纹肌溶解或肌痛
- D: 间质性肾炎或肾结石

答案: D

53. 关于丁螺环酮治疗焦虑症的优点, 下列说法不正确的为

- A: 镇静作用轻
- B: 起效快
- C: 较少引起运动障碍
- D: 无呼吸抑制

答案: B

54. 以下选项中, 属于长效类巴比妥类镇静催眠药的是 ()。

- A: 异丁巴比妥
- B: 戊巴比妥
- C: 苯巴比妥
- D: 异戊巴比妥

答案: C

55. 提示"药物都应保存在原始包装中，并不要将瓶外的标签撕掉"，是针对

- A: 药品有效期
- B: 药品贮存
- C: 特殊剂型用法
- D: 特殊装置药品

答案：B

56. 低张力性便秘

- A: 羧甲基纤维素钠
- B: 比沙可啶
- C: 开塞露
- D: 乳果糖

答案：C

57. 需要适当增加苯妥英、苯巴比妥的给药剂量，是由于

- A: 血容量增加使血浆白蛋白浓度降低
- B: 激素分泌改变，药物代谢也受影响
- C: 胃肠活动减弱，使吸收减慢
- D: 妊娠晚期血流动力学发生改变

答案：B

58. 哺乳期妇女泌尿道感染应该选用的药物是

- A: 依托红霉素
- B: 米诺环素
- C: 氨苄西林
- D: 磺胺嘧啶

答案：C

59. (2018 年真题) 由带状疱疹所致的严重后遗神经痛, 应选的药物是
()

- A: 芬太尼透皮贴剂
- B: 卡马西平片
- C: 羟考酮缓释片
- D: 对乙酰氨基酚片

答案：B

60. 《中国药典》规定可在室温干燥并于避光处保存的药品是

- A: 金双歧 (双歧杆菌-乳杆菌三联活菌)
- B: 美常安 (枯草杆菌二联活菌)
- C: 培菲康 (双歧杆菌三联活菌)
- D: 聚克 (复方乳酸菌)

答案：B

61. II 度烫伤的临床表现为

- A: 局限性蚕豆或指甲大小的紫红色肿块, 边缘鲜红, 中央青紫
- B: 红斑性, 皮肤变红, 并有火辣辣的刺痛感
- C: 水疱性, 患处产生水疱
- D: 全层皮肤甚至肌肉或骨头坏死, 皮肤变色, 最后呈黑色

答案：C

62. 可引起血红蛋白减少的疾病为

- A: 肾移植术后发生排斥反应
- B: 胃溃疡
- C: 糖尿病

D: 过敏性疾病如支气管哮喘、荨麻疹等

答案：B

63. (2018 年真题) 患者, 女, 68 岁, 体重 45kg, 因发热、咳嗽咳痰入院治疗, 临床诊断为社区获得性肺炎。化验结果: 白细胞计数

$11.76 \times 10^9/L$, 肌酐清除率 $18\text{ml}/\text{min}$ 。该患者使用下列抗菌药物治疗时不需要减量的是 ()

A: 左氧氟沙星

B: 头孢噻肟钠

C: 莫西沙星

D: 阿莫西林

答案：C

64. 缺铁性贫血、铅中毒贫血是由于

A: 血红蛋白生成减少

B: 红细胞丢失过多

C: 红细胞生成减少

D: 红细胞生成过多

答案：A

65. 可显著升高 HDL-ch 的是

A: 依折麦布

B: 他汀类与烟酸联用

C: 依曲康唑

D: 螺内酯

答案：B

66. 老年人服用可能出现锥体外系反应的药物是

- A: 哌替啶
- B: 双嘧达莫
- C: 甲氧氯普胺
- D: 苯二氮䓬类药

答案：C

67. 成年人血清中低密度脂蛋白胆固醇含量是

- A: 0.56~1.70mmol / L
- B: 1.03~2.07mmol / L
- C: 2.1~3.1mmol / L
- D: 3.1~5.7mmol / L

答案：C

68. 患者，男，72岁，以“间断发热、纳差、精神抑郁半年，再发高热1天”为主诉入院，既往体健，无高血压、糖尿病、冠心病史。入院时查体：T36.9℃，P88次/分，R22次/分，BP112/77mmHg，可触及颈部、锁骨上、腋下多部位浅表淋巴结肿大。经实验室检查、影像学检查，确诊为非霍奇金淋巴瘤。

- A: 抗肿瘤药物选择在每个疗程的第一天给药
- B: 抗肿瘤药物均采用静脉给药
- C: 每21天为1个疗程
- D: 根据患者的体重计算抗肿瘤药物给药剂量

答案：D

69. 患者，女，58岁，有2型糖尿病病史，因头疼、头晕就诊。体征和实验室检查：餐前血糖7.8mmol/L，餐后血糖11.2mmol/L，糖化血红蛋白8.8%，血压166/96mmHg，蛋白尿>1g/24h。推荐在降糖的基础上合并选用

- A: 赖诺普利
- B: 氢氯塞嗪
- C: 二甲双胍
- D: 特拉唑嗪

答案：A

70. 融合抑制剂

- A: 利托那韦
- B: 依非韦伦
- C: 齐多夫定
- D: 利巴韦林

答案：D

71. 患者，男，22 岁，2 天前因淋雨后出现发热，体温最高达 39℃。经实验室和 X 线胸片检查，临床诊断为社区获得性肺炎，无其他基础疾病。可首选的抗菌药物是

- A: 阿莫西林
- B: 亚胺培南-西司他丁
- C: 阿米卡星
- D: 阿奇霉素

答案：A

72. 易吸湿的药品

- A: 可贮存于严密的药箱内
- B: 根据不同性质要求，分别存放在阴凉处、凉暗处或冷处
- C: 用棕色或黑色纸包裹的玻璃器包装
- D: 可用玻璃瓶软木塞塞紧、蜡封、外加螺旋盖盖紧

答案：D

73. 肠外营养 1g 脂肪能提供的热量是

- A: 7kcal
- B: 9kcal
- C: 4kcal
- D: 3kcal

答案：B

74. 导致血糖异常、糖尿病的是

- A: 阿托伐他汀
- B: 己烯雌酚
- C: 加替沙星
- D: 罗非昔布

答案：C

75. (2015 年真题) 静脉注射两性霉素 B 的适宜溶媒是 ()。

- A: 复方氯化钠注射液
- B: 5%葡萄糖注射液
- C: 0.9 氯化钠注射液
- D: 50%葡萄糖注射液

答案：B

76. 患者，男，48 岁。十二指肠溃疡病史 2 年，近感头痛、眩晕而就诊。查体：血压 160/100mmHg。经一段时间观察及定期检查后，医师诊断为高血压病。

- A: 氢氯噻嗪
- B: 可乐定
- C: 利血平

D: 胍屈嗪

答案: C

77. 患者，女，51 岁，体检时发现血压 160 / 105mmHg，糖耐量试验餐后 2 小时血糖为 9.56mmol / L（正常参考范围 <7.8mmol / L），三酰甘油 1.52mmol / L（正常参考范围 0.56~1.70mmol / L），总胆固醇 6.26mmol / L（正常参考范围 <5.2mmol / L），低密度脂蛋白胆固醇 4.85mmol / L（正常参考范围 2.1~3.1mmol / L），高密度脂蛋白胆固醇 1.20mmol / L（正常参考范围 1.20~1.65mmol / L），血肌酐 50 μ mol / L（正常参考范围 45~84 μ mol / L），蛋白尿（++）。临床诊断为高血压病、高脂血症、糖耐量异常。

A: 依那普利

B: 氢氯噻嗪

C: 特拉唑嗪

D: 复方利血平

答案: A

78. 肾衰竭者不能

A: 催吐

B: 实施血液净化

C: 强利尿

D: 洗胃

答案: C

79.（2016 年真题）从事驾车、高空作业的患者不宜服用的药物是（）

。

A: 对乙酰氨基酚

B: 布洛芬

C: 伪麻黄碱

D: 氯苯那敏

答案：D

80. 药源性疾病是由药物诱发的疾病，是指在预防、诊断、治疗或调节生理功能过程中出现与用药有关的人体功能异常或组织损伤所引起的一系列临床症状。引起药源性疾病的因素主要有患者因素、药物因素。

A: 氯霉素在新生儿体内蓄积呈现灰婴综合征

B: 肾病患者服用呋喃妥因可引起周围神经炎

C: 口服避孕药致阿米替林的清除率下降

D: 服用阿司匹林出现哮喘、慢性荨麻疹等

答案：C

81. 收集所有质量可靠的随机对照试验经分析属于

A: 四级证据

B: 三级证据

C: 一级证据

D: 二级证据

答案：C

82. 小儿呼吸道感染可服用琥乙红霉素颗粒，剂量为 30~50mg/(kg·d)，分 3~4 次服用，一位体重为 20kg 的儿童一次剂量应为

A: 175~250mg 或 125~225mg

B: 225~375mg 或 200~300mg

C: 200~333mg 或 150~250mg

D: 215~350mg 或 175~270mg

答案：C

83. 醛固酮受体拮抗剂螺内酯久用引起的主要不良反应是

- A: 多毛症
- B: 水肿
- C: 低钾血症
- D: 高钾血症

答案：D

84. 尿液是人体泌尿系统排除的代谢废物，正常人每日排出尿液 1000～3000ml。其中 97% 为水分，而在 3% 的固体物质中，主要含有两大类物质：有机物（尿素、尿酸、肌酐等蛋白质代谢产物）和无机物（氯化钠、磷酸盐、硫酸盐、铵盐等）。

- A: 氯化铵
- B: 硫酸镁
- C: 氯化钾
- D: 氯化钠

答案：A

85. 稳定型心绞痛发作时的治疗选用

- A: 氯贝丁酯
- B: 硝酸甘油
- C: 低分子肝素
- D: 阿司匹林

答案：B

86. 以下药物中，用于治疗细菌感染性腹泻应首选的是

- A: 黄连素

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背 200 题题库，word 格式
可自由下载编辑，附完整答案！

B: 抗生素

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/127140011056010024>