

2024上半年广东韶关市乐昌市社会福利院招聘笔试冲刺题库含答案详解

一、A1型题（每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

1、男性，35岁，右侧甲状腺单发结节3cm×2cm，术中病理报告为甲状腺乳头状癌。最合适的进一步处理应该是（ ）。

- ☐ A. 缝合切口，结束手术
- ☐ B. 术后放射性碘治疗
- ☐ C. 化学药物治疗
- ☐ D. 右侧甲状腺全切和对侧大部切除
- ☐ E. 双侧全切加颈部淋巴廓清术

『正确答案』
D
『答案解析』
暂无解析。

2、有双侧肾上腺皮质增生，并可引起高血压、低血钾的疾病包括（ ）。

- ☐ A. 原发性醛固酮增多症
- ☐ B. 主动脉缩窄
- ☐ C. 肾血管性高血压
- ☐ D. 嗜铬细胞瘤
- ☐ E. 肾实质性高血压

『正确答案』
A
『答案解析』
A项，原发性醛固酮增多症是指肾上腺皮质增生或肿瘤分泌过多醛固酮所致的综合征。因醛固酮具有保钠、保水、排钾作用，其中水钠潴留导致高血压，尿排钾增多导致低钾血症。因此原醛症的特点就是低血钾＋高血压。B项，主动脉缩窄多为先天性血管畸形，特点为上肢血压高与下肢血压不高或降低的反常现象，主动脉造影可确定诊断。C项，肾血管性高血压是指双侧或单侧肾动脉主干或分支狭窄而引起的高血压。其特点为高血压伴上腹部和背部肋脊角处有高调血管杂音。D项，嗜铬细胞瘤起源于嗜铬细胞的肿瘤，可间断或持续地释放过多的儿茶酚胺。典型的发作表现为阵发性血压升高伴心动过速。E项，肾实质性高血压是最常见的继发性高血压，由各种肾脏疾病引起。其特点是在发现血压升高时，已经有尿改变和肾功能不全。

3、下列选项不是妄想特点的是（ ）。

- ☐ A. 无事实依据但坚定不移的相信
- ☐ B. 内容与个人利益安全密切相关
- ☐ C. 具有个人特征，不同于集体共有的信念
- ☐ D. 内容受个人经历和时代背景影响
- ☐ E. 是一种虚幻的知觉体验

『正确答案』
E
『答案解析』
妄想具有三大特点即个人独有（不能同他人分享的，不同于集体共有的）、自我卷入（内容与自己的利益安全密切相关）、病态的坚信（无事实依据但坚定不移），其内容常受个人经历和时代背景的影响。虚幻的知觉体验为幻觉。

4、对人来说，HLA分子属于（ ）。

- ☐ A. 异种抗原
- ☐ B. 同种异型抗原
- ☐ C. 改变的自身抗原

- ☐ D. 隐蔽抗原
- ☐ E. 肿瘤相关抗原

『正确答案』

B

『答案解析』

HLA分子是基因产物，具有抗原性，是医学上重要的同种异型抗原。

5、压缩性骨折，最常发生于（ ）。

- ☐ A. 肱骨头
- ☐ B. 股骨头
- ☐ C. 椎体
- ☐ D. 腕舟状骨
- ☐ E. 足舟状骨

『正确答案』

C

『答案解析』

压缩性骨折好发松质骨，如椎体。

6、法洛三联症患者严重的程度主要取决于（ ）。

- ☐ A. 肺动脉狭窄的程度
- ☐ B. 室间隔缺损的大小
- ☐ C. 室间隔缺损的部位
- ☐ D. 主动脉骑跨的程度
- ☐ E. 右心室肥厚的程度

『正确答案』

A

『答案解析』

法洛三联症由肺动脉狭窄、室间隔缺如、主动脉骑跨、右心室肥厚四种畸形组成。其中决定发绀程度的是肺动脉狭窄程度。肺动脉狭窄多伴有右室流出道狭窄，或有主肺动脉及其分支的狭窄，甚至缺如，导致右心室压力高，右向左分流加重。

7、早期诊断化脓性关节炎，最有确诊价值的检查是（ ）。

- ☐ A. 血沉
- ☐ B. 血培养
- ☐ C. X线照片
- ☐ D. 血细胞计数及分类
- ☐ E. 关节穿刺及关节液检查

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

8、哪一种药物能防止和逆转慢性心功能不全引起的心室肥厚并能降低病死率？（ ）

- ☐ A. 米力农
- ☐ B. 地高辛
- ☐ C. 氢氯噻嗪
- ☐ D. 硝普钠
- ☐ E. 卡托普利

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/12715404210006064>