

2024 江苏省兴化市《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试真题题库（预热题）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 患者，女，76 岁，慢性阻塞性肺病病史 10 年年来多次因急性加重入院，予以抗感染等治疗。近日因咳嗽咳痰加重再次入院，经验性抗感染治疗时适宜选用的药物是（）

- A: 阿米卡星
- B: 头孢唑林
- C: 头孢他啶
- D: 阿奇霉素

答案：C

2. 可帮助人短时间内急速降低体重

- A: 蛋白同化制剂
- B: 肽激素类
- C: 利尿剂
- D: 麻醉药品

答案：C

3. 适用于伴有前列腺体积增大的良性前列腺增生症的是（）

- A: 奥昔布宁
- B: 特拉唑嗪
- C: 米多君
- D: 非那雄胺

答案：D

4. 冠心病二级预防的“ABCDE”方案中，“A”是指

- A: 健康教育和运动
- B: β 受体阻断剂和血压控制
- C: 阿司匹林和 ACEI
- D: 控制饮食和糖尿病

答案：C

5. 能刺激骨骼、肌肉和组织生长发育的是

- A: 麻醉药品
- B: 肽类激素
- C: 蛋白同化激素
- D: 利尿剂

答案：B

6. 将药物治疗成本和所产生的效益归化为以货币为单位的数字，从而进行药物经济学评价，这一评价方法属于

- A: 最小成本分析
- B: 成本-效用分析
- C: 成本-效果分析
- D: 成本-效益分析

答案：D

7. 万古霉素 0.5g 加入 5%葡萄糖注射液 100ml 中静脉滴注要求滴注时间不得少于 1h，已知每毫升 15 滴，每分钟最多可滴注的滴数约是()

- A: 15 滴
- B: 7 滴
- C: 25 滴

D: 50 滴

答案：C

8. (2018 年真题) 患者, 男, 38 岁, 因腹部受寒胃脘疼痛, 应选用的药物是 ()

A: 山莨菪碱

B: 卡马西平

C: 麦角胺咖啡因

D: 布洛芬

答案：A

9. 运动员在比赛前使用可快速降低体重, 但容易导致脱水甚至休克的兴奋剂是

A: 氢氯噻嗪

B: 可待因

C: 人促红细胞生成素

D: 苯丙酸诺龙

答案：A

10. 从患者安全、环境污染和医务人员职业暴露多角度降低风险的是

A: 参与临床药物治疗

B: 处方调配

C: 静脉药物配置

D: 治疗药物监测

答案：C

11. 队列研究试验结果属于循证医学证据级别

A: 1 级证据

B: 4 级证据

C: 2 级证据

D: 3 级证据

答案: C

12. 患者，男，72 岁，因腰痛无法起床 1 天就诊。患者已有多年的腰痛病史，经物理疗法后可有所好转。现于久坐之后起立困难，行走为小步慢行，昨夜睡眠正常，早晨自觉腰痛而无法起床。既往无抗癫痫药、抗甲状腺药及糖皮质激素长期服用史。经 X 线检查诊断为腰椎压缩性骨折。

A: 维生素 D+雌激素+钙剂

B: 维生素 D+双膦酸盐类+钙剂

C: 维生素 C+双膦酸盐类+钙剂

D: 维生素 D+雷洛昔芬+钙剂

答案: B

13. 以下有关肌酸激酶检查值升高的临床意义中，最正确的是

A: 诊断急慢性白血病

B: 诊断痛风

C: 诊断恶性贫血

D: 诊断心肌梗死

答案: D

14. 缓解视疲劳可选用的药物是()

A: 酞丁安滴眼液

B: 羟甲基纤维素钠滴眼液

C: 色甘酸钠滴眼液

D: 氧氟沙星滴眼液

答案：B

15. 阿昔洛韦用于肾功能不全患者应（）

- A: 在危及生命时方可使用
- B: 避免应用
- C: 减量使用
- D: 加量使用

答案：C

16. 已知 1%(g/ml) 枸橼酸钠溶液的冰点降低值为 0.185°C ，计算其等渗溶液的浓度是

- A: 3.0(%g/ml)
- B: 2.4(%g/ml)
- C: 2.6(%g/ml)
- D: 2.8(%g/ml)

答案：D

17. 患者，女，35 岁，在不知怀孕的情况下服用诺氟沙星胶囊。经询问，获知其服药时间距末次月经时间是 20 天。该用药行为对胎儿可能造成的影响是（）

- A: 腭裂
- B: 流产或发育成正常胚胎
- C: 牙齿色素沉着
- D: 骨骼发育异常

答案：B

18. 下列药师承接的用药咨询内容中，多由患者提出的是

- A: 药品适应证

B: 自我保健

C: 治疗药物监测

D: 新药信息

答案：A

19. 患儿，女，5 岁，误服香豆素灭鼠药，可选用的解救药物是（）

A: 二巯丙醇

B: 纳洛酮

C: 亚甲蓝

D: 维生素 K

答案：D

20. （2019 年真题）用后不宜马上进食的剂型是

A: 软膏剂

B: 含漱剂

C: 直肠栓剂

D: 滴眼剂

答案：B

21. 目前推荐的绝经激素治疗窗口期是

A: 绝经后 5 年之内

B: 绝经后 15 年之内或 60 岁以后

C: 60 岁以后

D: 绝经后 10 年之内或 60 岁以前

答案：D

22. 下列药物中属于溶栓药物的是（）

A: 利伐沙班

- B: 血凝酶
- C: 华法林
- D: 阿替普酶

答案: D

23. 抑制近端肾小管对尿酸盐的重吸收，使尿酸排出增加，减少尿酸沉积

- A: 别嘌醇
- B: 秋水仙碱
- C: 阿司匹林
- D: 丙磺舒

答案: D

24. 服药后应保持上身直立的药物是

- A: 去氨加压素
- B: 硫酸亚铁
- C: 阿仑膦酸钠
- D: 阿莫西林

答案: C

25. 患者，女，58岁，既往无心脏病、高血压、糖尿病病史及手术史。

日前体检：身高 160cm，体重 70kg；白细胞 $8.0 \times 10^9/L$

- A: 二甲双胍
- B: 非诺贝特
- C: 辛伐他汀
- D: 格列齐特

答案: A

26. 耳蜗神经损伤及耳毒性

- A: 庆大霉素
- B: 氯霉素
- C: 阿奇霉素
- D: 米诺环素

答案：A

27. 患者，女，72 岁，因为呼吸困难，心悸、乏力入院。查体：心率 32 次/分，心脏扩大，肝-颈静脉回流征阳性，肝脏肿大，双下肢对称性肿大。既往有心肌梗死及血管神经性水肿病史。实验室检查：血肌酐 200 $\mu\text{mol/l}$ ，血钾 2.5 $\mu\text{mol/l}$

- A: 美托洛尔
- B: 卡托普利
- C: 地高辛
- D: 伊伐布雷定

答案：C

28. 患者，男，57 岁，患有冠心病、抑郁症、2 型糖尿病，用药包括二甲双胍、阿托伐他汀、圣约翰草提取物、阿卡波糖、阿司匹林。近日患者在家人陪同下去郊区旅游，日晒后暴露部位的皮肤出现红斑、丘疹，伴灼热、痒痛感，疑与用药有关。最可能引起该过敏反应的药物是

- A: 圣约翰草提取物
- B: 阿托伐他汀
- C: 二甲双胍
- D: 阿卡波糖

答案：A

29. 《药物事实与比较》属于

- A: 药品标准
- B: 药物相互作用
- C: 药物综合信息
- D: 药品不良反应

答案: C

30. 患者因股癣前来药店购药，不宜推荐的药物是

- A: 复方苯甲酸软膏
- B: 氢化可的松乳膏
- C: 酮康唑乳膏
- D: 联苯苄唑乳膏

答案: B

31. 激动 β_1 受体，对急性心衰疗效较好的是

- A: 地高辛
- B: 氨力农
- C: 硝普钠
- D: 多巴酚丁胺

答案: D

32. 吸烟后使平喘作用减退、维持时间缩短的药物是

- A: 胰岛素
- B: 西咪替丁
- C: 氯丙嗪
- D: 呋塞米

答案: D

33. 服用后容易引起结晶尿，药师在指导用药时应告知患者多饮水的药物是：

- A: 红霉素
- B: 阿奇霉素
- C: 磺胺甲恶唑
- D: 头孢呋辛

答案：C

34. 循证医学的证据分级中，"结果一致的 II、III 级临床研究结论或 I 级临床研究的推论"为几级证据

- A: C 级
- B: D 级
- C: A 级
- D: B 级

答案：D

35. 二甲双胍用于非糖尿病患者的减肥

- A: 非适应证用药
- B: 盲目联合用药
- C: 过度治疗用药
- D: 超适应证用药

答案：D

36. 药师在接受护士用药咨询时，应重点关注的内容是

- A: 药品经济学知识
- B: 药品的生产厂商和批号
- C: 注射剂的配制和滴注速度等
- D: 药物制剂的等效性

答案：C

37. ADR 报告表对不良反应的主要临床表现和体征进行明确、具体的描述；如过敏性皮疹的类型、性质、部位、面积大小等；所对应的项目是

- A: 不良反应 / 事件的结果
- B: 用药起止时间
- C: ADR / ADE 过程描述
- D: 用药原因

答案：C

38. (2016 年真题) 患者，女，55 岁，因“反复发作胸骨后疼痛 2 年，伴反酸，胃灼热，间断积食”而就诊。食管测压提示食管下括约肌 (LES) 压力 $< 6\text{mmHg}$ ，结合胃镜检查结果，临床诊断为胃食管反流病，医师处方：奥美拉唑肠溶片 20mgbid 强化抑酸治疗。

- A: 餐中多饮水
- B: 戒烟酒
- C: 控制体重
- D: 避免高脂饮食

答案：A

39. 静脉滴注给药前不宜选用氯化钠注射液溶解或稀释，以免出现浑浊的药品是

- A: 依托泊苷
- B: 多烯磷脂酰胆碱
- C: 阿昔洛韦
- D: 瑞替普酶

答案：B

40. 影响胎儿甲状腺功能，导致死胎的药物是

- A: 维生素 D
- B: 丙硫氧嘧啶
- C: 维生素 A
- D: 氯霉素

答案：B

41. （2018 年真题）患者突发心前区压榨性疼痛，立即取出硝酸甘油片，正确的使用方法是（）

- A: 清晨服用
- B: 用温水调服
- C: 应同时碱化尿液
- D: 舌下含服

答案：D

42. （2019 年真题）患儿，男，1 岁 4 个月，家长为预防幼儿缺钙，每日给患儿服用维生素 D5000IU，3 个月后患儿出现乏力、恶心、呕吐、食欲不振等症状，化验结果：血钙 18mg/dl，25-OH-D3 水平 632ng/ml。诊断为维生素 D 中毒，下列处理措施错误的是

- A: 停用维生素 D 及强化食品
- B: 停用钙剂
- C: 增加日晒
- D: 停饮牛奶

答案：C

43. 二巯丙醇用于解救

- A: 有机磷中毒

- B: 水银中毒
- C: 氰化物中毒
- D: 吗啡中毒

答案：B

44. 药师应具备的素质中，开展药学服务工作的关键是()。

- A: 交流沟通能力
- B: 高尚的职业道德
- C: 药历制订、修改
- D: 良好的教育背景

答案：A

45. 属于整合酶抑制剂(II)进入抑制剂的是

- A: 扎西他滨
- B: 沙奎那韦
- C: 恩夫韦替
- D: 奈韦拉平

答案：C

46. 高热不退、头痛、谵妄以致昏迷

- A: 胃肠型
- B: 神经型
- C: 病毒型
- D: 肺炎型

答案：B

47. 从事药学服务的药师应具备沟通能力，此项要求的重要性不包括

- A: 可使患者获得有关的用药指导

- B: 可提高患者用药的依从性和满意度
- C: 是药师实施药学服务的基本技能
- D: 可杜绝投诉事件

答案: D

48. 欲用 95%乙醇和蒸馏水配置 70%乙醇 1000ml，所取 95%乙醇体积约为：

- A: 665ml
- B: 500ml
- C: 737ml
- D: 700ml

答案: C

49. 因作用弱，常与其他利尿药合用的是

- A: 氢氯噻嗪
- B: 甘露醇
- C: 呋塞米
- D: 阿米洛利

答案: D

50. 治疗高血压伴稳定性心绞痛何种药物为宜

- A: β -受体阻滞剂
- B: 利血平
- C: 硝苯地平
- D: 甲基多巴

答案: A

51. 患混合型高脂血症，治疗时可与 ω - 3 脂肪酸制剂联合应用的调脂药是

- A: 依折麦布
- B: 氯贝丁酯
- C: 辛伐他汀
- D: 烟酸类

答案：C

52. 诊断为输尿管结石，给予黄体酮，应评判为

- A: 过度治疗用药
- B: 无正当理由超适应证用药
- C: 有禁忌证用药
- D: 联合用药不适宜

答案：B

53. 患者于 1 周前无诱因出现咳嗽，咳嗽为阵发性，痰少，呈白色黏液性，不易咳出，同时出现发热，体温多在夜间升高，38℃左右，无畏冷、寒战、胸痛、咳血等，于卫生院治疗后，未见好转，并有气喘、气促，活动后呼吸困难等症状。入院治疗诊断为：肺炎。

- A: 米诺环素
- B: 链霉素
- C: 克拉霉素
- D: 阿奇霉素

答案：B

54. 以下毒物中毒，清醒者适宜口服吐根糖浆催吐的是

- A: 氯硝西泮
- B: 阿米替林

C: 磷化锌

D: 苯巴比妥

答案: B

55. 成年人血清中低密度脂蛋白胆固醇含量是

A: 3.1~5.7mmol / L

B: 2.1~3.1mmol / L

C: 0.56~1.70mmol / L

D: 1.03~2.07mmol / L

答案: B

56. 沟通技能在药学服务工作中最重要的作用是

A: 双向交流作用

B: 应对投诉作用

C: 用药教育作用

D: 药品警戒作用

答案: A

57. 一般不会出现中性粒细胞增多的中毒事例是

A: 乙醇中毒

B: 铅中毒

C: 催眠药中毒

D: 汞中毒

答案: A

58. 适用于年轻、震颤明显患者的是

A: 苯海索

B: 恩托卡朋

C: 司来吉兰

D: 左旋多巴

答案: A

59. 关于口腔溃疡药物治疗的说法,错误的是 ()

A: 复方甘菊利多卡因凝胶局部涂敷,一日 3 次,稍加按摩。

B: 西地碘含片,一次 6mg 一日 4 次含服

C: 氯己定如含漱液,每次 15-20ml,一日 2~3 次含漱

D: 补充复合维生素 B 和维生素 C 有利于促进溃疡面愈合

答案: B

60. 阿司匹林

A: 血红蛋白量增多

B: 嗜酸性粒细胞减少

C: 中性粒细胞减少

D: 血小板减少

答案: D

61. 血液具有输送营养、氧气、抗体、激素和排泄废物及调节水分、体温、渗透压、酸碱度等功能。成人的血液占体重的 8%~9%。血液中的成分分为血浆(无形成分)和细胞(有形成分)两大部分。在正常情况下,血细胞主要包括红细胞、白细胞、粒细胞、淋巴细胞、血小板等。

A: <30g/L

B: 61~90g/L

C: 31~60g/L

D: >90g/L

答案: A

62. 选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂

- A: 阿米替林
- B: 舍曲林
- C: 艾司唑仑
- D: 丁螺环酮

答案：B

63. 患者，女，28 岁，妊娠 27 周，头晕 3 天。入院查体：血压 160 / 100mmHg。诊断为：妊娠高血压。

- A: 葡萄糖酸钙注射液
- B: 甲氧氯普胺注射液
- C: 尼莫地平注射液
- D: 硫酸镁注射液

答案：D

64. 急性胰腺炎发病几小时，血清淀粉酶达到高峰

- A: 48～72
- B: 12～72
- C: 1
- D: 2～12

答案：B

65. 下列药源性疾病中，其诱因主要是"性别因素"的是

- A: 灰婴综合征是氯霉素在新生儿体内蓄积所致
- B: 羟化酶缺乏者服用一半剂量的苯妥英钠呈现引起神经毒性
- C: 口服避孕药致阿米替林清除率下降
- D: 老年人应用普萘洛尔可诱发头痛、眩晕、低血压等不良反应

答案：C

66. 癫痫大发作首选

- A: 苯妥英钠
- B: 丙戊酸钠
- C: 卡马西平
- D: 拉莫三嗪

答案：A

67. 处方中“合剂”的规范书写是

- A: Mist
- B: Dos
- C: Liq
- D: Dil

答案：A

68. 马来酸氯苯那敏（扑尔敏）用于良性前列腺增生症患者，导致尿潴留，属于

- A: 过度治疗用药
- B: 无适应证用药
- C: 有禁忌证用药
- D: 超适应证用药

答案：C

69. 妊娠 5 个月后用何种抗菌药物会使婴儿牙釉质发育不全、牙齿黄染

- A: 青霉素
- B: 大环内酯类
- C: 氟喹诺酮类
- D: 四环素类

答案：D

70. 肝脏具有十分重要和复杂的生理功能。首先是人体内各种物质代谢和加工的中枢，其次是有生物转化和解毒功能，所有进入人体的药物或毒物，都会在肝脏发生氧化、还原、水解、结合等化学反应，最后以原形药或代谢物的形式排出体外。

- A: 阿莫西林
- B: 苯巴比妥
- C: 辛伐他汀
- D: 异丙嗪

答案：C

71. 关于粪胆原和粪隐血叙述正确的是

- A: 正常情况下，粪便中的粪胆原检查呈阳性反应
- B: 只有在消化道出现溃疡的情况下，才会粪隐血呈阳性
- C: 一般情况下，粪便中可见红细胞，但检测结果通常为阴性
- D: 粪胆原大部分以原形的形式经直肠被排出体外

答案：A

72. 患儿，男，3岁半，身高95cm，体重16kg一天前开始发热，20h左右出现腹泻，约3h一次大便，量少，黄色黏液便，呕吐1次。检查结果：体温38.8℃，脉搏118次/分，呼吸28次/分，出现轻微脱水症状，白细胞计数 $18.5 \times 10^9/L$ （参考值 $4.0 \times 10^9/L$ ~ $10.0 \times 10^9/L$ ），粪便镜检可见红、白细胞。

- A: 每次腹泻后均要少量多次喝水，直至腹泻停止
- B: 应避免高脂肪、高糖饮食
- C: 若症状不能改善，可及时加用诺氟沙星
- D: 若患者腹泻加重，可口服补液盐进行补液

答案：C

73. 以下所述"处方调配规范四查"中，不正确的是

- A: 查适应证
- B: 查处方
- C: 查药品
- D: 查配伍禁忌

答案：A

74. 外用杀精剂的主要活性成分为（）

- A: 壬苯醇醚
- B: 甲地孕酮
- C: 米非司酮
- D: 黄体酮

答案：A

75. 强烈刺激作用致胃肠黏膜腐蚀性损伤的是

- A: 氯化锌
- B: 氯化钠
- C: 磷化氢
- D: 磷化锌

答案：A

76. 属于拓扑异构酶抑制剂是

- A: 培美曲塞
- B: 放线菌
- C: 顺铂
- D: 依托泊苷

答案：D

77. 属于 5α 还原酶抑制剂的是

- A: 黄酮哌酯
- B: 雌三醇
- C: 氟他胺
- D: 依立雄胺

答案：D

78. 癫痫全面性发作首选

- A: 布桂嗪
- B: 丙戊酸钠
- C: 多奈哌齐
- D: 佐匹克隆

答案：B

79. 患者，女，24 岁，已婚，因痤疮购药咨询，应告知患者对育龄妇女有严重的致畸作用，药师不应推荐的治疗药物是

- A: 阿达帕林凝胶
- B: 异维 A 酸片
- C: 过氧化苯甲酰凝胶
- D: 红霉素乳膏

答案：B

80. 秋水仙碱具有严重的毒副作用，痛风急性发作期使用秋水仙碱治疗时，出现严重中毒前驱症状应立即停药，停药指征是

- A: 肌肉抽搐
- B: 紫癜

C: 血小板减少

D: 胃肠道反应

答案: D

81. 可引起驾驶员嗜睡的药物是

A: 阿米洛利

B: 抗过敏药

C: 双嘧达莫

D: 东莨菪碱

答案: B

82. 患者,女,53岁,冠心病史2年,目前服用硝酸异山梨酯、阿托伐他汀钙。近三个月因胃痛心境低落、有自杀倾向就诊,临床诊断为消化性溃疡、抑郁症。给予奥美拉唑肠溶片 40mgqdpo 文拉法辛缓释片 150mgadpo,谷维素片 10mg tidpo 治疗,患者用药后出现血压升高可能导致该患者血压升高的药物是()

A: 文拉法辛缓释片

B: 阿托伐他汀钙片

C: 硝酸异山梨酯片

D: 奥美拉唑肠溶片

答案: A

83. 仅用于绝经后妇女,不适用于男性患者的抗骨质疏松药物是

A: 帕米磷酸二钠

B: 雷洛昔芬

C: 骨化三醇

D: 阿法骨化醇

答案: B

84. 毒物引起严重腹泻者

- A: 不能导泻
- B: 不能催吐
- C: 禁止洗胃
- D: 不能用强利尿剂

答案：A

85. 患者，女，51 岁，近期出现失眠、潮热、出汗、烦躁等不适症状，临床诊断为围绝经期综合征，在使用激素替代治疗之前应先排除禁忌证。下列情况属于禁忌证的是

- A: 子宫内膜增生
- B: 严重肝功能障碍
- C: 癫痫
- D: 胆囊疾病

答案：B

86. 过敏性肠炎可出现()。

- A: 脓血便
- B: 鲜血便
- C: 脓状便
- D: 稀糊便

答案：C

87. 妊娠 5 个月后用何种药物会使婴儿牙釉质发育不全，牙齿黄染的抗菌药是

- A: 青霉素

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

B: 大环内酯类

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/128001026043007022>