

2022 年河南省驻马店市统招专升本医学综合 自考预测试题(含答案)

学校:_____ 班级:_____ 姓名:_____ 考号:_____

一、单选题(100题)

1.肝素抗凝血的主要作用机理是 ()

A.抑制 X 因子激活 B.增强抗凝血酶III的活性 C.促进纤维蛋白溶解 D.
去除 Ca^{2+} E.抑制血小板的作用

2.当心脏处于全心舒张期时()

A.心室达到最大充盈

B.房室瓣关闭

C.心室容积不变

D.动脉瓣关闭

E.心室内压略高于心房内压

3.上腹部膨隆的原因中,下列错误的是()

A.A.骨癌 B.骨扩张 C.肝左叶肿大 D.脾大 E.胰腺肿瘤

4.二尖瓣关闭不全的超声心动图特点不包括 ()

A.左房增大

B.左室增大

C.室壁运动减弱

D.多普勒超声检查于左房侧可探及二尖瓣口的反流信号

E.如有二尖瓣脱垂，可见收缩期瓣叶脱入左房，CD段呈“吊床样”改变

5. 在诊治疾病过程中，下列哪项不属于诊断学的基本内容（ ）

A.询问病史 B.体格检查 C.心电图测试 D.药物治疗 E.尿常规检测

6.血浆 pH 主要取决于哪种缓冲对（ ）

A. $\text{KHCO}_3 / \text{H}_2\text{CO}_3$

B. $\text{K}_2\text{HPO}_4 / \text{KH}_2\text{PO}_4$

C. $\text{NaHCO}_3 / \text{H}_2\text{CO}_3$

D. $\text{Na}_2\text{HPO}_4 / \text{NaH}_2\text{PO}_4$

E.蛋白质—Na / 蛋白质

7. 肾小球滤过的原尿流经下列哪一部分后，其成分将不再变化而成为终尿

A.近球小管 B.髓袢降支 C.髓袢升支 D.远曲小管 E.集合管

8.动眼神经损伤会引起（ ）

A.眼内斜视 B.眼内斜视和瞳孔缩小 C.眼外斜视和瞳孔缩小 D.眼外斜视和瞳孔散大 E.眼内斜视和瞳孔散大

9. 肝脏扩张性搏动常见于

A.正常人 B.肝炎 C.肝癌 D.二尖瓣关闭不全 E.主动脉瓣关闭不全

10.诊断急性阑尾炎的重要依据是（ ）

A.Murphy 征阳性 B.McBurney 点有显著而固定的压痛和反跳痛 C.上腹部压痛 D.脐周压痛 E.右下腹疼痛

11. 脑桥内与脑神经相关的核团是（ ）

A.脑桥核 B.楔束核 C.上泌涎核 D.下泌涎核 E.下橄榄核

12. 白细胞分类中，淋巴细胞百分比为（ ）

A.10%~30% B.20%~40% C.30%~50% D.0.1 E.0.25

13.支配眼轮匝肌的神经是（ ）

A.A. 动眼神经 B. 滑车神经 C. 展神经 D. 面神经 E. 眼神经

14.代谢性酸中毒原发改变为（ ）

A. $[\text{HCO}_3^-]$ 增多

B. $[\text{HCO}_3^-]$ 减少

C. $[\text{H}_2\text{CO}_3]$ 增多

D. $[\text{H}_2\text{CO}_3]$ 减少

E. $\text{P}(\text{CO}_2)$ 增高

15. 下列关于肠鸣音的叙述，正确的是（ ）

- A.机械性肠梗阻时肠鸣音亢进
- B.正常人的肠鸣音 6~10/min
- C.麻痹性肠梗阻时肠鸣音活跃
- D.电解质紊乱时不影响肠鸣音
- E.胃肠道大出血时肠鸣音减弱

16.月经的发生与下列哪种因素有关（ ）。

- A.血液中前列腺素的浓度降低
- B.血液中孕酮和雌二醇水平下降
- C.血液中孕酮水平升高，雌二醇水平下降
- D.卵泡刺激素和黄体生成素水平升高
- E.血中人绒毛膜促性腺激素浓度升高

17.下面哪种血尿应首先考虑上尿路结石（ ）

- A.无痛性血尿 B.终末血尿 C.活动性血尿 D.初期血尿

18.急性失血时，最先出现的代偿反应是

- A.血管的自身调节 B.交感神经系统兴奋 C.组织液回收增加 D.血管紧张素III增多 E.心率明显加快

19.阑尾动脉发自 【 】

- A.空回肠动脉 B.中结肠动脉 C.右结肠动脉 D.回结肠动脉 E.左结肠动脉

20. 最常引起完全无尿的是 ()

A.肾前性肾衰 B.肾性肾衰 C.肾后性肾衰 D.大出血、休克 E.广泛烧伤

21.下列哪种情况下基础代谢率会降低 ()。

A.发热 B.糖尿病 C.脑垂体功能低下 D.红细胞增多症 E.白血病

22.关于水肿，下列说法不正确的是 ()

A.心源性水肿常从身体的低位开始

B.肾源性水肿常发展迅速

C.肾源性水肿常伴高血压

D.肝源性水肿常以腹水为主要表现

E.甲状腺功能低下的患者常出现下肢可凹性水肿

23.上呼吸道最狭窄的部位是

A.鼻后孔 B.喉口 C.前庭裂 D.声门裂 E.声门下腔

24.直接支配小汗腺活动的神经纤维是 ()

A.肾上腺素能纤维 B.胆碱能纤维 C.肽能纤维 D.副交感神经节后纤维

E.交感神经节前纤维

25. 高调金属音的肠鸣音亢进最常见于 ()

A.消化道出血 B.腹泻 C.急性胃肠炎 D.机械性肠梗阻 E.服泻药后

26. 右眼视神经损伤，光照左眼，可见两眼的瞳孔变化为（ ）
- A.左眼大，右眼小 B.右眼大，左眼小 C.两眼瞳孔均散大 D.两眼瞳孔均缩小 E.左眼瞳孔缩小，右眼瞳孔无变化
27. 临床最常见的头痛伴剧烈呕吐多提示为（ ）
- A.偏头痛 B.癫痫 C.椎—基底动脉供血不足 D.神经功能性头痛 E.颅内高压
28. 肺动脉起始部位是（ ）
- A.右心房 B.右心室 C.左心房 D.左心室 E.主动脉弓
29. 长期慢性组织缺氧时可出现（ ）
- A.匙状指 B.杵状指 C.梭状指 D.“猿手” E.“爪形手”
- 30.手术中输血过程发现手术性渗血不止和低血压时最可能的并发症是（ ）
- A.过敏性休克 B.感染性休克 C.出血倾向 D.溶血反应 E.以上都不是
- 31.肺气肿患者肺部叩诊为 【 】
- A.鼓音 B.清音 C.过清音 D.浊音 E.实音
- 32.腮腺是最大的一对唾液腺，它的导管开口在（ ）
- A.A.舌下阜
- B.下颌第二磨牙相对的颊黏膜处

- C.下颌第一磨牙相对的颊黏膜处
- D.上颌第三磨牙相对的颊黏膜处。
- E.颧弓下方一横指处

33. 浓度为 25% 要素饮食，1mL 含有热量

- A.1.18kJ B.2.18kJ C.3.18kJ D.4.18kJ E.5.18kJ

34.心电图反映窦房结兴奋传至心室的波段是 【 】

- A.P 波 B.PR 间期 C.QRS 波 D.S 段 E.T 波

35.支配咀嚼肌的神经是 ()。

- A.舌下神经 B.下颌神经 C.面神经 D.动眼神经 E.滑车神经

36.视区位于()

- A.颞横回 B.角回 C.海马旁回钩 D.距状沟两岸 E.缘上回

37.阻塞性或肝细胞性黄疸 ()

- A.尿镜检红细胞满视野
- B.尿镜检白细胞满视野
- C.尿外观正常，镜检可见各种管型
- D.尿外观酱油色，隐血试验(+)
- E.尿外观深黄色，含大量胆红素

38.补充营养的主要途径是 【 】

A.胃肠外营养 B.胃肠内营养 C.口服 D.静脉注射 E.肌注

39.烧伤创面适宜包扎疗法的部位是 ()

A.头部 B.面部 C.躯干 D.会阴 E.肢体

40. 引起输血发热反应最常见的原因是

A.细菌污染 B.红细胞破坏 C.血型不合 D.致热原 E.过敏物质

41. 对能量代谢影响最为显著的是

A.寒冷 B.高温 C.肌肉运动 D.精神运动 E.进食

42. 病人讲述的最主要的症状称为

A.现病史 B.个人史 C.既往史 D.系统回顾 E.主诉

43.脊柱的生理弯曲是 ()

A.颈曲凸向前，胸曲凸向后 B.颈曲凸向后，胸曲凸向前 C.腰曲凸向后，
骶曲凸向前 D.腰曲凸向前，胸曲凸向前 E.以上都不对

44.对肺的非弹性阻力叙述，错误的是

A.它主要是呼吸道阻力

B.它与气道半径的2次方成反比

C.它增大时，可出现呼吸困难

D.它与气体流速呈正相关

E.上呼吸道是产生呼吸道阻力的主要部位

45.胰岛素（ ）。

A. 蛋白质激素 B. 肽类激素 C. 胺类激素 D. 类固醇激素 E. 固醇类激素

46.老年人主动脉弹性降低时，血压的变化是（ ）

A. 收缩压升高，脉压减小
B. 收缩压升高，脉压加大
C. 收缩压降低，脉压减小
D. 收缩压变化不大，脉压显著加大
E. 收缩压与脉压均无变化

47. 预防休克的关键是

A.消除病因 B.保暖、防暑 C.穿抗休克裤 D.注意休息 E.止痛剂早期应用

48.结肠镜检查的禁忌证是 【 】

A.急性腹膜炎 B.排便习惯改变 C.间断性血便 D.结肠肿瘤术后 E.炎症性肠病

49.主动脉在维持舒张压中起重要作用，主要是由于主动脉

A.口径大 B.管壁厚 C.管壁有可扩张性和弹性 D.血流速度快 E.对血流

引起咯血的最常见心血管疾病是

A.动脉导管未闭 B.二尖瓣狭窄 C.高血压病 D.室间隔缺损 E.房间隔缺损

51. 有关急性肾衰多尿期的描述，不正确的是

A.成人患者尿量突然或逐渐增多至 400 毫升/日以上
B.持续约 7-14 天
C.其早期水电解质紊乱和氮质血症仍很重
D.后期可致缺水、低钾、低蛋白血症
E.少尿期后前两周称多尿早期

52.癌转移引起淋巴结肿大的以下特征中哪项是错误的 【 】

A.局部红肿 B.无压痛 C.质地坚硬 D.与周围组织粘连 E.不活动

53. 中性粒细胞增多最常见的原因是

A.急性感染或炎症 B.大面积烧伤 C.急性溶血 D.急性中毒 E.恶性肿瘤

54.下列哪一项不属于临界性肿瘤（ ）

A.良性肿瘤位于两个脏器交界处 B.包膜不完整的纤维瘤 C.生物学行为介于良恶性之间 D.切除后易复发 E.唾液腺混合瘤

55.激活胰液中胰蛋白酶原的是（ ）

B.胆盐 C.蛋白水解产物 D.肠致活酶 E.糜蛋白酶

56.听到开瓣音常提示（ ）。

- A. 二尖瓣狭窄伴二尖瓣关闭不全
- B. 二尖瓣严重狭窄，瓣膜钙化
- C. 二尖瓣狭窄分离术的禁忌证
- D. 二尖瓣狭窄伴左心衰竭
- E. 二尖瓣轻、中度狭窄，瓣膜弹性和活动性较好

57.面部开放性损伤后 12 小时就诊，应采取的措施是（ ）。

- A.换药，小清创 B.清创后不缝合 C.清创后一期缝合 D.清创后延期缝合 E.清创后放引流条

58.窦房结位于（ ）。

- A.冠状窦与右心房之间的心外膜深面
- B.冠状窦口后方的心内膜深面
- C.上腔静脉与右心耳的心外膜深面
- D.上腔静脉与肺静脉之间的心外膜深面
- E.上腔静脉与右心耳的心内膜深面

59.当中心静脉压小于 4cmH₂O 时，可出现的主要表现是()。

- A.少尿、意识淡漠、血压下降

C.少尿、浮肿、血压升高

D.腹胀、少尿、意识障碍

E.尿黄、恶心、意识障碍

60. 触觉语颤增强见于()

A.肺气肿 B.肺不张 C.胸腔积液 D.大叶性肺炎 E.气胸

61. 关于抑制性突触后电位的产生，正确的叙述是

A.突触前轴突末梢超极化

B.突触后膜对 Ca_{2+} 、 K^{+} 通透性增大

C.突触后膜去极化

D.突触后膜出现超极化

E.突触后膜出现复极化

62.外科患者最常见的脱水类型是 【 】

A.低渗性脱水 B.等渗性脱水 C.高渗性脱水 D.慢性脱水 E.继发性脱水

63.受伤达 12h 的严重沾染伤口，应采取()

A.清创及一期缝合 B.清创及延期缝合 C.清创后不予缝合 D.清创及植皮 E.无须清创

64.心内兴奋传导的顺序是

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/128046074124006130>