

《伤寒论》复习题

一、单选题

- 1 太阳与阳明合病，自下利者，选用（C）
- A.桂枝加葛根汤 B.黄芩汤 C.葛根汤 D.桂枝人参汤
- 2 .少阴病，脉沉者，急温之，宜：（B）
- A.白通汤 B.四逆汤 C.通脉四逆汤 D.四逆散
- 3 .桂枝新加汤证的身痛，其病机是：（B）
- A.阴阳两虚 B.营血不足 C.风湿束表 D.寒邪外束
- 4 .桂枝人参汤方的组成是（C）
- A.桂枝汤方加人参 B.桂枝汤合理中汤
- C.理中汤加桂枝 D.理中汤加人参
- 5,阳明病，胁下硬满，不大便而呕，舌上白苔者，可与（B）
- A 大柴胡汤 B,小柴胡汤 C,小承气汤 D.柴胡加芒硝汤
- 6 .生姜泻心汤证的主症为（B）
- A.噫气不除，心下痞 B.干噫食臭，心下痞硬
- C.肠鸣下利，心下痞硬 D.呕吐而利，心下痞硬
- 7 .下利清谷，手足厥逆，脉微欲绝，身反不恶寒，其人面赤者，宜选用（C）
- A.四逆汤 B.白通汤 C.通脉四逆汤 D.白通加猪胆汁
- 8 .桂枝去芍药汤证的脉象是：（C）
- A.脉浮 B.脉数 C.脉促 D.脉滑
- 9 .茯苓四逆汤的适应症是（A）
- A.昼夜俱烦躁 B.昼日烦躁，夜而安静

C.头眩，身哨动 D.身不痛，但重

10 .少阴病，吐利，手足逆冷，烦躁欲死者，用（D）

A.理中汤 B.四逆汤 C.茯苓四逆汤 D.吴茱萸汤

11 .《伤寒论》首创哪种辨证方法（B）

A.卫气营血辨证 B.六经辨证 C.脏腑辨证 D.三焦辨证

12,茯苓四逆汤的药物组成（B）

A.茯苓加四逆汤 B.茯苓人参加四逆汤
C.茯苓、白术加四逆汤 D.茯苓、人参、大枣加四逆汤

13 .伤寒下后，心烦腹满，卧起不安者，主以（B）

A.栀子甘草豉汤 B.栀子厚朴汤 C.栀子生姜豉汤 D.黄连阿胶汤

14 .下列临床表现中，不属于十枣汤证的是（B）

A.聂聂汗出，发作有时 B.发热恶寒 C.头痛 D.干呕短气

15 .下列脉证中，何项不属于桂枝去桂加茯苓白术汤证？（D）

A.头项强痛 B.发热无汗 C.小便不利 D.大便溏薄

16 .阳明病，谵语，发潮热，脉滑而疾者，主以（A）

A.小承气汤 B.调胃承气汤 C.大承气汤 D.大陷胸汤

17 .大柴胡汤主治“伤寒发热，汗出不解，心下痞硬，呕吐而下利者”，
其下利的病机是（A）

A.泻热迫肠 B.阳陷于下 C.燥实结肠 D.虚寒下利

18 .治宜破阴回阳，佐以咸寒苦降的方子是（B）

A.通脉四逆汤 B.白通加猪胆汁汤 C.白通汤 D.桂枝人参汤

19 .下利清谷，里寒外热，汗出而厥者，主以（A）

A.通脉四逆汤 B.理中丸 C.白通汤 D.桂枝人参汤

20 . 不属于厥阴病热厥证的临床表现是 (D)

- A.热少微厥，指头寒 B.脉伏不见

C. 热少微厥，烦躁 D. 厥而呕，胸胁烦闷

21 葛根苓连汤证出现下利的机理是 (C)

A. 表邪入里化热，热迫肠道 C. 表邪内迫，大肠传导失职 B. 寒邪伤阳，中焦虚

22. 少阴病吐利，手足逆冷，A. 理中汤 B. 烦躁欲死者，用 (C)

茯苓四逆汤 C. 吴茱萸汤 D. 四逆汤

23 . 柴胡桂枝干姜汤证的治则是 (D)

A. 和解和阳，兼以解表 B. 和解少阳，兼以温阳

C. 和解少阳，兼以安神 D. 和解少阳，兼化痰水

24 . 证见“手足厥寒，脉细欲绝”的治则是 (C)

A. 通阳散寒 B. 回阳救逆 C. 温经养血通脉 D. 滋阴补血

25 . 伤寒，厥而心下悸，宜用 (B)

A. 苓桂术甘汤 B. 茯苓甘草汤 C. 真武汤 D. 五苓散

26 . 太阴表证，宜选用 (C)

A. 四逆汤 B. 理中丸 C. 桂枝汤 D. 麻黄汤

27 . 猪肤汤用于治疗 (A)

A. 少阴阴虚咽痛 B. 少阴客热咽痛

C. 少阴客寒咽痛 D. 少阴咽中生疮

28 . 少阳阳明的治法是 (B)

A. 润下 B. 通下 C. 攻下 D. 急下

29 . 附子泻心汤的煎药方法是 (D)

A. 三黄先煎，附子后入 B. 附子先煎，三黄后入

C. 甘澜水煎服药液 D. 麻沸汤渍三黄，附子另煎取汁

30 . 下列哪项非白虎汤主治症候 (D)

- A.脉滑而厥

B.大渴
- C.表里俱热，时时恶风

D.发热无汗，其表不解
- 31 . 桂枝、甘草、人参三味药同用的方剂有 (A)

A.炙甘草汤

B.麻黄升麻汤

C.茯苓甘草汤

D.乌梅丸
- 32 . 苦酒汤主治 (D)

A.少阴阴虚咽痛

B.少阴客热咽痛

C.少阴客寒咽痛

D.少阴病咽中生疮

D.调胃承气汤
33. “阳明病，不吐不下，心烦 治用 (D)

A.小柴胡汤

B.大承气汤

C.白虎汤

B.干噎食臭，心下痞硬
- 34、生姜泻心汤证为 (B)

D.呕吐热利，心下痞硬
- A.噎气不除，心下痞硬

宜用 (D)
- C.肠鸣下利，心下痞硬

C.葛根加半夏汤

D.黄芩汤
35. 太阳与少阳合病下利者，

A.葛根汤

B.葛根苓连汤

B.赤石脂禹余粮汤
36. 用潦水煎药的是 (D) 。

D.麻黄连翘赤小豆汤
- A.枳实栀子豉汤
- C.栀子柏皮汤

C.桂枝人参汤

D.葛根苓连汤
37. 协表寒利证宜用 (C) 。

38 . 太阳病轻证兼里热时当选用 (B)
- A.四逆汤

B.理中汤

A.桂枝二麻黄一汤

B.桂枝二越婢一汤
- C.大青龙汤

D.桂枝麻黄各半汤
- 39 . 附子泻心汤煎药的方法是 (D)

A.三黄先煎，附子后入

B.附子先煎，三黄后入

C.甘澜水煎取药液

D.麻沸汤渍三黄，附子另煎取汁

40 . 症见心下痞硬满，引胁下痛，干呕短气，宜用 (A)

A.十枣汤 B.大陷胸汤 C.旋复代赭汤 D.半夏泻心汤

41 . 白头翁汤适应证是 (C)

A.下利清谷 B.滑脱失禁 C.热利下重 D.便硬腹痛

42 . 伤寒厥而心下悸，宜用 (B)

A.苓桂术甘汤 B.茯苓甘草汤 C.真武汤 D.五苓散

43 . 太阳中风自汗出的病机中，哪项是错误的 (D)

A.卫强营弱 B.阳浮阴弱
C.营气和而外不谐 D.表闭阳郁，营阴郁滞

44 . 少阴病寒化证的特点是 (B)

A.自利不渴 B.自利而渴 C.下利便脓血 D.下利消渴

45 . 《伤寒论》中并病是指 (B)

A.两经证候归并为一经 B.一经证候未罢，又出现另一经的证候
C.两经或三经的证候同时出现 D.阳经与阴经的证候同时出现
E.一经病症为主但兼有其他证候

46. 《伤寒论》中合病是指 (C)

A.两经证候归并为一经 B.一经证候未罢，又出现另一经的证候
C.两经或三经的证候同时出现 D.阳经与阴经的证候相继出现
E.一经病证为主但兼有其他证候

47 . 太阳病传为少阴病的传变方式为 (B)

A.循经传 B.表里传 C.直中 D.并病 E.合病

48 . 外感初起太阳与少阴同时发病最恰当的表述为 (D)

A.直中 B.并病 C.表里传 D.两感 E.越经传

C. 风寒束表，卫强营弱，肺气上逆

D.素有喘疾，外感风寒，引动宿疾

E. 风寒束表，久郁化热，肺气上逆

57 . 下列病证不可用麻黄汤治疗的是 (D)

A.太阳与阳明合病，喘而胸满者

B.太阳病，脉浮紧，无汗，发热，身疼痛，八九日不解，表证仍在者

C.太阳病，头痛发热，身疼腰疼，骨节疼痛，恶风，无汗而喘者

D. 伤寒发汗，已解，半日许复烦，脉浮数者，可更发汗

E. 伤寒脉浮紧，不发汗，因致融者

58 . 太阳伤寒如出现断血是因为 (B)

A.感邪较重，病程日久

B. 阳郁过甚，损伤阳络

C. 热入营血，迫血妄行

D. 气虚不能摄血

E. 脾不统血

59 . “淋家，不可发汗”是因为 (D)

A. 失血过多，气血两虚

B. 热盛伤阴，阴伤火炽

C. 阴精亏损，营血不足

D. 湿热下注，久则伤阴

E. 阳气虚损，营阴不化

60 . 大青龙汤证中烦躁的机理是 (A)

A.寒邪束于外，阳热郁于内而无从宣泄 B. 无形邪热内扰心神

C. 太阳中风，热邪内扰

D. 浊邪上干，犯扰心神

E. 少阴阳虚，心神浮越

61 . 下列方中麻黄用量最大的是 (D)

A.麻黄汤 B. 葛根汤 C. 小青龙汤

D. 大青龙汤 E. 麻杏甘石汤

62 . 形似疟。一日再发者，汗出必解， 应选 **(B)**

- A.桂枝麻黄各半汤
- B.桂枝二麻黄一汤
- C.桂枝二越婢一汤
- D.小柴胡汤
- E.大青龙汤

.服桂枝汤，大汗出后，大烦渴不解，脉洪大者的确切病机是（B）

A.表邪化热入阳明

B.服桂枝汤后，热盛津伤，转属阳明，津气两伤

C.阳明气分热盛

D.发汗太过，阴液不足

E.以上都不是

64 .桂枝去芍药加蜀漆牡蛎龙骨救逆汤适用于（C）

A.气血损伤惊悸证

B.心阳虚烦证 C.心阳虚惊狂证

D.邪气弥漫烦惊谓谵证

E.以上都不适用

65 .太阳病，发汗过多，病人叉手自冒心，心下悸，欲得按。其治疗方剂是（E）

A.茯苓桂枝甘草大枣汤 B.桂枝加桂汤

C.桂枝汤

D.桂枝甘草龙骨牡蛎汤

E.桂枝甘草汤

66 .原文见“火逆下之，因烧针烦躁者”应用（D）

A.四逆散

B.桂枝甘草汤

C.四逆汤

D.桂枝甘草龙骨牡蛎汤 E.桂枝甘草龙骨牡蛎救逆汤

67 .原文“伤寒二三日，心中悸而烦者”宜用（D）

68 A.大建中汤 B.茯苓桂枝白术甘草汤

69 .原文 发汗，若下之，病仍不解，烦躁者”其治疗方剂是（C）

A.予姜附子汤 B.四逆汤

C.茯苓四逆汤

D.大青龙汤

E,桂枝甘草龙骨牡蛎汤

70 .据 186 条所述阳明病的主脉是（B）

A 浮脉 B.大脉 C.洪大脉 D.浮滑脉 E.沉脉

· 藓子豉汤证见“但头汗出”的病机是 (D)

A.里热亢盛 B.湿热蕴结 C.虚阳上越 D.郁热上蒸 E.热扰清空

72 . 下列是猪苓汤的治禁的是 (A)

A.发热，汗出多而渴 B.口渴，小便不利 C.脉浮发热

D.下利 E.心烦不得眠

D.泻热和胃润燥 E.泻热除满通便

73 . 麻子仁丸证的治法是 (B)

74 . 吴茱萸汤证的病机是 (C)

A 胃阳亢盛，胃气上逆 B.腑气壅滞，胃气上逆

C.胃阳不足，浊阴上逆 D.脾失健运，胃失和降

E.上焦有热，胃失和降

75 . 麻黄连翘赤小豆汤证的治法是 (E)

A.温中化湿退黄 B.泻热逐瘀退黄 C.清热利湿退黄

D 和解少阳，清热祛湿 E. 清热利湿，解表散邪

76 . 下列诸证，不宜用小柴胡汤治疗的 (E)

A.阳明病，胁下硬满，不大便而呕，舌上白苔者：

B.阳明病，发潮热，大便溏，小便自可，胸胁满不去者

C.伤寒四五日，身热恶风，颈项强，胁下满，手足温而渴者

D.太阳病转入少阳，胁下硬满，但不能食，往来寒热，脉沉紧者

E.脉迟浮弱，恶风寒，手足温，医二三下之，不能食而胁下满痛，面目及身黄，颈项强，小便难者

76. 应用小柴胡汤时，若病人口渴，其加减应为 (B)

A.去半夏加重人参，甘草

B.去半夏，加人参至四两半，加枯萎根四两

去半夏，加重人参，加五味子、括萋实

D. 去半夏、黄芩，加枯萎根

E. 去半夏、黄芩，加五味子、括萋根

77 . 原文“自利不渴者，属太阴，以其脏有寒故也……”中“不渴”是因为(A)

A 脾虚失运，寒湿弥漫

B. 太阴虚寒，里有寒饮

C. 里无热邪，津液未伤 D. 脾肾阳虚，水湿内生

78 . 桂枝加芍药汤证中“腹满时痛”的机理是(D)

A. 误下邪陷，寒痰结于胸膈，波及腹部

B. 邪陷阳明，腑气不通

C. 脾虚湿阻，气机不利，阳气时通时闭

D. 误下伤脾，运化失职，气机壅滞，血脉不和，经络不通

E. 太阴脾虚，饮食停积

79 . 患者，男，35 岁。发热恶寒无汗 2 日，自服复方感冒灵后周身汗出，此后汗出不止，觉腹中胀满，遇冷愈甚，小便清长，大便未解，舌质淡胖，苔薄白，脉缓乏力。辨证当是(B)

A. 桂枝汤证

B. 桂枝加大黄汤证

C. 桂枝加芍药汤证

D. 桂枝加附子汤证

E. 厚朴生姜半夏甘草人参汤证。

80 . 患者，男，47 岁。素易腹泻，此次来诊因腹部胀满，时有疼痛，食后尤甚，遇冷则剧，小便如常，大便软。舌淡脉弱。辨证当是(B) A. 桂枝汤证 B. 桂枝加芍药汤证 C. 理中汤证

D. 小建中汤证 E. 厚朴生姜半夏甘草人参汤证

81 少阴病中出现“自利而渴”的机理是 (D)

A 少阴下利，阴津受伤

B. 少阴热化，伤津耗液

少阴病阴阳俱虚，阴津不足 **D** 寒侵少阴，真阳受困，津不上承

E. 少阴阳虚，水气内停

82 . 关于通脉四逆汤的加减法，下列论述错误的是 **(B)**

A. 面色赤加葱九茎 **B**. 腹中痛，去甘草加芍药二两

C. 呕者加生姜二两 **D** 咽痛者去芍药加桔梗一两

E. 利止脉不出者去桔梗加入参二两

83 . 辨证关键为“身反不恶寒，其人面色赤”的是 **(D)**

A. 四逆汤证 **B**. 四逆加入参汤证

C. 茯苓四逆汤证 **D**. 通脉四逆汤证 E. 当归四逆汤证

84 . 据原文“少阴病，得之二三日以上，..... . 黄连阿胶汤主之 **J**

填空项应为 **(B)**

A. 心烦不得眠者 **B**. 心中烦，不得卧 C. 反发热，脉沉者

D 口中和，其背恶寒者 E. 心烦腹满，卧起不安者

85 . 猪苓汤证与五苓散证共有的表现是 **(A)**

A. 脉浮，小便不利 **B**. 水入即吐 **C**. 心烦不得眠

D. 咳而呕渴 **E**. 汗出而渴

86 . 四逆散证之四逆，较合适的解释为 **(D)**

A. 心肾阳虚，阴寒内盛，阳气不达

B. 少阴阳虚，复感寒邪，寒凝气滞

C. 阴阳气不相顺接

D. 肝脾气滞，阳气内郁，不达四末

E. 肾虚水停，阳气被遏

D.小建中汤证

E.小承气汤证

·患者，女，43岁。3天前出现右下腹部疼痛，时作时止，并感觉有气在腹中攻窜，曾服用大黄牡丹皮汤不效，食欲不振，口干口苦，四肢末端冰凉，舌质红，苔薄黄，脉弦数，重举乏力。辨证当是（A）

88 .原文“手足厥寒，脉细欲绝者，当归四逆汤主之。若其人内有久寒者”中的“内有久寒”是指（C）

A.腹中素有寒湿 B.胸中素有寒饮 C.肝胃的沉寒痼疾

D.血虚寒凝日久 E.寒邪凝滞经脉

89 .下列不是白头翁汤适应症的是（B）

A.下利便脓血，血色鲜红

B.滑泄失禁

C.肛门灼热

D.渴欲饮水

E.舌红苔黄

90 .下利后更烦，按之心下濡者，为虚烦也，宜用（C）

A.甘草泻心汤

B.调胃承气汤

C.栀子豉汤

D.竹叶石膏汤

E.茯苓四逆汤

91 半夏泻心汤证见“心下痞”是属于（C）

A.痰气痞 B.水痞 C.寒热错杂痞 D.热痞 E.虚痞

92 .心下痞，按之濡，关上脉浮者，治疗用（A）

A.大黄黄连泻心汤

B.附子泻心汤

C.半夏泻心汤

D.生姜泻心汤

E.甘草泻心汤

93 .患者，女，45岁。时发热汗出3年余，余无特殊不适。体检未发现异常，二便调，纳可，口中和，舌脉如常。临床辨证当是（A）

A.桂枝汤证

B.桂枝新加汤证

C.小柴胡汤证

D.白虎加人参汤证 E.桂枝加人参汤证

·患者，女，58岁。胸闷心悸半年，恶寒甚，脉微弱，近3日因感冒，稍鼻塞，头痛。临床最佳辨证当是（C）

- A.桂枝汤证 B.桂枝去芍药汤证 C.桂枝去芍药加附子汤证
D.桂枝甘草汤证 E.苓桂术甘汤证

95 .车某某，男，52岁，脱肛2月余。诊见胸闷腹胀，烦热口苦，肢体困重，疲乏神倦，小便短赤，腹泻数次，舌边尖红，苔中心黄腻，脉弦滑数。应予（D）

- A.大承气汤 B.小承气汤 C.黄芩汤
D.葛根苓连汤 E.以上都不是

96 .陈某某，男，13岁。1周前感冒发热，家长给服感冒药后好转（药名不详）。5天前晚上发热起，仍给服前药，但热不退且见心烦、心悸、寐差。现症：发热，心烦闷，心悸寐差，纳呆，恶心呕吐，二便正常，舌苔薄黄，脉数。应予（B）

- A.栀子甘草豉汤 B.栀子豉汤 C.栀子厚朴汤
D.栀子生姜豉汤 E.以上都不是

97 .某人病伤寒七日，发热汗出，微恶寒，一身尽痛，咳痰不畅，痰色黄，宜用（A）

- A.麻杏石甘汤 B.麻黄汤 C.大青龙汤
D.小青龙汤 E.以上都不是

98 .某男，5岁，昨晚发烧，今晨未退，呕吐两次，腹泻两次，有黏液，嗜睡，舌苔黄，脉沉数，宜用（B）

- A.黄连汤 B.葛根苓连汤 C.葛根汤 D.白头翁汤 E.以上都不是

99 .患者，女，34岁。胃脘部痞硬胀满且按之疼痛3天，伴发热，胸膈满闷，咳吐黄痰，恶心呕吐、苔黄腻，脉浮滑，临床辨证当是（A）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/128053111004007012>