

全科医学住院医师：内科主要疾病考试试题

1、单选 男，42岁，近半个月感口渴，饮水量增至每天2000ml。身高156cm，体重71kg，空腹血糖180mg/dl（10.0mmol/L），餐后血糖252mg/dl（江南博哥）（14.0mmol/L），系初次发现血糖高，过去无糖尿病史。4年后该患者被发现有浸润型肺结核，降血糖治疗宜（）。

- A. 原降血糖药增加剂量
- B. 改用降血糖作用更强的口服降血糖药
- C. 增加一种口服降血糖药
- D. 双胍类、磺脲类、 α -葡萄糖苷酶抑制剂联合使用
- E. 胰岛素治疗

正确答案：E

2、单选 男性，45岁，查体发现肝硬化5年。3天前与朋友聚餐时出现呕血，鲜红色，量约1000ml。患者出现头晕、心慌、出冷汗等。经输血、补液和应用止血药物治疗后病情好转，血压和心率恢复正常。1天前出现睡眠障碍，并出现幻听和言语不清。化验检查示：血氨130 μ g/dl，血糖5.6mmol/L，尿素氮7.2mmol/L。消化道出血的原因最可能是（）。

- A. 胃癌
- B. 胃溃疡
- C. 十二指肠溃疡
- D. 食管静脉曲张破裂
- E. 胃黏膜病变

正确答案：D

3、单选 急性肾炎常见于（）。

- A. 微小病变
- B. 毛细血管内膜增生性肾炎
- C. 系膜增生性肾炎
- D. 新月体型肾炎
- E. 系膜毛细血管性肾炎

正确答案：B

4、填空题 胃癌癌前疾病指的是（）、（）、（）、（）。

正确答案：慢性萎缩性胃炎；胃息肉；胃溃疡；残胃

5、单选 男性，28岁，阴囊破溃流脓1个月，无疼痛，抗炎治疗未愈，发病以来无发热，可能诊断是（）。

- A. 急性睾丸炎
- B. 急性附睾炎
- C. 附睾结核
- D. 阴囊丝虫病
- E. 睾丸肿瘤感染

正确答案：C

6、单选 患者，男性。18岁，骑单车时被汽车撞倒，神志清，GCS15'，右侧大腿痛，畸形，不能站立及行走，右下肢纵向叩击痛（+），踝关节活动好，双下肢皮肤感觉无特殊。此患者最可能的诊断是（）。

- A. 腰椎骨折
- B. 右股骨骨折
- C. 偏瘫
- D. 右胫骨骨折
- E. 右坐骨神经损伤

正确答案：B

7、填空题 法洛四联征包括（）、（）、（）、（）。

正确答案：心室间隔缺损；肺动脉口狭窄；主动脉骑跨；右心室肥厚

8、单选 女性，36岁，主诉头晕、乏力，3年来月经量多，浅表淋巴结及肝、脾未触及，血红蛋白58g/L，白细胞 $8 \times 10^9/L$ ，血小板 $185 \times 10^9/L$ ，血片可见红细胞中心淡染区扩大，网织红细胞计数0.00577。除治疗病因外，还应采取哪项措施（）。

- A. 大剂量丙球蛋白静脉滴注
- B. 补充铁剂
- C. 血浆输注
- D. 维生素B12和叶酸
- E. 红细胞集落刺激因子

正确答案：B

9、单选 女性，36岁，低热伴胸闷、气急3周入院，经检查拟诊心包积液，下列哪一项体征不符合心包积液（）。

- A. 心脏向左右扩大
- B. 奇脉
- C. 肝肿大压痛
- D. 心音遥远
- E. 心尖搏动弥散

正确答案：E

10、单选 男性，24岁，反复发作性咳嗽、喘息10年余，再发加重3小时。查体见意识模糊，口唇发绀，双肺呼吸音明显减低，未闻及干湿啰音，心率128次/分，可触及奇脉。诊断及病情程度确定后应采取的最有效措施是（）。

- A. 甲基强的松龙静滴+氨茶碱静滴+氧疗
- B. 特布他林口服+氨茶碱口服+氧疗
- C. 亚胺培南静滴+氨茶碱静滴+氧疗
- D. 沙丁胺醇吸入+氨茶碱口服+氧疗
- E. 倍氯米松吸入+氨茶碱静滴+氧疗

正确答案：A

11、单选 增高可持续1~3周的心肌梗死的化验检查（）。

- A. GPT
- B. 白细胞计数
- C. CPK
- D. GOT
- E. LDH

正确答案：B

12、单选 男性，45岁，查体发现肝硬化5年。3天前与朋友聚餐时出现呕血，鲜红色，量约1000ml。患者出现头晕、心慌、出冷汗等。经输血、补液和应用止血药物治疗后病情好转，血压和心率恢复正常。1天前出现睡眠障碍，并出现幻听和言语不清。化验检查示：血氨130 μ g/dl，血糖5.6mmol/L，尿素氮7.2mmol/L。为明确出血原因，待病情稳定后，最好行下列哪项检查（）。

- A. 钡餐透视
- B. 吞线试验
- C. 胃镜检查
- D. 腹部B超
- E. 腹部CT

正确答案：C

13、单选 一慢性肾炎5年的患者，长期低盐低蛋白饮食，乏力、恶心、呕吐20天。血压140/100mmHg，无水肿，Hb60g/L，尿蛋白（+），颗粒管型0~3个/HP，血白蛋白30g/L，球蛋白25g/L，BUN20mmol/L，血Cr1220 μ mol/L，血钠125mmol/L。此患者首先采取哪项治疗饮食（）。

- A. 低蛋白饮食，以植物蛋白为主，不限盐
- B. 低蛋白饮食，以动物蛋白为主，限盐
- C. 高蛋白饮食，多给动物蛋白，不限盐
- D. 高蛋白饮食，以植物蛋白为主，限盐
- E. 高蛋白饮食，不限盐

正确答案：B

14、单选 女性，32岁。因不明原因发热2周来院门诊，查体示心脏有杂音。拟诊感染性心内膜炎入院。感染性心内膜炎，最常发生于下列哪种情况（）。

- A. 先心病室间隔缺损
- B. 心脏正常的吸毒者
- C. 先心病房缺
- D. 肺源性心脏病
- E. 风湿性瓣膜病

正确答案：E

15、填空题 影响氧离曲线的因素有（）、（）、（）、（）、（）、（）、（）。

正确答案：PO₂；Hb本身的性质和含量；pH；PCO₂；温度；2, 3-DPG；CO

16、单选 肺炎球菌肺炎可出现以下体征，除了（）。

- A. 口角或鼻周单纯性疱疹
- B. 肋间带状疱疹
- C. 皮肤和黏膜出血点
- D. 病变部位湿啰音
- E. 病变部位支气管呼吸音

正确答案：B

参考解析：肺炎链球菌患者呈急性热病容，面颊绯红，鼻翼扇动，皮肤灼热，干燥，口角及鼻周有单纯疱疹，病变广泛时可出现发绀。有败血症者，可出现皮肤，黏膜出血点，巩膜黄染。肺实变时叩诊浊音，触觉语颤增强并可闻及支气管呼吸音。消散期可闻及湿啰音。心率增快，有时心律不齐。重症患者有肠胀气。重症感染时可伴休克，急性呼吸窘迫综合征及神经精神症状。累及脑膜时有颈抵抗及出现病理性反射。肋间带状疱疹是带状疱疹典型表现。

17、填空题 急性胰腺炎最常见的原因是（）和（）。

正确答案：过食油腻；饮酒

18、单选 男性，68岁，发热伴咳嗽1周，表情淡漠，气急，近2天全身散布出血点及瘀斑，血压8/5.3kPa（60/40mmHg），血红蛋白120g/L，白细胞 $12 \times 10^9/L$ ，血小板 $30 \times 10^9/L$ ，血涂片可见少量红细胞碎片，凝血酶原时间18秒（对照13秒），骨髓穿刺示增生活跃，巨核细胞多。应进一步做哪项检查（）。

- A. 造血祖细胞培养
- B. D-二聚体测定或3P试验
- C. 血小板功能测定
- D. 染色体检查
- E. 束臂试验

正确答案：B

19、单选 女性，23岁。1个月前感冒后心悸、胸闷、乏力、纳减、低热、盗汗。查体：心界不大，心音低，心率快，心律不齐。心电图示室早，短阵室速。下列哪项有提示意义（）。

- A. 6日间一次血清滴定度3倍增高
- B. 3日间一次血清滴定度2倍增高
- C. 9日间一次血清滴定度3倍增高
- D. 15日间二次血清滴定度4倍增高
- E. 21日间二次血清滴定度4倍增高

正确答案：E

20、单选 甲状腺滤泡状癌行甲状腺切除术后复发（）。

- A. 血清甲状腺球蛋白升高
- B. 血清降钙素升高

- C. 血清甲状旁腺素升高
- D. 血清垂体促甲状腺激素升高
- E. 血清 T3、T4 升高

正确答案：A

21、单选 女性，25 岁，出现尿频尿急尿痛。尿化验发现尿中有白细胞管型 2~3 个/HP，红细胞 3~5 个/HP，白细胞 10~15 个/HP。常见于（）。

- A. 急性肾小球肾炎
- B. 膀胱炎
- C. 慢性肾炎急性发作
- D. 尿道炎
- E. 肾盂肾炎

正确答案：E

22、单选 关于结核性胸膜炎特点的描述错误的是（）。

- A. 多见于中青年
- B. 起病多缓慢
- C. 可有结核中毒症状
- D. X 线胸片可呈肋膈角消失或外高内低影
- E. X 线胸片除胸液影外，还应有肺内结核灶

正确答案：E

23、单选 心包积液（）。

- A. 超声心动，左室径 65mm
- B. 超声心动 IVS：LVPW=1.5：1
- C. 超声心动出现右室前壁以及房室沟处无反射区
- D. 超声心动二尖瓣 EF 斜率 下降
- E. 超声心动室间隔连续中断

正确答案：C

24、单选 关于甲亢手术治疗的适应证，不正确的是（）。

- A. 高功能腺瘤
- B. 中度以上原发性甲亢
- C. 甲状腺肿大有压迫症状
- D. 抗甲状腺药物或放射性 ¹³¹I 治疗无效者
- E. 青少年患者

正确答案：E

参考解析：

甲亢外科手术治疗适应证为：①继发性甲亢或高功能腺瘤；②中度以上原发性甲亢；③腺体肿大伴压迫症状，或胸骨后甲状腺肿等类型甲亢；④抗甲状腺药物或¹³¹I治疗后复发者或长期坚持用药有困难者。手术禁忌证为：①青少年患者；②症状较轻者；③老年病人或有严重器质性疾病不能耐受手术者。AB-CD均为甲亢手术治疗的适应证，青少年患者首选药物控制，手术不当会影响青少年生长发育。故选项为E。

25、单选 男性，65岁，高血压10年，近半年经常半夜胸闷、胸痛，心电图：V₁~V₄导联ST段下移，诊断为（）。

- A. 变异型心绞痛
- B. 早期左心衰
- C. 卧位型心绞痛
- D. 食管裂孔疝
- E. 混合型心绞痛

正确答案：C

26、单选 男，25岁。因高位小肠瘘1天入院，入院后经颈内静脉插管滴入肠外营养液，两周后突然出现寒战、高热，无咳嗽、咳痰，腹部无压痛和反跳痛。最有可能的诊断是（）。

- A. 高渗性非酮症昏迷
- B. 肺部感染
- C. 气胸
- D. 导管性脓毒症
- E. 咽喉部感染

正确答案：D

27、单选 下列病例发生心力衰竭时属于哪项机制。男性，19岁，自幼有心脏杂音。体检：肺动脉瓣区可扪及收缩期震颤，闻及收缩期吹风样杂音4/6级，向左上胸部传导。P₂几乎消失（）。

- A. 右心室容量负荷过重
- B. 心脏舒张受限
- C. 左心室容量负荷过重
- D. 右心室压力负荷过重
- E. 机械性肺淤血状态

正确答案：D

28、单选 男性，49岁，患急性前壁心肌梗死，溶栓后1小时突然心悸、晕厥伴抽搐，ECG宽大畸形QRS波，频率166次/分，可见心室夺获，治疗首选（）。

- A. 毛花苷C静脉滴注
- B. 体外同步直流电复律
- C. 利多卡因静脉滴注

D. 维拉帕米静脉滴注

E. 硝酸甘油静脉滴注

正确答案： B

29、单选 对阵发性睡眠性血红蛋白尿症最具有确诊意义的试验是（）。

A. 抗人球蛋白试验

- B. 热溶血试验
- C. 酸化血清溶血试验
- D. 蔗糖溶血试验
- E. 菊糖溶血试验

正确答案：C

30、单选 男性，33岁。近5年来反复出现上腹部疼痛，尤以饱餐后明显。今日突然出现右上腹剧痛，5小时后来院就诊。检查：T37.3℃，P100次/分，R16次/分，BP120/80mmHg。腹平，腹式呼吸消失。全腹压痛、反跳痛，腹肌紧张明显。肝浊音界未叩出。肠鸣音弱。该患者最可能的诊断是（）。

- A. 胃穿孔
- B. 十二指肠溃疡穿孔
- C. 输尿管结石
- D. 急性出血坏死性胰腺炎
- E. 阑尾炎穿孔
- F. 急性肠梗阻

正确答案：A

31、填空题 再生障碍性贫血免疫抑制剂治疗的药物包括（）、（）、（）。

正确答案：抗胸腺细胞球蛋白；抗淋巴细胞球蛋白；环孢素A

32、单选 根据病因及发病机制贫血可分为（）。

- A. 红细胞生成减少、造血功能不良及红细胞破坏过多三类
- B. 红细胞生成减少、造血功能不良两类
- C. 红细胞生成减少、红细胞破坏过多及失血三类
- D. 红细胞生成减少、溶血、失血、再障及缺铁等五类
- E. 红细胞生成减少、红细胞过度破坏、失血及造血功能不良四类

正确答案：C

33、单选 女，15岁，烦躁怕热多汗，体重减轻2个月，查体：BP120/60mmHg，体型偏瘦，皮肤潮湿，手有震颤，轻微突眼，甲状腺弥漫Ⅰ度大，质地软，无触痛，可闻及轻度血管杂音，心率108次/分，经甲状腺功能检查确诊Graves病，首选的治疗是（）。

- A. 普萘洛尔
- B. 碘剂
- C. 丙硫氧嘧啶
- D. 核素¹³¹I
- E. 甲状腺大部切除

正确答案：C

参考解析：

甲亢治疗有三种方法：抗甲状腺药物 ^{131}I 、甲状腺大部切除，药物治疗适应证是：①病情轻、中度患者；②甲状腺轻、中度肿大；③年龄小于 20 岁；④孕妇、高龄或由于其他严重疾病不适宜手术者；⑤手术前和 ^{131}I 治疗前准备；⑥手术后复发且不适宜 ^{131}I 治疗者。甲状腺大部切除的适应证为：①药物治疗效果不好患者；②甲状腺明显肿大，特别是有结节或压迫症状者；③药物治疗后复发的甲亢；④有药物毒性反应或不能坚持用药的患者。年龄在 20 岁以下者属于 ^{131}I 治疗禁忌证，青少年甲亢患者的身体发育不成熟，不适宜手术。

34、单选 男性，30 岁，阵发性心悸 2 年，每次突然发生，持续 30 分钟至 1 小时不等，查体示心率 200 次 / 分，律齐，ECG 示 QRS 波形正常，P 波不能明确查见，诊断为（）。

- A. 窦性心动过速
- B. 心房颤动
- C. 心房扑动
- D. 阵发性窦性心动过速
- E. 阵发性室上性心速

正确答案：E

35、单选 男，18 岁，神志不清 1 小时入院，既往患 1 型糖尿病 4 年，长期皮下注射胰岛素。近 3 天因腹泻而停用。体检：血压 80/60mmHg，皮肤中度失水征，呼吸深大，有烂苹果味，心率 130 次 / 分。需立即采取的治疗措施是（）。

- A. 静脉滴注 5%碳酸氢钠
- B. 纠正电解质紊乱
- C. 补液并恢复皮下注射胰岛素
- D. 补液加有效的抗生素
- E. 补液同时静脉滴注胰岛素 **正确答案：**E

36、单选 大叶性肺炎治疗首选药物是（）。

- A. 阿奇霉素
- B. 庆大霉素
- C. 青霉素
- D. 头孢他啶
- E. 胃肠道解痉剂

正确答案：C

参考解析：大叶性肺炎治疗首选青霉素 G，用药途径及剂量视病情轻重及有无并发症而定。

37、单选 可引起心动过缓的降压药（）。

- A. 卡托普利
- B. 硝苯地平
- C. 氢氯噻嗪

- D. 氨苯蝶啶
- E. 美托洛尔

正确答案：E

38、单选 钻石征（）。

- A. 二尖瓣脱垂
- B. 二尖瓣狭窄
- C. 大量心包积液
- D. 肥厚型心肌病
- E. 扩张型心肌病

正确答案：E

39、单选 引起左室后负荷增高的主要因素是（）。

- A. 肺循环高压
- B. 体循环高压
- C. 回心血量增加
- D. 主动脉瓣关闭不全
- E. 红细胞压积增大

正确答案：B

参考解析：前负荷是指心肌收缩之前所遇到的阻力或负荷，即在舒张末期，心室所承受的容量负荷或压力就是前负荷。在临床上，测定心室容量比较困难，通常情况下用心室的舒张末压作为指标，相对来说回心血量增多，心室的前负荷增加。后负荷是指心肌收缩之后所遇到的阻力或负荷，又称压力负荷。主动脉压和肺动脉压就是左、右心室的后负荷。取决于主动脉的顺应性，血液粘度，外周血管阻力等

40、单选 女性，35岁，诊断风湿性心脏病，重度二尖瓣狭窄，突发心悸、呼吸困难、咳粉红色泡沫痰。查体：BP90/70mmHg，端坐呼吸，双肺满布湿啰音，心率155次/分，第一心音强弱不等，节律不齐。给予毛花苷C 0.4mg 静脉滴注，目的是（）。

- A. 增加心肌收缩力
- B. 减慢窦率
- C. 纠正房颤
- D. 降低心室自律性
- E. 减慢心室率

正确答案：E

41、单选 女性，32岁，反复发热在37.5~38℃左右1个月，伴关节肌肉酸痛就诊。查体：轻度贫血，心界不大，心率90次/分，心尖有收缩期吹风样杂音3/6级，并有收缩中期喀喇音。诊断为风湿性心脏病，二尖瓣关闭不全，发热待查。本例拟给予心内膜炎诊断性治疗，对抗生素反应良好，5小时后体温逐渐降至正常，此时抗生素应用疗程是（）。

- A. 2周
- B. 体温正常后3小时可停用抗生素

- C. 5 个月
- D. 4~8 周
- E. 10 个月

正确答案：D

42、单选 男性，26 岁，上感 4 天后，出现水肿加重，齿龈出血，呼吸困难不能平卧，BP230/120mmHg，全身水肿，尿蛋白（++），红细胞 8~10 个/HP，BUN40mmol/L，血肌酐 1300 μ mol/L，二氧化碳结合力 18mmol/L，紧急措施是（）。

- A. 应用止血药物
- B. 静脉滴注抗感染药物
- C. 应用泼尼松治疗感染
- D. 应用呋塞米减轻水肿
- E. 应用血管扩张药，降压、强心、利尿

正确答案：E

43、单选 男性，34 岁，诊断急粒白血病 M3，化疗时突发 DIC，并迅速发展至消耗性低凝期。下列检查结果，哪项是不符合的（）。

- A. 纤维蛋白原浓度降低
- B. 凝血酶原时间缩短
- C. 血小板数明显减少
- D. 血小板因子 4 水平增高
- E. 抗凝血酶 III 水平减低

正确答案：B

44、单选 男性，48 岁，慢性肾盂肾炎，尿培养为变形杆菌，尿沉渣白细胞 5~10 个/HP，经内科治疗症状暂时缓解，但实验室检查尿仍然无好转。慢性肾盂肾炎的疗程为（）。

- A. 1~2 周
- B. 10~14 天
- C. 2~4 月
- D. 0.5~1 年
- E. 1~2 年

正确答案：C

45、单选 女性，10 岁，阵发性腹痛、黑便 2 天，双下肢散布出血点，双膝关节肿胀，腹软，右下腹压痛，白细胞 $12.5 \times 10^9/L$ ，血小板 $200 \times 10^9/L$ ，血红蛋白 110g/L，尿常规：蛋白质（+），红细胞（+）/HP，颗粒管型 0~3 个/HP。诊断可能是（）。

- A. 肠套叠
- B. 急性阑尾炎
- C. 风湿性关节炎

- D. 过敏性紫癜
- E. 急性肾小球肾炎

正确答案：D

46、单选 男性，19岁，腹泻2周后出现心悸，ECG示频发室性期前收缩，下述哪项不符合室早心电图改变（）。

- A. T波方向与QRS主波方向相反
- B. 提前出现宽大畸形的QRS波
- C. QRS波群前出现倒置P波
- D. 代偿间歇完全
- E. 室性融合波

正确答案：C

47、单选 男性，35岁，高热、皮肤瘙痒半个月，右颈及锁骨上淋巴结肿大，无压痛，互相粘连，血红蛋白90g/L，白细胞 $10 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞0.66，淋巴细胞0.24，骨髓涂片找到里-斯细胞。最可能诊断为（）。

- A. 慢性淋巴细胞白血病
- B. 结核性淋巴结炎
- C. 癌转移
- D. 淋巴瘤
- E. 风湿性疾病

正确答案：D

48、单选 男性，27岁，尿频、尿急、尿痛1年，一般抗炎治疗不好转，时有低热无力，尿检示白细胞20~30/HP，红细胞5~8个/HP，肾图示右肾严重受损，左肾积水，初诊为肾结核。为了治疗哪项检查更好（）。

- A. 血Cr
- B. 右肾穿刺造影
- C. 左肾穿刺造影
- D. 尿结核菌培养
- E. 肾扫描

正确答案：A

49、填空题 中心静脉置管常用的方法为（）及（）。

正确答案：股静脉置管；颈内静脉置管

50、单选 女，29岁，半月来发热伴皮肤出血点。化验血呈全血细胞减少，骨髓检查增生极度活跃，原始细胞占骨髓非红系有核细胞的40%，各阶段粒细胞占50%，各阶段单核细胞占30%，诊断急性白血病，其FAB分类的类型是（）。

- A. M1
- B. M2
- C. M3
- D. M4

E. M5

正确答案：C

参考解析：M4 原始细胞占骨髓非红系有核细胞的 30%以上，各阶段粒细胞 30%~80%，各阶段单核细胞占大于 20%。本病例化验结果符合。

51、单选 男性，56 岁，原有冠心病劳力型心绞痛史，心电图示 V¹~V⁴ 波倒置。3 天来每天清晨 5 时出现剧烈胸痛发作，持续时间较往常心绞痛时间长，心电图示 V¹~V⁴ 波由倒变直立，诊断为（）。

- A. 变异型心绞痛
- B. 卧位性心绞痛
- C. 恶化型劳力性心绞痛
- D. 心内膜下心梗
- E. 心包炎

正确答案：B

52、单选 男，42 岁，呕吐、腹泻 2 天，意识模糊、烦躁不安半天急诊入院。查体：BP110/70mmHg，神志恍惚，巩膜中度黄染，颈部可见数枚蜘蛛痣。心肺未见异常，腹软，肝肋下未触及，脾肋下 3cm。双上肢散布出血点，Hb90g/L，WBC $3.22 \times 10^9/L$ ，血糖 7.0mmol/L，尿糖（+），尿酮（-），尿镜检（-）。如果患者躁动不安，不宜选用（）。

- A. 东莨菪碱
- B. 地西洋
- C. 水合氯醛
- D. 扑尔敏
- E. 异丙嗪

正确答案：C

53、单选 女，72 岁，软弱无力，进食减少，口渴、多尿 3 周，近 2 天嗜睡。急诊检查：BP80/60mmHg，神志朦胧，皮肤干燥失水，呼吸 34 次/分，心率 108 次/分，尿糖（++++），尿酮（±）。既往无糖尿病史。为明确诊断，除血糖测定外，首选的检查是（）。

- A. 血电解质+BUN、Cr
- B. 糖基化血红蛋白+BUN、Cr
- C. 血气分析+BUN、Cr
- D. 血酮体+血气分析
- E. 血乳酸+血气分析

正确答案：A

54、单选 男，34 岁，发热、面色苍白伴牙龈出血 2 周入院。入院次日起出现皮肤多处片状瘀斑、血尿。血红蛋白 78g/L，白细胞 $2.0 \times 10^9/L$ ，血小板 $50 \times 10^9/L$ ，血浆纤维蛋白原 0.8g/L。骨髓检查：有核细胞增生极度活跃，细胞质颗粒粗大的早幼粒细胞占 90%。患者出血的首要原因是（）。

- A. 异常早幼粒细胞浸润血管壁
- B. 血小板减少
- C. 血小板减少伴功能异常
- D. 凝血因子 II、VIII、IX、X 缺乏
- E. DIC

正确答案：E

参考解析：发热、面色苍白伴牙龈出血为骨髓造血功能受抑制的表现，皮肤多处片状瘀斑、血尿为 DIC 的临床表现，血红蛋白减少、白细胞减少、血小板减少，骨髓检查有核细胞增生极度活跃，细胞质颗粒粗大的早幼粒细胞占极大比例，考虑急非淋 M3 型合并 DIC 引起出血。

55、填空题 肾盂肾炎的并发症可有（）、（）、（）、（）、（）。

正确答案：肾盂积脓；肾乳头坏死；肾周围脓肿；肾功能衰竭；败血症

56、单选 男性，60 岁，患高血压病多年，1 年来血压经常为 170~180/110~120mmHg。X 线胸片示左室增大，肺淤血。眼底为高血压三级改变，尿常规正常，诊断为（）。

- A. 高血压病二期
- B. 高血压病一期
- C. 高血压病三期
- D. 急性高血压
- E. 高血压危象

正确答案：C

57、单选 女 24 岁，多饮多尿，乏力，螺内酯试验阳性（）。

- A. 血钾 2.8mmol/L
- B. 尿 VMA 增高
- C. 血糖 8.6mmol/L
- D. 血浆肾素活性增加
- E. 血红蛋白 5.6g/L

正确答案：A

58、填空题 缺氧和二氧化碳潴留的发生机制有（）、（）、（）、（）、（）。

正确答案：通气不足；通气血流比值失调；弥散障碍；肺动静脉样分流；氧耗量

59、填空题 酸碱平衡的调节机制有（）、（）。

正确答案：缓冲系统离子交换肺调节；肾调节

60、填空题 非甾体抗炎药的作用机制是（）。

正确答案：抑制环氧化酶，减少前列腺素的产生

61、单选 男性，54 岁。胸闷、劳累后胸痛 4 年，疑诊肥厚型心肌病来诊。诊断肥厚型梗阻性心肌病时在心脏听诊上不需和下列哪种疾病相鉴别（）。

- A. 主动脉瓣关闭不全
- B. 风湿性二尖瓣关闭不全
- C. 先天性主动脉瓣口狭窄
- D. 室间隔缺损
- E. 陈旧性心肌梗死

正确答案：A

62、填空题 心包穿刺的适应证包括（）、（）、（）。

正确答案：病因未明的心包积液的诊断；缓解急性压塞或大量心包积液的症状；心包腔内注射药物以辅助治疗

63、单选 感染性心肌炎（）。

- A. 心肌细胞肥大，变性纤维化
- B. 心肌细胞肥大，形态特异，排列紊乱
- C. 心肌细胞溶解，间质水肿，单核细胞浸润
- D. 心肌细胞及间质水肿，纤维化，线粒体变性
- E. 心肌变性呈弥漫性，坏死呈灶状分布

正确答案：C

64、单选 男，18岁，神志不清1小时入院，既往患1型糖尿病4年，长期皮下注射胰岛素。近3天因腹泻而停用。体检：血压80/60mmHg，皮肤中度失水征，呼吸深大，有烂苹果味，心率130次/分。最可能与诊断无关的检查是（）。

- A. 血气分析
- B. 血电解质测定
- C. 血糖
- D. 尿糖、尿酮
- E. 血培养

正确答案：E

65、单选 男性，55岁，黑矇4年，伴胸闷乏力，近1年加重。查体：心界不大，心率45次/分，节律不齐，双肺无啰音，下肢无浮肿。心电图示PP间期显著延长，达2.6秒，其间无P波及QRS波，长PP间期与基本窦性PP间期无倍数关系。可做哪项检查协助诊断，除外（）。

- A. 心腔内电生理检查
- B. 食管调搏
- C. 阿托品试验
- D. 右心导管
- E. Holter监测

正确答案：B

66、单选 男性，50岁，腰痛2个月，近1周右下肢活动困难，外院诊断坐骨神经痛，查Hb85g/L，ESR90mm/h，尿蛋白（++），该诊断首先考虑为（）。

- A. 风湿关节炎

- B. 类风湿关节炎
- C. 肾肿瘤骨髓转移
- D. 慢性肾炎
- E. 多发性骨髓瘤

正确答案：E

67、填空题 外周血嗜酸性粒细胞在 $(1.5 \sim 5.0) \times 10^9 / L$ ，属于嗜酸性粒细胞（）增多。

正确答案：中度

68、单选 女，22岁，颈前肿物3个月。查体：右叶甲状腺可触及一质硬结节，直径2cm。同侧颈淋巴结可及2个，质中，活动。B型超声：甲状腺右叶一低回声实性团块。为明确肿物良恶性，下列各项检查，首先应选择（）。

- A. 同位素扫描
- B. 血清降钙素测定
- C. 针吸细胞学检查
- D. 颈部软组织显像
- E. 右侧颈淋巴结活检

正确答案：C

参考解析：甲状腺癌的诊断主要根据临床表现，若甲状腺肿块质硬、固定，颈淋巴结肿大，或有压迫症状者，或存在多年的甲状腺肿块，在短期内迅速增大者，均应怀疑甲状腺癌，细针穿刺细胞学检查可帮助诊断，正确率达80%以上。

69、单选 男性，26岁，心悸、气短、胸闷、晕厥。查体：胸左缘第3肋间3/6收缩期杂音。超声：室间隔左室流出道处肥厚。该杂音在以下哪种药物时会增强（）。

- A. 卡托普利
- B. 硝酸甘油
- C. 普萘洛尔
- D. 呋塞米
- E. 硝苯地平

正确答案：B

70、单选 心动周期中，室内压升高速率最快的时相是（）。

- A. 心房收缩期
- B. 等容收缩期
- C. 快速射血期
- D. 减慢射血期
- E. 快速充盈期

正确答案：B

参考解析：心室收缩期包括等容收缩期以及快速、减慢射血期。

(1) 等容收缩期心室开始收缩，室内压尚低于主动脉压，半月瓣仍处于关闭状态，心室成为一个封闭腔。虽然心室收缩，但心室容积没有改变，故称等容收缩期。

(2) 射血期等容收缩期间室内压升高超过主动脉压时，半月瓣被冲开，等容收缩期结束，进入射血期。此期室内压继续上升达峰值。

心室舒张期包括等容舒张期和快速、减慢充盈期。

(1) 等容舒张期：心室肌开始舒张后，室内压下降，主动脉内血液向心室方向返流，推动半月瓣关闭；此时室内压仍高于房内压，房室瓣依然处于关闭状态，心室又成为封闭腔。心室肌舒张，室内压急速大幅度下降，但容积并未改变。这段时期称为等容舒张期。

(2) 充盈期：当心室压降低于房内压时，房室瓣开启，心室充盈开始，血液顺着房-室压力梯度快速流入心室，称此期间为快速充盈期

71、单选 女性，38岁，诊断风湿性心脏病二尖瓣狭窄（中度），突发心悸2天，伴呼吸困难，不能平卧，查体：BP95/75mmHg，口唇发绀，双肺较多湿啰音，心率150次/分，第一心音强弱不等，节律绝对不规则，心尖部舒张期隆隆样杂音，肝不大，下肢无水肿。为明确诊断应立即做（）。

- A. 心电图检查
- B. 心脏X线检查
- C. 心向量图检查
- D. 超声心动图检查
- E. T3、T4、TSH检查

正确答案：A

72、单选 男，39岁，健康体检发现甲状腺肿大就诊，查体甲状腺对称性Ⅲ度肿大，表面不平，中等硬度，无触痛，无血管杂音，心率75次/分钟。拟诊慢性淋巴细胞性甲状腺炎，有助于确诊的首选检查是（）。

- A. TSH、FT₃、FT₄
- B. 抗甲状腺抗体
- C. 甲状腺B超
- D. 甲状腺吸I率
- E. 甲状腺CT

正确答案：B

参考解析：慢性淋巴细胞性甲状腺炎又称桥本甲状腺炎(HT)，属于自身免疫性甲状腺炎，凡是弥漫性甲状腺肿大，特表示伴峡部椎体叶肿大，不论甲状腺功能是否有改变，都应怀疑HT，如血清抗甲状腺抗体TPOAb和TgAb显著升高对诊断即可成立。故选项是B。

73、单选 男性，66岁，无痛性肉眼血尿伴条状血块2个月，B超可见左肾轻度积水，2次细胞学检查未见癌细胞。为进一步诊治下列哪项检查最有价值（）。

A. 膀胱镜检查

- B. 尿路 X 线平片和排泄性尿路造影
- C. 血、尿常规，肝、肾功能
- D. 膀胱造影
- E. MRI

正确答案：B

74、填空题 类风湿关节炎的病因尚不清楚，可能与（）和（）有关，人白细胞抗原（）被认为是 RA 易感性的基础。

正确答案：环境因素；遗传因素；HLA-DR4

75、单选 发作时两肺广泛哮鸣音，缓解后哮鸣音消失，常见于（）。

- A. 支原体肺炎
- B. 肺炎链球菌肺炎
- C. 慢性支气管炎急性发作期
- D. 支气管哮喘
- E. 支气管扩张症

正确答案：D

参考解析：支气管哮喘发作时胸部呈过度充气状态，有广泛的哮鸣音，呼气音延长。但在轻度哮喘或非常严重哮喘的发作时，哮鸣音可不出现。慢支合并哮喘可闻及广泛哮鸣音并伴呼气期延长。早期或干性支气管扩张症可无异常肺部体征，病变重或继发感染时常可闻及下胸部、背部固定而持久的局限性粗湿啰音，有时可闻及哮鸣音。

76、单选 女性 25 岁。风湿性心脏病主动脉瓣狭窄，近 3 周来乏力不适就诊。查体：皮肤有少量瘀点，主动脉瓣区有收缩期和舒张期杂音，脾可触及。血红蛋白 80g/L。下列哪项实验检查最有助于明确诊断（）。

- A. 血细胞分类
- B. 血沉
- C. 血培养
- D. C 反应蛋白
- E. 抗 O

正确答案：C

77、单选 下列哪项是治疗脑膜白血病首选药物（）。

- A. 长春新碱
- B. 环磷酰胺
- C. 三尖杉碱
- D. 6-巯基嘌呤
- E. 甲氨蝶呤

正确答案：E

参考解析：甲氨蝶呤鞘内注射可用于预防和治疗脑膜白血病以及恶性淋巴瘤的神经侵犯。

78、单选 肾下极严重裂伤可施行（）。

- A. 肾切除术
- B. 血管修复术
- C. 选择性肾动脉栓塞术
- D. 部分肾切除术
- E. 肾脏修补术

正确答案：D

79、填空题 ^{131}I 治疗甲亢的机制是 ^{131}I 能释放出（）射线而破坏甲状腺滤泡上皮细胞。服药后常见的急性并发症为（），常见的慢性并发症为（）。

正确答案： β ；放射性甲状腺炎；甲状腺功能减退

80、单选 慢性粒细胞白血病（）。

- A. NAP 强阳性
- B. t(9:22)(q34:q11)
- C. PAS 阳性
- D. 过氧化物酶阳性
- E. 非特异性酯酶阳性，能被 NaF 抑制

正确答案：B

81、单选 在心肺复苏期间，对于难治性室速和室颤，建议应用（）。

- A. 肾上腺素（0.5~1.0mg）
- B. 阿托品（0.6~2.0mg）
- C. 胺碘酮 [150~500mg 静脉滴注，10mg/（kg·D. 静脉滴注）]
- D. 10%葡萄糖酸钙 5~10ml 静脉滴注
- E. 异丙基肾上腺素（15~20 $\mu\text{g}/\text{min}$ ）

正确答案：C

82、单选 再生障碍性贫血（）。

- A. 可见 Auer 小体
- B. 红细胞大小不等，中心淡染区扩大
- C. 细胞中含粗大嗜清颗粒比例 $\geq 30\%$
- D. 骨髓增生低下，造血细胞减少
- E. 红细胞中有染色质小体

正确答案：D

83、单选 男，49岁，既往体健，因头晕半天，黑便3次，急诊。血压 80/50mmHg，心率 124次/分，面色苍白，冷汗。急救措施首选（）。

- A. 抗炎补液治疗
- B. 开腹探查
- C. 含服硝酸甘油
- D. 溶栓治疗
- E. 输血、补液，纠正休克

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/128063024140006070>