

执业医师考试试题及答案(600题)

- 1、每分通气量减于肺泡通气量(D) A.潮气量×心率 B.功能余气量×心率 C.余气量×心率 D.无效腔气量×心率 E.肺活量×心率
- 2、下列为含有B族维生素的辅酶,例外的是(C) A.磷酸吡哆醛 B.辅酶A C.细胞色素C D.四氢叶酸 E.硫胺素焦磷酸
- 3、桥接坏死见于:(E) A、急性轻型肝炎 B、急性中型肝炎 C、急性重型肝炎 D、慢性轻型肝炎 E、慢性中重型肝炎
- 4、丁卡因主要用于(E) A.浸润麻醉 E.表面麻醉
- 5.血清中常规检查检测不到的HBV标志物是(C) A、HBsAg B、HBeAg C、HBcAg D、抗-HBe E、抗-HBc
- 6、大叶性肺炎实变期不会出现的体征:(D) A.急性病容 B.触诊时语音震颤增强 C.肺部叩诊浊音 D.气管向健侧偏 E.心率加快
- 7.社区获得性肺炎最常见的致病菌是(C) A.金色葡萄球菌 B.流感嗜血杆菌 C.肺炎链球菌 D.肺炎军团菌 E.肺炎支原体
- 8.治疗心房颤动可用抗凝剂首选(A) A、华法林 B、肝素 C、尿激酶 D、阿司匹林 9.我国法定传染病中甲类传染病包括(D) A.天花和鼠疫 B.狂犬病和天花 C.霍乱和副霍乱 D.鼠疫和霍乱 E.艾滋病和霍乱
- 10、细胞内液中主要的阳离子是(A) A. K⁺ B. Na⁺ C. Ca²⁺ D. Mg²⁺ E. Fe²⁺
- 11.思维内容障碍不包括(A) A.思维散漫 B、关系妄想 C、被控制感 D、被洞悉感
- 12.休克病人中心静脉压为高,血压正常,处理原则为(C) A. 使用强心药物 B.用缩血管药 C.用扩血管药 D.补液试验 E.充分补液
- 13.行腹手术后,病人应采取的体位是(D)(有人说是术中的体位,你的意见呢?看贴的请回复!) A.平卧位 B.侧卧位 C.高坡卧位 D.低半坐位 E.15°~30°头高脚低斜坡卧位
- 14.引起破伤风的是(D) D.厌氧芽胞杆菌 E.梭状芽胞杆菌
- 15.腹部闭合性损伤中最易损伤的实质性器官是(B) A.肝脏 B.脾脏 C.胰腺 D.肾脏 E.肾上腺
- 16、急性梗阻性化脓性胆管炎最常用的有效手术方式是(C) C.胆总管切开引流 D.胆囊切开
- 17、胰岛素瘤来源于胰腺(B) A.A细胞 B.B细胞 C.G细胞 D.D细胞 E.D1细胞
- 18、急性尿潴留病因中,属于非机械性梗阻的是(E) A.尿道结石 B.前列腺增生 C.尿道断裂 D.尿道肿瘤 E.外伤性高位截瘫
- 19、孕38周时的羊水量约为(B) A. 800ml B. 1000ml C. 600ml D. 400ml E. 300ml
- 20.初产妇第一产程潜伏期延长是指潜伏期超过(E) A、8小时 B、10小时 C、12小时 D、14小时 E、16小时
- 21.与病理缩复环关系最密切的是(E) A. 双胎妊娠 B.先兆子痫 C.子宫收缩过强 D.胎盘早剥 E.嵌顿性肩先露
- 22.子宫肌瘤发生红色样变常见于(A) A.妊娠期 B.围绝经前期 C.绝经前期 D.红斑狼疮治疗期 E.生育期
- 23.最常见的输卵管宫外孕病灶部位在输卵管(B) A.伞部 B.壶腹部 C.峡部 D.壶腹部和峡部相接处 E.间质部
- 24.子宫内膜癌I期的治疗方式(C) A、化疗 B、放疗 C、手术切除
- 25、2岁小儿身长约(D) A. 32cm B. 50m C. 75cm D. 85cm E. 95cm
- 26、2岁小儿按公式计算体重约(kg)(D) A. 3 B. 6 C. 9 D. 12 E. 15
- 27、1岁小儿胸围是(C) A. 32cm B. 34m C. 46cm D. 50cm E. 56cm
- 28、3个月小儿头围是:(C) A. 32cm B. 34m C. 40cm D. 50cm E. 56cm

29. 1岁以内婴儿热能，每日每公斤约需（C） A. 90 kcal B. 100 kcal C. 110kcal D. 120 kcal E. 130 kcal
30. 3个月小儿， 体重 5Kg， 应给 8% 糖牛奶多少：（B） A. 450ml B. 550ml C. 650ml D. 750ml E. 850ml
（ 3 1 ～ 3 2 题） A. 3 天 B. 5 天 C. 7 天 D. 10 天 E. 14 天
31. 麻疹病人解除隔离的指标是出疹后（B）
- 32、麻疹合并肺炎病人解除隔离的指标是出疹后（D）
33. 法洛四联征最早出现的症状是（B） A. 呼吸困难 B. 青紫 C. 活动耐力下降 D. 杵状指 E. 蹲踞
- 34、治疗高渗性脱水的理想液体是（D） B. %葡萄糖液 C. 0. 9%NS D. 0. 45%NS E. 平衡盐溶液
- 35、心肌梗死硝酸甘油用量是多少？ （A） A、10-20 B、20-30 C、30-40 D、40-50 E、50-70
- 36、红细胞破坏过多的贫血（D） A、再障性贫血 B、铁粒幼蛋白贫血 C、巨幼细胞贫血 D、珠蛋白生成障碍性贫血
39. 胸部手术胸腔引流血性液体多少考虑有持续出血的可能（D） A 50ml B、100ml C、150ml D、200ml E、500ml
40. 持续性房颤应多长时间？（E） A 1 周 B 3 周 C 一个月 D 三个月 E 一年
- 41、心包积液心包穿刺抽液不超过多少 ml？ （E） A 50 B 75 C 100 D 150 E 200
42. 岁婴儿， 体重 10Kg， 烧伤面积 10% 取除基础补液量应补多少液体？（C） A 100 B 150 C 200 D 250 E 300
43. 骨折长期卧床引起并发症有（E） A 脂肪栓塞 B、创伤性关节炎 E、坠积性肺炎
44. 骨折功能复位标准正确是（E） C、长骨干骨折对位至少 3/4 D、下肢短缩不超 2 cm E、旋转必须复位
45. 胫骨下 1 / 3 骨折不愈合的原因（C） B、骨质薄，肌肉组织少 C 骨营养动脉受损
46. 股骨头复位造成股骨头缺血的方法是（C） A Allis(提拉法) B. Stimson(悬垂法) C. Bigelow（旋转法） D、Hippocrates(用于肩关节脱位)
47. 断肢再植成功率高的是什么损伤（E） C。。。碾伤 D 机器绞伤 E 劫匪用利刀砍断
48. 关于心理不正确的是：对客观的反映
- 49、小儿前囟闭和的时间（B） A 6-12月 B、12-18月 C、18-24月 D、24-48月 E、48-96月
50. 选定暴露和未暴露于某种因素的两种人群，追踪其各自的发病结局，比较两者发病结局的差异，从而判断暴露因素与发病有无因果关系及关联程度，该研究为（A） A. 队列研究 B. 病例对照研究 C. 现况调查研究 D. 临床试验研究 E. 现场干预试验
- 51、肩周炎属自限性疾病，恢复时间（C） A、1 个月． B、3 个月． C、1 年． D、2 年 D、3 年
- 52、开放性肋骨骨折处理不正确的是（A） A、肋骨悬吊固定 B、清创缝合 C、肋骨骨折断端固定 D、胸腔闭式引流 E、应用抗生素
- 53、输血液制品容易出现细菌性反映的是（C） A、浓缩血小板 B、浓缩白细胞 C、新鲜冰冻血浆 D、白蛋白 E、洗涤红细胞
- 54、肾绞痛伴镜下血尿，应考虑（D） A 肾肿瘤 B 肾结核 C 急性肾盂肾炎 D 肾输尿管结石 E 肾积水
- 55、我国过献血时没列入筛选的疾病是（B） A、HIV B、巨细胞病毒 C、HBV D、HCV E、梅毒螺旋体
- 56、中心性肺癌早期临床表现（D） A、胸闷、呼吸困难 B、声音嘶哑 D、咳嗽和咳血痰
- 57、骨性膝关节炎病理表现（E） D、膝内翻畸形 E、膝关节滑膜退行性病变
- 58、维生素 D 缺乏最早出现的骨变化是（B） A、方颅 B、颅骨软化 C、肋骨串珠 D、鸡胸 E、肋膈沟
59. 新婚夫妇拟 1 年后再考虑妊娠来院咨询，最适宜的避孕方法应是（C） 安全期避孕法 B. 避孕套 C. 口服避孕药 D. 放置宫内节育器 E. 皮下埋置避孕药
- 60、医院没有注册中医，但该医院聘请一退休的中医来看病（B） A、非法行医 B、超范围行医
- 61、Asherman 征是什么原因闭经（A） A、子宫性 B、下丘脑性 C、垂体性

- 62、椎动脉型颈椎病的主要临床表现 （ D ） D、眩晕 E、压头试验阳性
- 63、早期食道癌临床表现 （ B ） A、进食呛咳 B、进食梗噎感 C、吞咽困难
- 64、新生儿寒冷硬肿症首先出现在那个部位？ （ A ） A、小腿 B、面部 C、大腿 D、臀部 E、上肢
- 65、新生儿 24 小时内出现黄疸是 （ B ） A、生理性黄疸 B、病理性黄疸
- 66 、新生儿溶血最常见 （ C ） A、RHD B、RHE C、ABO 溶血
- 67、骑跨伤易损伤尿道哪个部分 （ B ） A、膜部 B、球部
- 68、恶性卵巢瘤出现胸水、腹水的是 （ D ） A、浆液性囊腺瘤 B、粘液性囊腺瘤 C、间皮瘤 D、纤维瘤 E、皮样囊肿
- 69、膀胱癌组织类型是 （ E ） A、磷状细胞癌 B、内翻乳头状瘤 E、移行细胞癌 70、绒癌首先转移的部位 （ D ） A、肝 B、肾 C、脑 D、肺
- 71、4 岁男孩，右侧阴囊包块，平卧后不消失，透光试验阳性，应考虑的诊断是 （ C ） A、精索鞘膜积液 B、交通性鞘膜积液 C、右睾丸鞘膜积液 D、睾丸肿瘤 E、附睾结核
- 72、25 岁初产妇，妊娠 38 周，规律宫缩 8 小时，未破膜，宫口开大 3cm，胎心 140 次/分。本例正确处置应是 （ B ） A. 严密观察产程进展 B.人工破膜 C.静注 25%葡萄糖液和内加维生素 C D.静脉滴注缩宫素，加速产程进展 E.立即行剖宫产术
- 73、初产妇，妊娠 39 周，枕左前位，规律宫缩 8 小时，宫口开大 3cm，胎头 S=0。本例正确处置应是 （ A ） A. 不需干扰分娩进程 B.人工破膜 C.静注 25%葡萄糖液和内加维生素 C D.静脉滴注缩宫素，加速产程进展 E.立即行剖宫产术
- 74、X 片和 CT 片中的是？ （ E ） D、中心性肺癌 E、神经源性肿瘤
- 75.一母亲产一女，因智能低下查染色体核型为 46，XX，-21，+t(21q21q)，查母亲染色体核型为 46，XX，-21，-21，+t(21q21q)，再产。。。（忘了）为 （ E ） A.10% B.25% C.50% D.75% E.100%
- 76.2 岁男孩，出生时正常，3 个月后皮肤和头发色泽逐渐变浅。目前不会独站，不会说话，偶有抽搐，身上有怪臭味，有助于诊断的检查是 （ C ） A 脑电图 B 血钙测定 C 尿三氯化铁试验 D 尿甲苯胺蓝试验 E 血镁测定
- 77、生后智能渐渐落后，皮肤和头发色泽逐渐变浅，身上有尿臭味，有助于诊断的检查是 （ C ） A、脑电图 B、血钙、 C、有机酸分析 D、血钾 E、血镁
- 78、5 岁男孩，颜面浮肿 2 月，血压 120/80mmHg，查尿常规：蛋白（+++），红细胞 15 个/HP，血总蛋白 40g/L，白蛋白 25g/L。该患儿最可能的诊断是 （ D ） A 急性肾炎 B 慢性肾炎 C 单纯性肾病综合征 D 肾炎性肾病综合征 E 急进性肾炎
- 79、关于管型正确的是 （ A ） A．红细胞管型，常见于肾盂肾炎 B．白细胞管型，常见于急性肾炎 C．脂肪管型，常见于急性肾衰竭 D．蜡样管型，常见于肾病综合征 E．粗大上皮细胞管型，常见于慢性肾炎晚期 男性，20 岁，平素健康，淋雨后突发寒颤、高热、头痛，第 2 天出现右侧胸痛、咳嗽、咳痰，胸片示右上肺大片实变影
- 80.体检不会出现的体征是 （ B ） A. 右上肺扣诊浊音 B.气管向左侧偏移 C.右上肺语颤增强 D.急性病容 E.脉率增快
- 81.最可能的诊断为 （ D ） A. 胸膜增厚 B.肺脓肿 C.肺结核 D.大叶性肺炎 E.肺梗死
- 82、分泌胃酸的壁细胞存在于什么部位 （ C ） B、胃体和胃窦 C、胃体和胃底 D、胃底和胃窦
- 83、肾结核的特征性症状 （ E ） A、低热盗汗 B、脓血尿 E、慢性膀胱刺激炎
- 84、结核寒性脓肿表现不正确的是 红肿热痛
- 85、肾母细胞瘤主要表现 （ C ） A.腹痛 B.血尿 C.腹部包块 D.蛋白尿 E.发热
- 86、病毒性脑膜炎脑脊液性状： （ C ） A、白细胞增多，糖增多，CL 增多，蛋白质增多 B、白细胞增多，糖减少，CL 减少，蛋白质增多 C、白细胞增多，糖正常，CL 正常，蛋白质增多 D、白细胞正常，糖增多，CL 正常，蛋白质增多 E、白细胞正常，糖正常，CL 正常，蛋白质降低
- 87、蛋白质含量最高的是 （ B ） A、大米 B、鸡蛋 C、牛奶 D、豆类 E、玉米 88、蛋白质含量最

低的是（ A ） A、大米 B、鸡蛋 C、牛奶 D、豆类 E、玉米 男性，26岁，5天来鼻及牙龈出血，皮肤瘀斑，血红蛋白55g，白细胞 $10.0 \times 10^9/L$ ，血小板 $16 \times 10^9/L$ 。骨髓增生活跃，幼稚细胞占80%，胞浆有大小不等颗粒及成堆棒状小体，过氧化酶染色强阳性

89.诊断考虑（C） A. M1 B. M2 C. M3 D. 慢性粒细胞性白血病急变 E. 急性单核细胞性白血病

90.本患者临床容易出现（B） A. 巨脾 B. DIC C. 严重感染 D. 中枢神经系统受侵犯 E. 牙龈肿胀

91.本患者治疗首选（B） A. DA 方案 B. 全反式维A酸 C. 羟基尿 D. VP 方案 E. 骨髓移植 女性，38岁，糖尿病12年，每日皮下注射人混合胰岛素治疗，早餐前30单位，晚餐前24单位，每日进餐规律，主食量300g。近来空腹血糖 12.5 mmol/L ，餐后血糖 $7.6 \sim 9.0 \text{ mmol/L}$

92.为确定空腹高血糖的原因最有意义的检查是（D） A. 多次测定空腹血糖 B. 多次测定餐后血糖 C. 测定糖化血红蛋白 D. 夜间血糖监测 E. 口服葡萄糖耐量试验

93.最可能的情况是（A） A. somogyi 或黎明现象 B. 晚餐主食过多或过少 C. 未加口服降糖药物 D. 餐后血糖控制不住 E. 存在胰岛素抵抗

94.较为合适的处理是（B） A. 调整进餐量 B. 胰岛素调整剂量 C. 加磺脲类降糖药物 D. 加双胍类降糖药物 E. 改用口服降糖药 男性，56岁，反复上腹痛1年，禁食后呕吐1个月，呕吐物含有宿食。查体：贫血貌、消瘦，上腹可见胃型，可闻及振水音

95.最有价值的辅助检查是（E） A. B超 B. 腹部CT C. 纤维胃镜 D. 腹部X线平片 E. 全消化道钡餐

96.患者最早出现的酸碱失衡和水电解质紊乱的类型是（A） A. 低钾血症、代谢性碱中毒 B. 高钾血症、代谢性酸中毒 C. 高钾血症、代谢性碱中毒 D. 低钾血症、代谢性酸中毒 E. 低氯血症、代谢性酸中毒 男性，55岁，进行性吞咽困难三个月，体重下降5kg，查无阳性所见

97.对该病人最可能的诊断是（B） A. 食管灼伤狭窄 B. 食管癌 C. 食管平滑肌瘤 D. 贲门失弛缓症 E. 食管憩室 98.首选检查方式是（D） A. 胸部CT B. 食管超声波检查 C. 食管拉网 D. 食管镜检查活检 E. 胸部MRI

99.食管吞钡X线片描述下列哪项是错误的（A） A. 食管呈鸟嘴样改变 B. 食管充盈缺损 C. 食管管壁僵硬 D. 龛影 E. 食管粘膜断裂

100.确诊宫颈癌 宫颈活检病理诊断

101.人类免疫缺陷病毒（HIV）在人体内作用的靶细胞是（A） A. $CD4^+$ 淋巴细胞 B. $CD8^+$ T淋巴细胞 C. B淋巴细胞 D. NK细胞 E. CTL细胞

102.高血压病脑出血时，出现面神经瘫，可能的出血部位是（D） A. 小脑齿状核 B. 小脑皮质 C. 桥脑 D. 基底节 E. 延脑

103.下列治疗军团菌病的首选药物是（D） A. 青霉素 G B. 氯霉素 C. 四环素 D. 红霉素 E. 土霉素

104.医德修养要坚持（C） A. 集体性 B. 组织性 C. 实践性 D. 强制性 E. 机动性

105.《传染病防治法》规定，传染病暴发、流行时，当地政府应当（A） A. 立即组织力量进行防治，切断传染病的传播途径 B. 限制或者停止集市、集会 C. 停业、停工、停课 D. 临时征用房屋、交通工具 E. 宣布疫区 106.选定有特定疾病的人群组与未患这种疾病的对照组，比较两组人群过去暴露于某种可能危险因素的比例，分析暴露于该因素是否与疾病有关，该研究为（B） A. 现况调查研究 B. 病例对照研究 C. 队列研究 D. 实验性研究 E. 理论性研究

男性，重体力劳动工人，腰腿痛，并向左下肢放散，咳嗽、喷嚏时加重。检查腰部活动明显受限，并向左倾斜，直腿抬高试验阳性。病程中无低热、盗汗、消瘦症状

107.首先考虑的诊断是（C） A. 腰肌劳损 B. 腰椎管狭窄症 C. 腰间盘突出症 D. 强直性脊柱炎 E. 腰椎结核

108.如有小腿外侧及足内侧麻木，踝及趾背伸力下降，病变的节段应考虑为（D） A. $L1 \sim 2$ B. $L2 \sim 3$ C. $L3 \sim 4$ D. $L4 \sim 5$ E. $L5 \sim S1$ {保留以前的题干供大家对照：如有小腿及足外侧麻木，足趾跖屈力及跟腱反射弱，病变的节段应考虑是（E）}

109.为明确诊断，最有意义的检查是（B） A. X线检查 B. CT C. 超声 D. 腰椎穿刺 E. 肌电图

110.如果病史2年，并逐年加重，已严重影响生活及工作，且出现尿便障碍。其治疗方法是（E） A. 理疗 B. 按摩 C. 牵引 D. 用药 E. 手术 男性，68岁，饮酒后不能自行排尿5小时急诊住院，体检见耻骨上包块，有轻压痛

- 111.该患者最可能的病因是（A） A. 前列腺增生 B. 尿道狭窄 C. 膀胱肿瘤 D. 尿道结石 E. 神经性膀胱
- 112.要确诊病因，最简便的影像学检查是（C） A. CT B. MRI C. B 超 D. KUB E. 膀胱造影检查 男性，8 岁，枕部头皮挫伤，左侧瞳孔 4mm，对光反应消失；右侧瞳孔 2.5mm，对光反应存在
- 113.最可能的诊断是（C） A. 脑梗塞 B. 蛛网膜下腔出血 C. 颅内血肿 D. 脑挫伤 E. 颅脑肿瘤
- 114 最好的诊断措施是（D） A. 头颅超声检查 B. 脑电图 C. 头颅 MRI D. 头颅 CT E. 头颅 X 线片
- 115.引起病人浅昏迷、左侧瞳孔散大最可能原因是（C） A. 枕骨大孔疝 B. 动眼神经麻痹 C. 小脑幕切迹疝 D. 颈髓损伤 E. 右侧视神经损害 女性，55 岁，白带多，接触性出血 3 月余，3 年前曾因宫颈糜烂行宫颈冷冻治疗，妇科检查：外阴阴道未见异常，宫颈肥大糜烂、质脆，子宫及双附件未见异常
- 116.为明确诊断，首先检查项目应是（E） A. 分段诊刮 B. 宫腔镜检查 C. 腹腔镜检查 D. 宫颈锥切术 E. 宫颈多点活检
- 117.检查结果证实为宫颈上皮内瘤样病变，异型细胞占宫颈上皮全程 2/3 以上，伴 HPV 感染，此例应诊断为（C） A. CIN1 B. CIN2 C. CIN3 D. 慢性宫颈炎 E. 宫颈癌
- 118.此例的合适治疗为（D） A. 局部用药 3 个月后复查 B. 激光治疗 3 个月后复查 C. 随诊 D. 行全子宫切除术 E. 局部用药+口服消炎药 女性，25 岁，平时月经规则，3 个月前妇科检查有小肌瘤，现停经 2 月余，阴道流血 10 天。妇科检查子宫如妊娠 14 周大，软，轻压痛，双侧附件区触及 5cm 囊性包块，壁薄活动好，无压痛。血 HCG 增高明显
- 119.此例最可能的诊断是（C） A. 宫外孕 B. 卵巢巧克力囊肿 C. 葡萄胎 D. 子宫肌瘤红色变 E. 早孕合并子宫肌瘤
- 120.为确诊应首先进行的检查是（A） A. B 超 B. 血清 CA125 测定 C. 盆腔 CT D. 腹部 X 线摄片 E. 腹腔镜检查
- 121.最合适的治疗是（A） A. 立即负压吸宫 B. 抗炎治疗 C. 腹腔镜 D. 宫腔镜 E. 性激素治疗 A. 血容量不足 B. 心功能不全，血容量正常 C. 心功能不全或血容量相对较多 D. 容量血管过度收缩 E. 心功能不全或血容量不足
- 122.中心静脉压低，血压低（A）
- 123.中心静脉压高，血压低（C） A. 感受器 B. 传入神经 C. 神经中枢 D. 传出神经 E. 效应器
- 124.肌梭外肌纤维属于（E）
- 125.脊髓后角前神经纤维（B）
- 126.属于三羧酸循环的酶是（B） A. 6-磷酸葡萄糖脱氢酶 B. 苹果酸脱氢酶 C. 丙酮酸脱氢酶 D. NADH 脱氢酶 E. 葡萄糖-6-磷酸酶 A. 对心脏的影响最大 B. 对肾脏的影响最大 C. 对肺脏毒性最大 D. 对骨髓抑制最重 E. 发生腹泻最重
- 127、顺铂（B）
- 128、环磷酰胺（D） A. 心绞痛的发作与劳累有关，其性质在 1~3 个月内无改变 B. 心绞痛发作与体力活动无关，可出现短暂 ST 段抬高 C. 近 3 个月内劳力诱发的心绞痛的频率和程度加重，对硝酸甘油的需求增加 D. 既往无心绞痛或心肌梗死病史，近 1~2 个月内劳累时出现心绞痛 E. 劳累和休息时均可出现心绞痛
- 129、初发型心绞痛（D）{稳定型心绞痛（A）}
- 130、恶化型劳力性心绞痛（C） A. 骨髓细胞内可见 Auer 小体 B. 中性粒细胞碱性磷酸酶积分增高 C. Ph 染色体阳性 D. 糖原染色阳性 E. 非特异性酯酶（+），阳性可被氟化钠抑制
- 131.慢性粒细胞性白血病（C） 132.类白血病样反应（B）
- 133、胃切除术后继发残胃癌需要： 5 年 A. 思维被夺取 B. 思维被洞悉 C. 思维贫乏 D. 思维散漫 E. 思维迟缓
- 134.病人认真讲了一番话，但周围的医生们都不理解他要说什么问题，该症状为（D）
- 135.病人对医生的问题只能在表面上产生反应，缺乏进一步的联想，该症状为（C） A. 补体结合试验阳性 B. 甲胎蛋白阳性 C. 右上腹绞痛及黄疸 D. 穿刺抽出棕褐色脓液 E. 突发寒颤高热，肝区疼痛，肝肿大
- 137.细菌性肝脓肿的特点是（E）
- 138.阿米巴肝脓肿的特点是（D） A. Mills 征阳性 B. Dugas 征阳性 C. Thomas 征阳性 D. Lasague 试验阳性 E. Finkelste 试验阳性
139. 肩关节脱位主要体征为（B）

140. 肱骨外上髁炎主要体征为 (A) A. Hb >120g/L B. Hb ~90g/L C. Hb ~60g/L D. Hb ~30g/L E. Hb <30g/L
141. 小儿中度贫血的诊断指标是 (C)
142. 小儿极重度贫血的诊断指标是 (E) 女性, 65 岁。冠心病心绞痛史 8 年, 无高血压史, 夜间突发心前区疼痛 8 小时入院, 入院时血压为 150 / 90mmHg (20 / 12kPa), 经心电图检查, 诊断急性前壁心肌梗死
143. 最可能的心电图表现为 (B) AII、III、aVF 出现异常 Q 波, 伴 ST 段弓背向上抬高 B. V1~V4 出现异常 Q 波伴 ST 段弓背向上抬高 C. V1~V4 出现冠状 T 波 D. 频发室性早搏 E. III度房室传导阻滞
144. 此时最具特征性的实验室改变是 (D) A. 血清 LDH 水平增高 B. 血清 GOT (AST) 水平增高 C. 血清 GPT (ALT) 水平增高 D. 血清 CPK-MB 水平增高 E. 血清肌红蛋白下降
145. 上述患者出现频发室性早搏, 有时呈短阵室速, 最恰当的处理是 (C) 静滴维拉帕米 B. 口服美西律 C. 静脉使用利多卡因 D. 口服普鲁卡因酰胺 E. 静点硝酸酯类药物
146. 第 2 日患者出现胸闷、大汗、面色苍白, 体检心率 126 次 / 分, 律齐, 血压 80 / 50mmHg , 双肺满布中小水泡音。此时不宜用 (B) A. 主动脉内气囊反搏术 B. 静注速尿 C. 静滴多巴胺 D. 静滴多巴酚丁胺 E. 皮下注射低分子肝素
- 146、此时患者的心功能分级为 (A) A. Killip 分级 IV 级 B. Killip 分级 II 级 C. 纽约心脏病协会 (NYHA) 分级 IV 级 D. 纽约心脏病协会 (NYHA) 分级 II 级 E. 全心衰竭
147. 起病 4 周后, 病人反复低热, 左肺底部有湿性罗音, 心前区闻及心包摩擦音, 此时应考虑并发 (D) A. 肺部感染 B. 急性心包炎 C. 感染性心内膜炎 D. 心肌梗死后综合症 E. 肺栓塞
148. 骨折愈合的第三期是 (C) A. 原始骨痂形成期 B. 血肿机化演进期 C. 骨痂改造塑形期 D. 膜内化骨期 E. 软骨内化骨期
149. 小儿出生时就有的反射, 但不属于先天性反射的是 (E) A、吸吮 B、觅食 C、拥抱 D、握持 E、触觉
150. 正态分布的数值变量资料的描述用哪两个 (C) A 平均数和中位数 B 方差和标准差 C 平均数和标准差
151. 高血压病脑出血破裂的血管多为 (C) A. 大脑中动脉 B. 大脑基底动脉 C. 豆纹动脉 D. 内囊动脉 E. 大脑前动脉
152. 与细菌耐药性有关是 (C) A. mRNA B. 核蛋白体 C. 质粒 D. 异染颗粒 E. 性菌毛
153. 停经 4 6 天. 阴道少量出血, 晚上突感剧烈腹痛, 面色苍白, 血压 9 0 / 6 0 mmHg 问诊断什么 (A) A 输卵管妊娠流产 B 间质部妊娠破裂
154. 小儿营养蛋白质, 脂肪, 碳水化合物各占比例: 碳水化物 5 0%、脂肪 3 5%、蛋白质 15%
155. 不能作为婴儿主食的是: (E) A、全脂奶粉 B、脱脂奶 C、蒸发奶 D、酸奶 E、甜炼奶
156. 小儿肠套叠的表现是: 腹痛 腹部包块 血便
159. 男, 65 岁, 上腹部无规律性隐痛 2 个月, 因饮酒后呕咖啡样物 150ml, 柏油便 300ml 来诊, 无肝病史。查体: 血压 90 / 60mmHg , 脉搏 100 次 / 分, 血红蛋白 90g / L, 上腹部轻度压痛, 肝脾肋下未触及, 其止血措施最好选择 (D) A. 维生素 K1 静滴 B. 奥美拉唑静注 C. 6-氨基己酸静滴 D. 三腔二囊管压迫 E. 垂体后叶素静滴
160. 后腹膜积气选哪个? (E) D 十二指肠球部 E 十二指肠水平部
- 161 有一道病历题, 需外转胎位术是在 (B) A、30--32 周 B、32--34 周
162. “献血大王”, 刚满 5 0 岁, 说要在 5 5 岁前还要献血几次, 问他最多能献几次 (C) A、5 B、8 C、1 0 D、1 2 E、1 5
163. 宫颈癌主要播散的方式 (D) A. 淋巴转移和种植 B. 血行转移和淋巴转移 C. 直接蔓延和种植 D. 直接蔓延和淋巴转移 E. 血行转移
164. X 岁妇女, 阴道前后壁扩张, 宫口松, 子宫后屈, 宫颈中度糜烂的, 选用哪种避孕方法最佳 (B) A. 外用避孕药 B. 避孕套 C. 口服避孕药 D. 放置宫内节育器 E. 安全期避孕法
165. 肠结核好发于 (B) A、空肠 B、回盲部 C、回肠末段 D、结肠 E、直肠和乙状结肠
166. 诊断细菌性阴道病的指标不包括 (E) A. 均质、稀薄的白带 B. 阴道 pH 值 >4. 5 C. 氨臭味

试验阳性 D. 线索细胞 E. 挖空细胞

167、血浆胶体渗透压决定于：(A/C?) A、血浆总蛋白 B、球蛋白 C、白蛋白 D、血红蛋白 E、纤维蛋白
168、心肌细胞绝对不应期等于 (C) A、收缩期 B、舒张期 C、收缩期+舒张早期 D、舒张早期 E、舒张晚期

169、抑制胃酸分泌的是 (E) A、促胰酶素 D、胆盐 E、盐酸

170、能分泌雌激素的卵巢肿瘤为 (B) A、无性细胞瘤 B、颗粒细胞瘤 C、粘液性囊腺瘤 D、浆液性囊腺瘤 E、间质瘤

171、唾液除了分泌淀粉酶，还分泌 (A) A、溶菌酶 B、麦芽糖酶

172、肾脏的近端小管分泌率取决于 (A) A、肾小球分泌率 C、受抗利尿激素的调节 E、受醛固酮的调节

173、用于先天性甲减的筛选的是 (B) A、T₃、T₄ B、TSH E、TG

174、先天性甲减常见病因是 (E) A、TSH 缺乏 B、甲状腺合成过程中酶的缺乏 C、碘缺乏 D、甲状腺或靶器官反应性低下 E、甲状腺不发育或发育不全

175、释放大量的茶酚胺的是 (E) A、库欣综合征 D、原发性醛固酮增多症 E、嗜铬细胞瘤

176、不属于肉芽肿的是 (B) A、伤寒结节 B、肺肉质肿 C、肺结核球 E、皮下结节

177、不属于肾病综合症病理分型的是 (D) A、微小病变 B、膜性肾病 C、局灶性节段性肾小球硬化 D、毛细血管内增生性肾炎 E、系膜增生性肾小球肾炎

178、脊椎结核早期临床表现主要是 (A) A、疼痛 B、寒肿

179、妊娠早期合并重症肝炎 (E) A、继续妊娠 B、先终止妊娠 C、治疗肝炎 D、治疗肝炎的同时终止妊娠 E、治疗肝炎好转后终止妊娠

180、妊娠早期合心力衰竭 (E) A、继续妊娠 B、立即终止妊娠 C、静注西地兰 D、治疗心力衰竭的同时终止妊娠 E、治疗心力衰竭好转后终止妊娠

181、有一道题概括起来差不多是这样：活动劳累后出现低血糖反应(出汗、饥饿、面色苍白、流涎等)，到医院后输糖液即缓解，问可能诊断：(B) A、库欣综合征 B、胰岛细胞瘤 D、原发性醛固酮增多症
182、小儿出生后生长最迅速的是 (B) A、新生儿期 B、婴儿期 C、幼儿期 D、儿童期 E、青年期

183、不属于风湿热的主要表现的是 (B) A、心脏炎 B、关节酸痛 C、舞蹈病 D、环形红斑 E、皮下结节

184、曾经注射过破伤风类毒素的小儿，再次受伤后的处理 (E) A、注射 TAT 500U B、注射 TAT 1000U
C、注射 TAT 1500U D、注射 TAT 2000U E、破伤风类毒素 0.5ml

185、子宫动脉源自：(D) A、腹主动脉 B、髂总动脉 C、髂外动脉 D、髂内动脉

186、关于生物—心理—社会医学模式，下述提法中错误的是 (B) A. 人们关于健康和疾病的基本观点 B、是 21 世纪产生的…… C. 医学临床活动和医学研究的指导思想 E、是关于身心统一论

187、医学伦理道德的描述不正确的是 (C) C、体现对人的更尊重 E、处理医护人员之间的人际关系的原则
188、上消化道出血最常见于：(B) A、食管胃底静脉曲张 B、消化道溃疡出血

189、女方有慢性乙肝，要求避孕 (B) A. 安全期避孕法 B. 避孕套 C. 口服避孕药 D. 放置宫内节育器 E. 皮下埋置避孕药
A. CD3 B. CD19 C. KIR D. MHC — II E. IL—2

190. T细胞的表面分子 (A)

191. 树突状细胞的表面分子 (D)

192. NK 细胞的表面分子 (C)

193. 细胞膜在静息情况下，对下列哪种离子的通透性最大 (B) A. Na⁺ B. K⁺ C. Cl⁻ D. Ca²⁺
E. Mg²⁺

194、能同时启动内源性和外源性凝血途径的是 (E) A、羊水栓塞 B、大范围开放创伤 C、DIC D、大面积烧伤 E、白血病
女性，32 岁，有心脏病 4 年，最近感到心悸，听诊发现心率 100 次/分，律不齐，第一心音强弱不等，心尖部有舒张期隆隆样杂音

- 197.听诊的发现最可能是（D） A.房性早搏 B.室性早搏 C.窦性心率不齐 D.心房颤动 E.窦性心动过速
- 198.为进一步检查心律失常性质应首选（A） A.心电图检查 B.超声心动图 C.X线胸片 D.嘱病人左侧卧位听诊 E.嘱病人屏气后听诊
- 199、27岁经产妇，妊娠39周，双胎妊娠。第一儿枕先露自然分娩，第二儿间隔8分钟臀助产娩出，随后阴道流血量12小时，仍出血量不少，是因为（A） A、子宫收缩乏力 B、子宫余物未排净
- 200、2岁男孩，因智能低下查染色体核型为46，XY，-14，+t（14q21q），查其母为平衡易位染色体携带者，核型应为（C） A、47，XX，-14，-21，+t（14q21q） B、47，XX，-21，-21，+t（21q21q） C、46，XX，-14，-21，+t（14q21q） D、46，XX，-12，-21，+t（21q21q） E、46，XX，-14，+t（14q21q）
- 201、某学生，认为自己患病，经各种检查都没有查出问题，出院后仍认为自己患病，诊断为（C） A 焦虑症 B、抑郁症 C、躯体形式障碍 45岁男性，经理，送来急诊，自述半小时前突然感到气紧，胸闷，心悸，头晕，出汗，认为生命垂危，要求紧急处理。近一月来，这种情况发生过3次，每次持续约0.5~1小时，发病间隙期一切正常，发病与饮食无明显关系。
- 202、最大可能的诊断是（B） A、焦虑状态 B、惊恐发作 C、癔症发作
- 203、最有助于鉴别诊断的项目是（A） A.追问起病诱因 B、胸部X线 C、心电图
- 204、最适宜的急诊处理是（A） A、安定注射 B.输入氧气 C.暗示治疗 D.抗癫痫药
- 205、女，骑自行车与三轮车相撞，之后外阴部感胀痛，外阴部淤肿，根据女性外生殖器解剖知识，伤后最易发生血肿的部位是（A） A 大阴唇 B、小阴唇 C、前庭部 D、前庭大腺
- 206、一道精神病描述某男有恋物癖好，医师用电击疗法是：（C） A、脱敏疗法 B、冲击疗法 C、厌恶疗法
- 207、下面不属于行为疗法的是：（C） A、系统脱敏法 B、冲击疗法 C、联想疗法 D、厌恶疗法
- 208、胎盘附着部位的子宫内膜完全修复需要在产后：（D） A、1周 B、2周 C、4周 D、6周 E、8周
- 209、7月婴儿，按国家计划免疫，还未接种的是（E） A、流行性脊髓灰质炎 B、卡介苗 C、猩红热 E、麻疹
- 210 药物按一级动力学消除特点： 随时间药物浓度递减，难于维持稳定药量
- 211、高血压患病手术前控制在以下：（D） A、130/85mmhg B、140/90 C 150/95 D 160/100 E 170/110
- 212、女性，48岁，发热伴对称性多关节肿痛，晨僵3个月，查ANA 低滴度阳性，RF（+）和IgG补体升高，最可能的诊断是（D） D、类风湿性关节炎 E、系统性红斑狼疮
- 214、心脏病孕妇容易发生心衰的时期：（B） A、30-32周 B、32-34周 C、34-36周 D、36-38周 E、38-40周
- 215、产前检查的传染病指的是：（A） A、指定的传染病 B、特殊的传染病
- 216、某县医院，发现传染病人不具备隔离条件，需转上级医院治疗（D） D 向当地传染病防治机构报告，复印病历资料，立即转移 E、送当地传染病防治机构，由他们处理及转移
- 217、患者胸部叩诊浊鼓音见于（C） C、肺不张（或肺水肿） D、肺气肿 E、气胸
- 218、中年妇女，挤压乳头鲜红色血性溢液应首先考虑（D） C、乳腺囊性增生 D、乳管内乳头状瘤 E、乳腺癌 A、猪 B、鼠 E、蚊
- 219、流行性乙型脑炎的传染源是（A）
- 220、流行性乙型脑炎的传播媒介是（E） A、蜚 B、恙螨 C、鼠 D、鼠蚤 E、人虱
- 221、恙虫病的传播媒介是（B）
- 222、地方性斑疹伤寒的传播媒介是（D）
- 223、流行性斑疹伤寒的传播媒介是（E） A、埃及伊蚊 B、中华按蚊 C、白纹伊蚊 D、微小按蚊 E、xx库蚊
- 224、平原地区，疟疾的主要传播媒介是（B）
- 225、我国广东，登革热的主要传播媒介是（C） 27岁初产妇，妊娠40周，阵发性腹痛10小时，宫

缩 10~15 分钟一次，持续 30 秒，宫口开大 2cm。

226、出现上述临床表现的原因是（A） A、子宫收缩节律性异常 B、子宫收缩异常 C、子宫收缩对称性异常 D、宫收缩作用异常 E、腹肌和膈肌收缩力异常

227、此时的处理原则应是（C） A、人工破膜 B、肌注盐酸哌替啶 100mg C、静注缩宫素 D、肌注麦角新碱 E、行剖宫产术

228、若已进入第二产程，胎先露+3，胎心良好，此时的处理应是（B） A、等待自然分娩 B、继续加强宫缩等待分娩 C、胎头吸引助产 D、产钳助产 E、立即行剖宫

229.某乡医院出售用剩的血液：（E） A、罚款 2 仟元以下 B、罚款 5 仟元以下 C、罚款 1 万元以下 D、罚款 5 万元以下 E、罚款 10 万元以下

230、医院给溶血病人换血，输血由：（C） A、由上级医师实施 B、由经治医师实施 C、经治医师和输血科共同实施 A、强迫行为 B、强迫观念 C、思维插入 D、思维奔逸 E、思维迟缓

231、病人反复出现一些想法，明知不必要或不合理，但无法控制。该症状为（B）

232、病人体验到脑内概念不断涌现，一个意念接着一个意念。该症状为（D）

233、蛋白质变性的描述（D） A、不易被蛋白酶水解 B、溶解性增加 C、分子量降低 D、不能再复性 E、共价键被破坏 234、战时火器伤：不能一期缝合

236、继发性腹膜炎常见于：（E） A、大肠杆菌 B、厌氧菌 C、葡萄球菌 E、混合性 A. DukesC 期 B. DukesA1 期 C. DukesA2 期 D. DukesD 期 E. DukesB 期

238、结肠癌侵犯肌层未穿浆膜层（C）

239、结肠癌穿透肠壁,但无淋巴转移（E）

240.肝癌最常见转移部位（C） A、血行转移 B、淋巴转移 C、肝内 D、种植转移 A、半胱氨酸 B、苏氨酸 C、丝氨酸 D、鸟氨酸 E、蛋氨酸 241、含巯基的氨基酸是（A）

242、不是天然的是：（D）

243、小儿腹泻，血压 120/80，皮肤干燥，眼窝凹陷，Na⁺135mmol/L，是（D） A、中度高渗性脱水 B、重度高渗性脱水 C、轻度等渗性脱水 D、中度等渗性脱水 E、重度等渗性脱水

244、蛋白质-热能营养不良小儿最先出现的症状是（C） A．身高低于正常 B．皮下脂肪消失 C．体重不增 D．体重减轻 E．肌张力低下

245、有内痔史，肛周红伴疼痛，应是（B） A、肛瘘 B、肛周脓肿 C、外痔

246、栓子主要来源： 心源性

247、胃病会引起巨细胞性贫血，是因为胃 X 细胞分泌的： 内因子

248、启动子在 DNA 复制中的作用（B） A、打开 DNA 双链 B、为 X 提供 3—末端 C、为 X 提供 5—末端 249、女，向心理医师 咨询离婚，医师应如何处理：采取中立的原则 A、玻璃样变 B、脂肪沉积 C、细胞水肿 250、酒精肝细胞出现（A）

250、肝细胞气球样变是（C）

251、反作用因子的作用（B） A、复制 B、转录 C、翻译

252、有关 DNA 双链，错误的是：（B） A、为右螺旋 B、空间上方向一致

253、原核生物不包括：（E） A、细菌 B、衣原体 C、支原体 D、立克次体 E、病毒

254、胆固醇合成的限速酶是：（C） A、HMGCoA 合酶 B、HMGCoA 裂解酶 C、HMGCoA 还原酶 D、MV A 激酶 E、鲨烯还原酶

255、引起疱疹性咽峡炎的特异病原体是（D） A、呼吸道合胞病毒 B、腺病毒 C、副流感病毒 D、组病毒 E、族链球菌 某患儿，高热，查肥达反应 O 1：80，H：1：160，诊断为

256、诊断为（A） A、伤寒 B、斑疹伤寒 C、风湿热

257、为确诊，应做（A） A、血培养 B、骨髓培养 A、动作电位 B、局部电位 C、静息电位 D、终板电位

258、引起心肌收缩的是（A）

- 259、终板电位属于 (B)
- 260、肌接头电扩布 (B)
- 261、一病人于3小时前从2米高处跌下，左腰部撞击伤，无昏迷，血压正常，左腰部疼痛伴轻压痛，无包块，尿常规血尿，最可能的诊断是：肾部分裂伤 女性，30岁，3个月来工作较累，近3周出现兴趣缺乏，易疲劳，言语少，动作迟缓，自觉脑子笨，没有以前聪明，早醒，食欲减退，腹胀，便秘，全身酸痛，有时感心慌气紧。总觉自己患了不治之症。
- 262、你认为该病人最可能的诊断是：(B) A、焦虑症 B、抑郁症 C、神经衰弱 D、脑膜炎 E、腹膜炎
- 263、应该怎样处理 (A) A、精神分析 B、抗生素治疗
- 264、某学生，面临考试，失眠多梦，记忆下降，不愿看书了……： 神经衰弱
- 265、伴有低血钾的高血压，其病因应首先考虑 (D) A、库欣综合征 D、原发性醛固酮增多症 E、嗜铬细胞瘤
- 266、引起吸入性肺脓肿的是： (D) A、葡萄球菌 B、溶血性链球菌 C、大肠杆菌 D、厌氧菌
- 267、关于DNA聚合酶叙述错误的是 (D) A、需模板DNA B、需引物RNA C、延伸方向为5'→3' D以NTP为原料 E、具有3'→5'的外切酶活性
- 268、心肌梗死24小时内并发急性左心衰竭时，最不宜应用 (B) A、B受体抑制剂 B、洋地黄
- 269、30岁男性农民，腹痛、腹泻半个月，大便4-8次/天，便量多，为暗红色，有腥臭味，肉眼可见血液及粘液，患者无发热，左下腹隐痛，大便镜检：WBC10~15个/HP，RBC满视野，该患者最可能的诊断是 (D) A、钩端螺旋体病 B、细胞性痢疾 C、血吸虫病 D、溃疡性结肠炎 E、Crohn肠炎
- 270、井下被困7天救出后，体重由60公斤减到50公斤，口渴，躁狂，该患者缺水属于： 重度高渗脱水
- 271、6个月女婴，发热3天，体温39℃，查体：一般情况良好，咽充血，耳后淋巴结肿大，心肺无异常，肝脾未触及。若患儿热退后，伴皮疹出现，可能的诊断是 (A) A小儿急疹（注：热退疹出） B、麻疹 C、风湿热 D、猩红热
- 272、小儿X骨干骺端隆起，骨皮质薄，X线骨膜未见日光反应 (C) A、骨肉瘤 B、软骨瘤 C、骨囊肿
- 273、属于天然的免疫球蛋白是 (B) A、IgA B、IgM C、IgG D、IgD E、IgE
- 274、一位发热患者，体温在39℃以上，未用任何退热降温措施，24小时内体温波动达2℃以上，最低时体温仍高于正常。这种热型是 (E) A、稽留热 B、波浪热 C、间歇热 D、回归热 E、弛张热
- 275、小儿受结核感染至PPD试验阳性的时间是 (D) A、48-72小时 B、1-2周 C、2-4周 D、4-8周 E、8-10周
- 276、医疗机构从事药剂技术工作必须配备 (D) B、依法经过资格认定的药学技术人员 E、依法经过执业认定的药学技术人员
- 277、肾病综合征最基本的表现是：低蛋白血和大量蛋白尿
- 278、男，有结肠炎病史，查X线钡餐示结肠管膨大，结肠袋消失：(B) A、肠套叠 B、中毒性巨结肠
- 男，6岁，身高80cm，智能落后，仅能数1~20个数。体检：皮肤粗糙，眼距宽，鼻梁宽平，舌宽厚，常伸于口外，毛发枯干，发际低，骨龄摄片仅有4枚骨化核。
- 279、为确诊应作的检查是 (D) B、有机酸分析 C、染色体基因分析 D.血清T3、T4，TSH测定
- 280、患儿确诊后治疗应选用 (A) A、小片甲状腺素 E、低苯丙氨酸饮食
- 281、在一种分析性研究中，能说明暴露因素与发病的关联程度的指标为(E) D特异危险度 E、相对危险
- 282、在疾病流行调查中，考查暴露于因素发病可能性的指标为： 发病率
- 283、细支气管不完全阻塞所致的阻塞性呼气障碍可造成：肺气肿 患儿3岁，近1年多，哭甚时出现青紫，查体：心前区隆起，胸骨左缘第3—4肋间可闻及IV级收缩期杂音，可触及震颤，X线检查示：左右心室及左房增大，肺血管影增多，肺动脉段凸出。
- 284 此患儿最可能的诊断是 (B) A、房间隔缺损 B、室间隔缺损 C、动脉导管未闭 D、法洛四联征
- 285、此患儿如决定手术须做的检查是： E.超声心动图

286、此患儿如出现了永久性青紫，说明：B. 形成艾森曼格综合征 A、金色葡萄球菌 B、大肠杆菌 C、B-溶血链球菌 D、表皮葡萄球菌 E、梭状芽胞杆菌

287、痛的致病菌是（ A ）

288 、 丹毒的致病菌是（ C ） 2岁男性农民，11 月份因发热、头痛、呕吐三天为主诉入院。体检：面颈部潮红，双腋下少许出血点，化验：尿常规蛋白 （++）红细胞 3—10 个 / HP ， 末梢血象：WBC $23.0 \times 10^9/L$ ，异型淋巴 10%，PLT $48 \times 10^9/L$ 。

289、该患者的诊断可能为 （ D ） A、钩端螺旋体病 B、流行性乙型脑炎 C、流行性脑脊髓膜炎 D、流行性出血热

290、住院二天后，热退但症状加重，出血点增加，四肢厥冷，脉搏细弱，BP：80 / 60mmHg ， 此时对该患者的治疗原则首先是 （ A ） A、积极补充血容量 B．以应用血管活性药物为主 C．以应用激素为主 D．以纠正酸中毒为主 E．以输入胶体液为主

291、比较不同职业人群的冠心病患病率的假设检验，应计算的统计量为 （ B ） A. t B. χ^2 C. F D. x E. p

292、有五个不同职业人群的冠心病患病率资料，若比较职业不同患病率是否相同。69.统计学检验的无效假设应是（ C ） A. $H_0 : p_1=p_2=p_3=p_4=p_5$ B. $H_0 : p_1=p_2=p_3=p_4>p_5$ C. $H_0 : \pi_1=\pi_2=\pi_3=\pi_4=\pi_5$ D. $H_0 : \pi_1 \neq \pi_2 \neq \pi_3 \neq \pi_4 \neq \pi_5$ E. $H_0 : \pi_1 \neq \pi_3 = \pi_4 = \pi_5$

293、图示对比不同职业人群的冠心病患病率的高低，应绘制 （ B ） A、直方图 B、直条图 C、百分图 D、圆图 E、散点图 22 岁女性，停经 49 天，诊断为早期妊娠。在行人工流产负压吸宫术时，突然出现面色苍白、出汗、头晕、胸闷，体检发现：36.6℃，血压 80 / 50mmHg ， 心率 56 次 / 分。

294、最可能的诊断是 （ B ） A、子宫穿孔 B、人工流产综合反应 C、吸宫不全

295、最合适的处理是 （ C ） A、肌注氯丙嗪 25mg B、肌注异丙嗪 25mg C、静脉注射阿托品 0.5mg D、肌注哌替啶 50mg E、立即剖腹探查 A． PaO₂ 为 50mmHg ， PaCO₂ 为 40mmHg B． PaO₂ 为 55mmHg ， PaCO₂ 为 50mmHg C． PaO₂ 为 65mmHg ， PaCO₂ 为 40mmHg D． PaO₂ 为 70mmHg ， PaCO₂ 为 40mmHg E． PaO₂ 为 70mmHg ， PaCO₂ 为 45mmHg 297 、符合 I 型呼吸衰竭的动脉血气标准是（ A ）

298、符合 II 型呼吸衰竭的动脉血气标准是 （ B ）

299、糖尿病引起尿多原因?（ B ） A、血浆胶体渗透压生高 B、血浆晶体渗透压生高 C、大量饮水 D、醛固酮减少 E、抗利尿激素分泌减少

300、血流不稳定性心动过速首选治疗? A、直流电复律

301、女性，60 岁，直肠癌手术后病理报告：中分化腺癌，5.8cm×4.2cm×3cm 大小，侵及阴道后壁，无淋巴结转移，该病人 Dukes 分期应为 （ C ） A、A1 期 B、A2 期 C、B 期 D、C 期 E、D 期

302、湿罗音描述错误的是：（ E ） A、是吸气时，气体通过肺泡分泌物形成的水泡破裂声。 E、随体位而改变

303、动作电位的特点错误的是：随传播的时间而改变

304、确诊慢性活动性胃炎的是： HP 感染

305、麻风病可用：（ A ） A、利副平 B、环磷酰胺 306、属于 A 受体阻断剂的是 （ A ） A、芬妥拉明 B、硝苯地平

307、抑制胃酸最强的： XX 拉唑 308、H₂ 受体阻滞剂：雷尼替丁

309、不直接引起发热而由内热源引起的是：（ C ） A、白细胞 C、病原微生物

310、肺活性物质减少： （ A ） A、导致肺泡不能 C、肺表面张力降低

311、病人输洗涤红细胞、提取白细胞以后，出现 XX 。查红细胞、白细胞正常，血小板减少，此时应该输：压干浓缩血小板

312、患者外伤后，头皮有 10X10cm 肿胀，出现脑部症状，急救时处理不包括： 抽吸头皮血肿下积血，并加压包扎。

313、男，18 岁，因急性阑尾炎穿孔行阑尾切除术，术后 3 天切口见红肿硬结，缝线拆除后未见脓性分泌

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/128077052115006137>