

2024 年内科护理学复习(二十)

单选题(共 80 个, 分值共:)

1、 下列哪项内容有助于区别肾盂肾炎和膀胱炎(0分)

A:尿中有红细胞 尿中有白细胞管型 尿频、尿急 尿中有白细胞 以上都不是

正确答案: B

解析: 肾盂肾炎: 有发热、腰痛、肾区叩击痛或尿中有白细胞管型; 膀胱炎: 仅有尿频、尿急、尿痛等尿路刺激征。

2、 肝细胞性黄疸可引起(0分)

A:多源性休克 陶土样大便 寒战、高热 出血倾向 急性肾衰竭

正确答案: D

解析: 肝细胞性黄疸是由于肝细胞病变, 对胆红素摄取, 结合排泄功能发生障碍。

3、 脑血栓形成的患者早期溶栓的实施时间应在发病后(0分)

A:2 小时内 B:48 小时内 C:6 小时内 D:12 小时内 E:24 小时内

正确答案: C

解析: 早期溶栓是指发病后及早采用溶栓治疗使血管再通, 以减轻脑水肿、缩小梗死灶、恢复梗死区血流灌注、减轻神经元损伤, 挽救缺血半暗带。若血液供应在一定时间内恢复, 脑功能可恢复正常, 即再灌注时间窗, 不同的患者再灌注时间窗存在差异, 一般认为不超过 6 小时。

4、 患者女性, 24 岁。误服有机磷农药 1605 (对硫磷) 一口, 急送医院就诊, 当时测定胆碱酯酶活力为 54%。

患者急诊洗胃, 洗胃液忌用(0分)

A:生理盐水 B:肥皂水 C:碳酸氢钠 D:冰水 E:高锰酸钾

正确答案：E

解析：抢救对硫磷等硫代类有机磷中毒者，洗胃液忌用高锰酸钾溶液。

5、下列哪项不是类风湿关节炎表现的特征(0分)

A:以小关节为主 晨僵明显 呈对称性 急性期关节无畸形 急性期关节明显肿胀

正确答案：D

解析：类风湿关节炎病变后期形成特异性的尺侧偏向畸形，形成关节活动障碍，影响病人生活自理。

6、肝硬化病人可见(0分)

A:白细胞总数升高，中性粒细胞增多 尿胆红素强阳性 血钾降低 网织红细胞增多

E:血白蛋白显著下降

正确答案：E

解析：血白蛋白显著降低，表示肝细胞有严重损伤，见于严重肝炎及晚期肝硬化。肝外疾患：营养不良及消耗性疾病、肾炎、肾病综合征。

7、青年，消瘦，低热，痰中断续带血，最常见于(0分)

A:肺脓肿 支气管扩张 支气管肺癌 肺炎 肺结核

正确答案：E

解析：肺炎、肺脓肿常伴有高热，而两题中的患者均无高热；支气管扩张典型表现为慢性咳嗽伴有大量脓痰，与两题的题干信息不符；肺结核常有低热、消瘦等慢性毒血症状，患者可有消瘦、痰中断续带血；支气管肺癌老年人多见，且常表现为持续痰中带血，经久不愈。

8、关于2型糖尿病，下列叙述正确的是(0分)

A:胰岛素绝对缺乏 有家族性发病倾向 主要与免疫、环境因素有关 主要见于年轻人

E:依赖胰岛素治疗

正确答案：B

解析：2型糖尿病主要与遗传有关，多见于40岁以上成年人，有家族性发病倾向，机制主要是对胰岛素抵抗而非胰岛素绝对缺乏，故非胰岛素依赖性。

9、洋地黄制剂治疗心衰最主要的机制是(0分)

A:抑制迷走神经系统 扩张冠状动脉 兴奋交感神经 兴奋心脏传导系统

E:增强心肌收缩力

正确答案：E

解析：洋地黄制剂治疗心衰时，可使心肌收缩力增强，抑制心脏传导系统，对迷走神经系统有直接兴奋作用，从而改善心力衰竭患者的血流动力学变化。故选增强心肌收缩力。

10、关于原发性高血压病因的叙述，最准确的是(0分)

A:长期精神紧张 进食食盐过多 在遗传背景下多种后天性因素作用所致

D:周围血管阻力增加 动脉粥样硬化

正确答案：C

解析：原发性高血压是一种病因未明的临床综合征，现认为其血压升高是在遗传背景下多种后天性因素作用所致。

11、孙先生，癫痫病史5年，曾有强直阵挛发作。他最适宜的职业是(0分)

A:游泳运动员 电工 邮递员 办公室职员 汽车驾驶员

正确答案：D

解析：可参加适量体力和脑力活动，如打太极拳和书法练习，禁止游泳、驾驶汽车、高空作业、登高等。

12、慢性肺心病长期氧疗，每日持续吸氧时间应超过(0分)

A:9h B:7h C:10h D:15h E:12h

正确答案: D

解析: 慢性肺心病患者需长期坚持低流量吸氧 1~2L/min, 每天 15h 以上, 才能使患者静息状态下的氧分压达到正常, 提高生活质量。

13、巴宾斯基征阳性见于(0分)

A:周围神经损伤 锥体束损害 蛛网膜下腔出血 甲状腺功能亢进 脑膜炎

正确答案: B

解析: 锥体束受损时, 病人可出现病理反射, 即可出现巴宾斯基征、奥本海姆征、戈登征、查多克征。

14、患者男性, 52 岁。因肝硬化上消化道出血入院, 经药物止血效果不佳, 给予三腔二囊管暂时压迫止血。拔管前让患者口服液状石蜡 20-30ml 的意义是(0分)

A:润滑食管和胃壁黏膜, 防止再出血 使黏膜与管外壁润滑, 防止粘连 减轻黏膜水肿

D:清洁食管和胃壁 缓解食管和胃底的压力

正确答案: B

解析: 让患者口服液状石蜡目的是使黏膜与管外壁润滑, 防止粘连, 易于拔管。

15、支气管哮喘病人居室环境可(0分)

A:放置鲜花 使用羽毛枕头 饲养猫、狗等宠物 铺垫全毛地毯 悬挂布艺窗帘

正确答案: E

解析: 支气管哮喘以吸入性过敏原为主, 如花粉、尘螨、动物的毛等。

16、患者男性，35岁。近2年常有上腹部疼痛，尤以晚间加重，进食可缓解。近期腹痛加重，反复呕吐隔夜宿食，呕吐后腹痛减轻，应防止患者发生(0分)

A:呼吸性酸中毒 代谢性酸中毒 呼吸性碱中毒 混合性酸中毒 代谢性碱中毒

正确答案：E

解析：根据患者症状晚间上腹部疼痛、进食缓解怀疑溃疡，近期腹痛加重，反复呕吐隔夜宿食，呕吐后腹痛减轻，是幽门梗阻的表现；患者严重频繁呕吐可导致失水和低氯低钾性碱中毒，故选代谢性碱中毒。

17、脑出血急性期处理的重要环节是(0分)

A:应用降压药物降血压 控制脑水肿，降低颅内压 止血治疗 积极准备手术

E:早期康复治疗

正确答案：B

解析：当大量出血的脑出血患者颅内压过高，内科脱水治疗效果不佳，可能危及生命时，考虑进行手术治疗，排除选项积极准备手术；急性期脑出血患者血压一般比平时高，是颅内压增高的代偿性反应。当颅内压下降时血压也随之下降，因此，脑出血急性期一般不应用降压药物降血压，故排除选项应用降压药物降血压；止血药物一般用于并发消化道出血时，排除选项止血治疗；康复治疗应在脑出血病情稳定后进行，排除选项早期康复治疗；脑出血者大多数在早期即有颅内压增高，如果脑水肿加重、颅内压进一步增高易引起脑疝，危及生命。因此，控制脑水肿，降低颅内压是脑出血

18、患者男性，74岁，反复咳嗽、咳痰伴喘息30年，5年前出现逐渐加重的呼吸困难，诊断为COPD。为防止呼吸衰竭，应指导患者(0分)

A:避免肺部感染 卧床休息 低脂饮食 戒烟 少盐饮食

正确答案：A

解析：COPD患者一旦发生感染，则呼吸道梗阻加重，易诱发呼吸衰竭发生。

19、呼吸性酸中毒合并代谢性酸中毒时，常伴有(0分)

A:高钾血症 低钾血症 高氯血症 低钠血症 低氯血症

正确答案: A

解析:呼吸性酸中毒时PH下降,血中H⁺增加,主要造成两个效应:①使H⁺向细胞内转移,H⁺转移时伴Na⁺,K⁺的转运,即细胞外2个Na⁺、1个H⁺与细胞内3个K⁺相交换,因此在血液中H⁺减少的同时K⁺增加;②肾脏排H⁺增强,这个主要通过肾小管Na⁺-H⁺

20、肢体感觉障碍的病人不宜(0分)

A:用酒精按摩 经常翻身 使用热水袋 睡于软床上 用温水擦浴

正确答案: C

解析:由于患者对损伤无保护性反应,容易受到损害,应注意保暖,特别要防止烫伤。对有感觉障碍患肢不使用暖水袋保暖,患者洗澡时应注意水温。对偏瘫有感觉障碍的患者避免局部长期受压,防止褥疮的发生。

21、患者女性,30岁。诊断为甲状腺功能亢进,清晨测得脉率96次/分,血压17.3/9.3kPa(130/70mmHg),计算基础代谢率是属于(0分)

A:正常范围偏高 重度甲状腺功能亢进 中度甲状腺功能亢进 轻度甲状腺功能亢进 正常

正确答案: C

解析:基础代谢率%=(脉率+脉压)-111,正常值:±10%,+10%~+30%为轻度甲状腺功能亢进;+30%~+60%为中度甲状腺功能亢进;+60%以上为重度甲状腺功能亢进。该患者基础代谢率%=(96+60)-111=45%,所以为中度甲状腺功能亢进。

22、类风湿关节炎恢复期间,指导病人活动的目的是(0分)

A:疾病复发 减少晨僵发生 保持关节功能位 关节畸形 避免关节废用

正确答案：E

解析：恢复期进行适当的关节功能锻炼，或做理疗，避免关节畸形废用。

23、患者女性，30岁。尿急、尿频，发热，伴腰痛1周。尿沉渣白细胞10-20个/高倍视野，可见白细胞管型。

最可能的诊断是(0分)

A:急性肾小球肾炎 慢性肾盂肾炎急性发作 急性膀胱炎 急性肾盂肾炎 尿道感染

正确答案：D

解析：急性膀胱炎、尿道炎一般无发热等全身症状，首先排除急性膀胱炎、尿道感染；本患者无反复尿感病史，不考虑慢性肾小球肾炎急性发作，排除慢性肾盂肾炎急性发作；急性肾小球肾炎以血尿为主，蛋白尿、水肿、高血压，除非合并尿路感染，否则无尿急、尿频、尿痛症状，排除急性肾小球肾炎。急性肾盂肾炎为急性起病，可有或无尿频、尿急、尿痛，常有腰痛、脊肋角压痛、“肾区叩击痛和全身感染症状，如寒战、发热、头痛、恶心、呕吐、血白细胞增高等，尿沉渣白细胞超过5个/高倍视野。

24、肺气肿发生气流受阻的病因是(0分)

A:大气道狭窄 通气不足 通气/血流比例失调 小气道病变 弥散功能障碍

正确答案：D

解析：大气道狭窄多由肿瘤、异物引起；肺气肿发生气流受阻的病因是小气道病变；呼吸衰竭发生的机制为通气/血流比例失调、弥散功能障碍和通气不足。

25、上消化道出血最常见的原因是(0分)

A:胃癌 急性胃黏膜损害 消化性溃疡 食管胃底静脉曲张 慢性胃炎

正确答案：C

解析：在上消化道出血的各类原因中，由消化性溃疡引起的约占50%，在各类原因中所占比例最高。食管胃底静脉曲张、急性胃黏膜损害、胃癌、慢性胃炎也会引起上消化道出血，但比例较消化性溃疡低。

26、提示壁层腹膜有炎症的症状、体征是(0分)

A:移动性浊音 腹部压痛及反跳痛 肠鸣音亢进 腹肌紧张 肝脏肿大

正确答案: B

解析: 反跳痛是壁层腹膜已有炎症累及的征象。压痛及反跳痛、腹肌紧张时腹膜炎病变的三大体征称腹膜刺激征。

27、患者男性, 23岁。患者畏寒、发热、全身乏力、恶心、食欲减退, 右上腹隐痛6天, 近3天来发现尿色如浓茶。体检: T38.5℃, 一般情况好, 皮肤、巩膜黄染, 心、肺(-), 肝肋下2cm, 脾肋下未及。实验室检查: Hb91.30g/L, WBC5.4×10⁹/L, N0.48, L0.52 血清总胆红素124.8μmol/L, ALT280U/L, 抗-HAVIgM (+)。该患者最可能的诊断是(0分)

A:急性胃肠炎 ~~B:慢性重型肝炎(甲型)~~ ~~C:急性黄疸型肝炎(甲型)~~ ~~D:亚急性重型肝炎(甲型)~~

E:急性重型肝炎(甲型)

正确答案: C

解析: 患者尿色如浓茶, 皮肤、巩膜黄染, 提示患者存在黄疸; 抗-HAVIgM(+) 提示甲型肝炎, 故排除选项急性胃肠炎; 在急性重型肝炎(甲型)、慢性重型肝炎(甲型)、急性黄疸型肝炎(甲型)、亚急性重型肝炎(甲型)选项中, 慢性重型肝炎(甲型)为慢性病程, 与患者6天的病程不符, 故排除; 重型肝炎的临床表现为黄疸迅速加深、肝脏进行性缩小、肝臭、出血倾向、迅速出现的腹水、中毒性鼓肠等, 与题干所示症状和实验室检查不符, 排除急性重型肝炎(甲型), 亚急性重型肝炎(甲型)选项, 故选急性黄疸型肝炎(甲型)。

28、水痘的主要传播途径是(0分)

A:性接触传播 ~~B:虫媒传播~~ ~~C:动物源性接触~~ ~~D:粪-口传播~~ 直接接触与呼吸道传播

正确答案: E

解析: 水痘的主要传播途径是直接接触与呼吸道传播。

29、 溃疡性结肠炎患者腹泻每天在 4 次以下，便血轻，无全身表现者属于(0分)

A:粘连型 辘型 重型 干酪型 渗出型

正确答案：B

解析：肠结核并发结核性腹膜炎的病理改变包括干酪型、粘连型、渗出型，其中最常见的是粘连型。溃疡性结肠炎根据病变程度可分为①轻型：每天腹泻在 4 次以下，便血轻，无全身表现；②重型：腹泻频繁，每天 6 次以上，并有明显的粘液脓血便，全身中毒症状明显；③中型：介于轻型和重型之间。

30、 某急性心肌梗死病人心室颤动的先兆是(0分)

A:频发的、成对出现的、多源性或呈 R-on-T 现象 心源性休克 房颤 室上性心动过速

E:脑栓塞

正确答案：A

解析：当患者发生频发的、成对出现的、多源性或呈 R-on-T 现象的室早时，会诱发室速、室颤。

31、 原发性肝癌病人最突出的体征是(0分)

A:肝脏进行性肿大 腹水呈血性 腹膜刺激征 腹壁静脉曲张 黄疸与发热

正确答案：A

解析：最突出的体征是肝脏呈进行性肿大，质地坚硬，有不同程度的压痛。

32、 某患者心电图，P 波与 QRS 波均按各自规律出现，P 波与 QRS 波不相关，P-P 频率>R-R 频率。其诊断考虑为(0分)

A:第三度房室传导阻滞 阵发性室上性心动过速 第二度莫氏 I 型房室传导阻滞 房室连接处心律

E:第二度莫氏 II 型房室传导阻滞

正确答案：A

解析：第三度房室传导阻滞的心电图特征为：①P-P 间隔相等，R-R 间隔相等，P 波与 QRS 波群无关；OP 波频率大于 QRS 波频率；QRS 波群形态可正常或增宽畸形。

33、女，40 岁，石油化工工人，长期与苯接触，一年来全身乏力，Hb:6g/dl，血小板：50000/dl，网织红细胞低于正常，肝脾不肿大，骨髓增生低下。进行护理评估时下列哪项对其病因诊断最重要(0分)

A:主要症状及治疗经过 既往史、职业史 系统体格检查 心理社会资料 血象、骨髓象结果

正确答案：B

解析：再障的主要病因有药物及化学物质，最常见的是氯霉素；苯是重要的骨髓抑制毒物，长期与苯接触危害性较大；物理因素 X 线、射线等；生物因素。

34、肺气肿患者胸廓呈(0分)

A:漏斗胸 扁平胸 C:侧胸廓膨隆 鸡胸 桶状胸

正确答案：E

解析：鸡胸、漏斗胸见于佝偻病患者，排除鸡胸,漏斗胸；扁平胸见于瘦长体型或慢性消耗性疾病，如肺结核等，排除扁平胸 胸廓一侧变形多见于大量胸腔积液、气胸或一侧严重代偿性肺气肿，排除一侧胸廓膨隆；肺气肿患者终末细支气管远端的气腔弹性减退，过度膨胀、充气和肺容积增大，导致胸部过度膨隆，前后径增大，呈桶状胸，故选桶状胸。

35、某慢性肺源性心脏病病人，喘憋明显，略有烦躁。在治疗过程中，应慎用镇静剂，以避免(0分)

A:加重心力衰竭 诱发肺性脑病 脱水，低血钾 双重感染 洋地黄中毒

正确答案：B

解析：应禁用麻醉剂及影响呼吸功能的镇静剂如吗啡等，以免诱发或加重肺性脑病。

36、男，40 岁，无明显诱因出现水肿，血压 21/12kPa (158/90mmHg)，尿蛋白 (++++)，24h 尿蛋白定量 >3.5g，人血白蛋白 <30g/L，以原发性肾病综合征收住院。该病人用糖皮质激素治疗后病情缓解出院，其健康

指导的主要内容不包括(0分)

A:定期随诊, 复查, 避免复发 避免劳累 不可擅自减撤药 经常服用抗生素预防感染

E:增强抵抗力, 避免感染

正确答案: D

解析: 长期预防使用抗生素可能会引起真菌感染。

37、患者男性, 35岁。间歇性上腹痛4年, 疼痛为空腹痛和饥饿痛, 常伴有反酸、暖气。近1周腹痛加重来院就诊, 经诊断为十二指肠溃疡。该疾病反复发作最可能的原因是(0分)

A:吸烟 饮食原因 遗传因素 精神因素 幽门螺杆菌感染

正确答案: E

解析: 大量研究表明, 幽门螺杆菌是消化性溃疡反复发作最主要的原因。对消化性溃疡患者应用根除幽门螺杆菌治疗后, 溃疡复发率明显下降。

38、脑膜刺激征阳性见于(0分)

A:末梢神经炎 神经根炎 蛛网膜下腔出血 癫痫 脑梗死

正确答案: C

解析: 脑膜刺激征是脑膜受到刺激的表现, 见于各种炎症(脑膜炎)、出血(蛛网膜下腔出血)、脑脊液压力增高等。

39、原发性高血压与下列因素无关的是(0分)

A:精神紧张 遗传 肥胖 病毒感染 摄盐过多

正确答案: D

解析: 原发性高血压与遗传、饮食(如摄盐、摄钾、摄钙、摄饱和脂肪酸等)、精神应激、体重、是否服避孕药

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/128102012062006141>