

静脉注射题库及答案

试题 1

一、填空题。

1.穿刺及维护时应选择合格的皮肤消毒剂,宜选用()、()、()、()。

答案:(2%葡萄糖酸氯己定乙醇溶液)、(有效碘浓度不低于0.5%的碘伏)、(2%碘酊溶液)、(75%酒精)

2.给药过程中严格执行查对制度的五个准确是指:()、()、()、()、()。

答案:(准确的药物)、(准确的剂量)、(准确的途径)、(准确的时间)、(准确的病人)

3.输入溶液的种类和量应根据病人体内水、电解质及酸碱平衡紊乱的程度来确定,通常遵循()、()、()。

答案:(先晶后胶)、(先盐后糖)、(宁酸勿碱)

4.PICC 穿刺完成后记录的内容包括()、()、()、()、()。

答案:(穿刺静脉)、(穿刺日期)、(导管刻度)、(导管尖端位置)、(置管前双侧上臂臂围)

5.输液过程中常见的故障有()、()、()、()。

答案：(溶液不滴)、(茂菲滴管液面过高)、(茂菲滴管液面过低)、(茂菲滴管液面自行下降)

6.血液制品中常见的成分血包括()、()、()、()。

答案：(血浆)、(红细胞)、(白细胞浓缩悬液)、(浓缩血小板)

7.与大量输血有关的反应有()、()、()。

答案：(循环负荷过重)、(出血倾向)、(枸橼酸钠中毒反应)

8.输液附加装置包括()、()、()、()、()。

答案：(三通)、(延长管)、(肝素帽)、(无针接头)、(过滤器)

9.中心静脉导管()是经可通过()、()、()置管,尖端位于()或()的导管。

答案：(CVC);(锁骨下静脉)、(颈内静脉)、(股静脉);(上腔静脉)或(下腔静脉)

10.经外周静脉置入中心静脉导管是经()、()、()、()、()穿刺置管,尖端位于()或()的导管。

答案：（贵要静脉）、（肘正中静脉）、（头静脉）、（肱静脉）、（颈外静脉）；
（上腔静脉）或（下腔静脉）

11.静脉治疗常用的工具包括（ ）、（ ）、（ ）、（ ）、（ ）、（ ）、（ ）、
（ ）。

答案：（注射器）、（输液（血）器）、（一次性静脉输液钢针）、（外周静脉留置
针）、（中心静脉导管）、（经外周静脉置入中心静脉导管）、（输液港）、（输液附加
装置）

12.给药的原则包括（ ）、（ ）、（ ）、（ ）。

答案：（根据医嘱准确给药）、（严格执行核对制度）、（安全正确用药）、（密切
观察用药反应）

13.静脉输液常用的溶液包括（ ）、（ ）、（ ）。

答案：（晶体溶液）、（胶体溶液）、（静脉高营养液）

14.静脉留置针应在贴膜上注明（ ）、（ ）、（ ）。

答案：（穿刺日期）、（时间）、（穿刺者姓名）

15.在满足治疗的前提下，静脉留置针穿刺易选择（ ）、（ ）、（ ）的导管。

答案：（管径最细）、（长度最短）、（官腔最少）

16.PICC 置管后造成静脉炎常见的原因包括 ()、()、()

答案：(机械性静脉炎)、(化学性静脉炎)、(细菌性静脉炎)

17.PICC 置管后造成导管堵塞的常见原因包括 ()、()、()。

答案：(机械性导管堵塞)、(血栓性导管堵塞)、(非血栓性导管堵塞)

18.上肢常见的周围浅静脉包括 ()、()、()、()。()是成年人输液时的首选部位。

答案：(肘正中静脉)、(头静脉)、(贵要静脉)、(手背静脉网)。(手背静脉网)

二、单选题

1.《静脉治疗护理技术操作规范》是哪年发布的？(A)。

A.2013 年

B.2014 年

C.2015 年

D.2016 年

2. 《静脉治疗护理技术操作规范》是哪年实施的？（ B ）。

A.2013 年

B.2014 年

C.2015 年

D.2016 年

3. 《临床输血技术规范》是哪年印发的？（ B ）。

A.2005 年

B.2006 年

C.2007 年

D.2008 年

4. 《医疗机构临床用血管理办法》是哪年印发的？（ B ）

A.2011 年

B.2012 年

C.2013 年

D.2014 年

5.卫生部发布的《内科输血》3项卫生行业标准是哪年发布的？（D）

A.2015 年

B.2016 年

C.2017 年

D.2018 年

6.《血源性病原体职业接触防护导则》是哪年实施的？（C）。

A.2007 年

B.2008 年

C.2009 年

D.2010 年

7.大量失血是指 24h 丢失正常成人体重一个自身容量的（B）。

A.6%

B.7%

C.8%

D.9%

8.大量失血是指 24h 丢失正常儿童体重一个自身容量的 (B)

A.6%~7%

B.8%~9%

C.10%~11%

D.12%~13%

9.大量失血是指 3h 内丢失正常体重自身血容量的 (B)。

A.45%

B.50%

C.55%

D.60%

10.成人出血速度达到 (D) 称之为大量失血。

A.120mL/min

B.130mL/min

C.140mL/min

D.150mL/min

11.大量失血是指因失血导致收缩压低于 () 或成人心率超过 (C)。

A.100mmHg , 90 次/min

B.80mmHg , 90 次/min

C.90mmHg , 110 次/min

D.70mmHg , 130 次/min

12.大量失血是指出血速度达到 1.5mL/ (kg·min) 超过 (C)。

A.10min

B.15min

C.20min

D.25min

13.手背和前臂静脉血液流速 (A)

A.1-95ml/min.

B.96-105ml/min.

C.106-110ml/min.

D.111-120ml/min.

14.肘部和上臂静脉血液流速 (A)

A.100-300ml/min.

B.50-99ml/min.

C. 300-350ml/min.

D.350-480ml/min.

15.锁骨下静脉血液流速 (C)

A.0-0.5L/min

B.0.5-1L/min

C.1-1.5L/min.

D.1.5-2L/min

16.上腔静脉血液流速 (C)

A.1-1.5L/min.

B.1.5-2L/min.

C.2-2.5L/min.

D.2.5-3L/min.

17.美国静脉输液护士协会的缩写为 (A)

A.INS

B.NNS

C.ANS

D.PNS

18.正常血液的渗透压是 (B)

A.210-310mosm/L

B.240-340mosm/L

C.250-350mosm/L

D.220-360mosm/L

三、判断题

1、经外周静脉注射发泡性药物禁止使用输液泵。()

答案：√

2、新生儿和小儿应使用头皮静脉输注腐蚀性药物。()

答案：×

3、禁止使用已经建立超过 24h 的静脉穿刺部位。()

答案：√

4、患者接受有害药物后至少 24h 内安全地处理患者体液。（ ）

答案：×

5、外周静脉推注或输注发泡性药物应限制在 30~60min 内。（ ）

答案：√

6、配制抗肿瘤药物的生物安全柜分为 I II III 三个等级。（ ）

答案：√

试题 2

一、单选题

1.中心静脉导管的缩写是（ A ）

A.CVC

B.PICC

C.PN

D.TPN

E.PORT F.PVC

2.皮内注射的进针角度为 (A)

A.5°

B.15-30°

C.30-40°

D.90°

E.30-45°

3.穿刺部位疼痛，伴有发红，触及条索状静脉，长度大于 2.5cm 并有脓液流出，按静脉炎量表应为 (E) 级.

A.5 级

B.1 级

C.2 级

D.3 级

E.4 级

4.按照 INS 标准，渗出分为（A）级。

A.5 级

B.1 级

C.2 级

D.3 级

E.4 级

5.经外周置入中心静脉导管缩写是（B）

A.CVC

B.PICC

C.PN

D.TPN

E.PORT

F.PVC

6.外周静脉导管至少 (D) 检查 1 次。

A.1h

B.2h

C.3h

D.4h

7.PICC 置管后 (B) 小时后常规更换敷料。

A.12h

B.24h

C.36h

D.48h

8.PICC 置管中建立最大化无菌屏障治疗巾应为 (C)

A.85×85cm

B.100×100cm

C.70×70cm

D.100×155cm

E.100×70cm

9.静脉注射的进针角度为 (B)

A.5°

B.15-30°

C.30-40°

D.90°

E.30-45°

10.穿刺部位疼痛，伴有发红，触及条索状静脉，按静脉炎量表应为 (D) 级.

A.5 级

B.1 级

C.2 级

D.3 级

E.4 级

11.INS 指出没有症状的渗出为 (A) 级.

A.0 级

B.1 级

C.2 级

D.3 级

E.4 级

12.危重症、麻醉后患者、认知障碍患者外周静脉导管应每 (B) 检查一次。

A.0.5-1h

B.1-2h

C.2.5-3h

D.3h

13.PICC 置管后无菌透明敷料应至少每 (C) 更换 1 次。

A.3 天

B.5 天

C.7 天

D.14 天

11.PORT 穿刺时消毒面积应为 (B)

A.8×10cm

B.10×12cm

C.12×12cm

D.8×12cm

E.10×10cm

12.肠外营养缩写是 (C)

A.CVC

B.PICC

C.PN

D.TPN

E.PORT

F.PVC

13.皮下注射的进针角度为（ C ）

A.5°

B.15-30°

C.30-40°

D.90°

E.30-45°

14.穿刺部位疼痛，伴有发红和/或水肿，按静脉炎量表应为（ C ）级.

A.5 级

B.1 级

C.2 级

D.3 级

E.4 级

15.皮肤发白，水肿范围最大直径 < 2.5cm，皮肤发凉，伴有或不伴有疼痛，按照 INS 标准，此渗出为（ B ）级.

A.0 级

B.1 级

C.2 级

D.3 级

E.4 级

16.新生儿、儿童患者外周静脉导管应每（ A ）检查一次。

A.1h

B.2h

C.3h

D.4h

17.PICC 置管后无菌纱布敷料应至少每 (B) 更换 1 次。

A.1 天

B.2 天

C.3 天

D.7 天

18.PICC 更换敷料时消毒面积应为 (B)

A.8×10cm

B.10×12cm

C.12×12cm

D.8×12cm

E.10×10cm

19.输液港缩写是 (E)

A.CVC

B.PICC

C.PN

D.TPN

E.PORT

F.PVC

20.肌肉注射的进针角度为 (D)

A.5°

B.15-30°

C.30-40°

D.90°

E.30-45°

21.穿刺部位发红，伴有或不伴有疼痛（B）级.

A.5 级

B.1 级

C.2 级

D.3 级

E.4 级

22.皮肤发白，水肿范围最大直径 2.5-15cm，皮肤发凉，伴有或不伴有疼痛，按照 INS 标准，此渗出为（C）级.

A.5 级

B.1 级

C.2 级

D.3 级

E.4 级

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/12814311700006035>