

2024 年安徽省祁门县《执业药师之西药学专业二》考试必背 200 题题库大全汇编

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 很少单独缺乏，常伴其他维生素缺乏，大量服用可使尿液变黄，该物质是

- A: 精氨酸
- B: 维生素 AD
- C: 维生素 B2
- D: 维生素 C

答案：C

2. 目前治疗哮喘夜间发作和哮喘维持治疗的理想方案是：糖皮质激素联合应用

- A: 沙丁胺醇
- B: 氨茶碱
- C: 沙美特罗
- D: 特布他林

答案：C

3. 急性心梗死引起的急性室性心动过速可选用

- A: 阿托品
- B: 美西律
- C: 硝苯地平
- D: 利多卡因

答案：D

4. 干扰核酸生物合成的药物是()

- A: 氟尿嘧啶
- B: 多柔比星
- C: 顺铂
- D: 高三尖杉酯碱

答案：A

5. 对甲氧西林耐药的葡萄球菌引起的感染有效的抗生素为

- A: 哌拉西林
- B: 阿莫西林
- C: 氨曲南
- D: 万古霉素

答案：D

6. 连续使用应间隔 4h 以上

- A: 酚甘油滴耳液
- B: 赛洛唑啉
- C: 羟甲唑啉
- D: 麻黄碱

答案：C

7. 可用于慢性支气管炎引起的痰液稠厚、呼吸困难的是

- A: 右美沙芬
- B: 氨溴索
- C: 羧甲司坦
- D: 乙酰半胱氨酸

答案：C

8. 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏者应禁用

- A: 哌嗪
- B: 奎宁
- C: 替硝唑
- D: 伯氨喹

答案：D

9. 通过影响葡萄膜巩膜通道促进房水流出的的是

- A: 碳酸酐酶抑制剂
- B: 拟胆碱药
- C: α_2 受体激动剂
- D: 前列腺素衍生物

答案：D

10. 长期大量服用维生素 K

- A: 视物模糊、疲乏、乳腺肿大
- B: 疲劳、软弱、全身不适、毛发干枯或脱落、皮肤干燥瘙痒、食欲减退、贫血、眼球突出等中毒现象
- C: 视力模糊、乳腺增大、腹泻、头晕、流感样症状等
- D: 低热、烦躁哭闹、惊厥、厌食、体重减轻、骨骼硬化症

答案：A

11. 因是前药，需在肝内转化后生效，严重肝功能不全者不宜选用的糖皮质激素是

- A: 甲泼尼龙
- B: 氢化可的松
- C: 泼尼松龙

D: 泼尼松

答案: D

12. 抗血栓形成、保护动脉内皮的调血脂药是

A: 藻酸双酯钠

B: 阿伐他汀

C: 普伐他汀

D: 氟伐他汀

答案: A

13. 属于 GLP-1 受体激动剂的药物是

A: 伏格列波糖

B: 那格列奈

C: 阿格列汀

D: 利拉鲁肽

答案: D

14. 阿卡波糖是

A: 长效类胰岛素

B: α -葡萄糖苷酶抑制剂

C: 中效类胰岛素

D: 磺酰脲类

答案: B

15. 腺苷蛋氨酸作为保护肝细胞药的作用机制是

A: 作为细胞膜的重要组分，特异性地与肝细胞膜结合，促进肝细胞膜再生，协调磷脂和细胞膜功能，降低脂肪浸润，增强细胞膜的防御能力，起到稳定、保护、修复细胞膜的作用

- B: 降低血清丙氨酸氨基转移酶（ALT）水平
- C: 通过各种机制发挥抗炎作用，有类似激素的作用
- D: 促进胆汁分泌，减轻胆汁淤滞

答案：D

16. 下列哪类药物属于快速杀菌药（）

- A: 氯霉素类
- B: 多黏菌素 B
- C: 氨基糖苷类
- D: 红霉素

答案：C

17. 具有缩小皮脂腺，抑制皮脂腺活性，减少皮脂分泌的药物（）

- A: 壬二酸
- B: 阿达帕林
- C: 异维 A 酸
- D: 维 A 酸

答案：C

18. 强心苷最常见的早期心脏毒性反应是（）

- A: 房性期前收缩
- B: 房颤
- C: 二联律
- D: 室性期前收缩

答案：D

19. （2015 年真题）可致前庭、耳蜗神经功能障碍，妊娠期妇女和新生儿禁止使用的抗菌药物是（）。

- A: 酰胺醇类（氯霉素）
- B: 氨基糖苷类
- C: 林可霉素类
- D: 四环素类

答案：B

20. 下列关于碘苷说法错误的是

- A: 可用于疱疹性脑膜炎
- B: 皮肤疾病可长期用药
- C: 可用于单纯疱疹性角膜炎
- D: 可延缓角膜上皮创伤愈合

答案：B

21. 滴药过频易致反跳性鼻充血，久用可致药物性鼻炎

- A: 羟甲唑啉
- B: 硼酸
- C: 过氧化氢
- D: 克罗米通

答案：A

22. 服用异烟肼进行抗结核治疗的患者，为预防周围神经炎，应补充的维生素是（）

- A: 维生素 A
- B: 维生素 B6
- C: 维生素
- D: 维生素 B2

答案：B

23. (2015 年真题) 易导致牙齿黄染的药品是 ()。

- A: 加替沙星
- B: 庆大霉素
- C: 多西环素
- D: 头孢哌酮

答案: C

24. 患者，男性，26 岁，因“咳嗽伴间断发热 1 周”入院，查体：T38.9℃，P90 次/分，R21 次/分，BP110/70mmHg，血常规：白细胞 $16.9 \times 10^9 / L$ ，中性粒细胞百分比 84.6%；胸部 CT 示右下肺炎症。诊断为“右侧肺炎”。

- A: 该患者用法不能维持全天稳定的血药浓度
- B: 该万古霉素浓度偏低
- C: 在使用万古霉素的第 4 个维持剂量给药前测定谷浓度
- D: 万古霉素是浓度依赖性抗菌药物

答案: D

25. 患者，男，64 岁因“慢性肾脏病、肾性高血压”入院，血压 203/110mmHg，该患者宜首选（如果疗程超过 72 小时需密切监测血中硫酸盐水平）的降压药物是

- A: 硝普钠
- B: 贝那普利
- C: 氨氯地平
- D: 美托洛尔

答案: A

26. 内分泌平衡障碍及精神神经失调所致的失眠宜选用

- A: 氟西泮

B: 氯美扎酮

C: 谷维素

D: 夸西泮

答案: C

27. 低分子量肝素的作用靶点是

A: 因子 IIa

B: 因子 IXa

C: 因子 Xa

D: 凝血酶 III (AT—III)

答案: D

28. 属于钙通道阻滞剂的抗心律失常药是()

A: 普鲁卡因胺

B: 利多卡因

C: 维拉帕米

D: 胺碘酮

答案: C

29. 关于胺碘酮的描述，正确的是()

A: 特异性针对房颤有效

B: 只对室性心动过速有效

C: 对室上性和室性心动过速都有效

D: 只对室上性心动过速有效

答案: C

30. 布地奈德皮下给药的效能约为皮质醇的

A: 15 倍

B: 25 倍

C: 40 倍

D: 100 倍

答案：C

31. 主要作用于有丝分裂 M 期，干扰微管蛋白合成的药物是

A: 顺铂

B: 氟尿嘧啶

C: 多柔比星

D: 高三尖杉酯碱

答案：D

32. 属于时间依赖性且短 PAE 的大环内酯类药是

A: 克拉霉素

B: 氯曲南

C: 红霉素

D: 阿奇霉素

答案：C

33. 注射液含苯甲醇，新生儿和早产儿禁用的药物是

A: 甲氧氯普胺

B: 雷尼替丁

C: 甘草酸二铵

D: 多烯磷脂酰胆碱

答案：D

34. 属于 DPP-4 抑制剂的药物是

A: 伏格列波糖

B: 那格列奈

C: 阿格列汀

D: 利拉鲁肽

答案: C

35. 婴儿和哺乳期妇女禁用()作为泻药。

A: 酚酞

B: 聚乙二醇 4000

C: 硫酸镁

D: 乳果糖

答案: A

36. (2015 年真题) 我国研制的没有“金鸡纳”反应的抗疟药是()。

A: 青蒿素

B: 奎宁

C: 伯氯喹

D: 氯喹

答案: A

37. 血浆半衰期较短的治疗阴茎勃起功能障碍的 5 型磷酸二酯酶抑制剂的是

A: 甲睾酮

B: 丙酸睾酮

C: 他达拉非

D: 西地那非

答案: D

38. 甘草酸二铵可作为保护肝细胞结构和功能的药物，其属于

- A: 解毒类药
- B: 抗炎类药
- C: 必需磷脂类
- D: 促进代谢类药物及维生素

答案：B

39. 严重肝功能不全、胆道阻塞患者禁用()

- A: 四环素可的松
- B: 夫西地酸
- C: 利福平
- D: 氯霉素

答案：C

40. 因易导致新生儿溶血,妊娠晚期妇女禁用的抗菌药物是()

- A: 庆大霉素
- B: 苄星青霉素
- C: 甲硝唑
- D: 呋喃妥因

答案：D

41. 下列哪种药物可使关闭的房角重新开放,从而降低眼内压

- A: 丙美卡因
- B: 噻吗洛尔
- C: 左氧氟沙星
- D: 毛果芸香碱

答案：D

42. 患者，女，55 岁，临床诊断为 2 型糖尿病。目前药物治疗方案如下：

- A: 可能出现的不良反应有腹痛，腹泻，腹胀
- B: 定期监测血清维生素 B12 水平
- C: 服药期间不要饮酒，以免引起低血糖
- D: 服药通常需 3-4 周的治疗才达降糖疗效

答案：D

43. () 与利福平合用时，在用利福平前和疗程中不需调整剂量

- A: 氨茶碱
- B: 糖皮质激素
- C: 氯霉素
- D: 地高辛

答案：D

44. 治疗肾性尿崩症

- A: 氢氯噻嗪
- B: 乙酰唑胺
- C: 呋塞米
- D: 螺内酯

答案：A

45. 与受体结合及解离速度较快，较少引起严重低血糖的磺酰脲类药物是()

- A: 格列美脲
- B: 格列吡嗪
- C: 格列喹酮
- D: 格列齐特

答案：A

46. 在体内主要经 CYP3A4 代谢的质子泵抑制剂是

- A: 铝碳酸镁
- B: 米索前列醇
- C: 枸橼酸铋钾
- D: 兰索拉唑

答案：D

47. 对红霉素的描述，下列不正确的是

- A: 具有肝脏毒性
- B: 属繁殖期杀菌剂
- C: 对青霉素耐药的金黄色葡萄球菌有效
- D: 抗菌谱与青霉素相似但略广

答案：B

48. 癫痫部分性发作首选()。

- A: 奥卡西平
- B: 乙琥胺
- C: 氯巴占
- D: 苯妥莫钠

答案：A

49. 患者，女，26 岁。因心悸、手颤、易饥饿、烦躁易怒前来就诊，实验室检查游离甲状腺

- A: 利多卡因
- B: 碘化钾
- C: 特布他林

D: 普茶洛尔

答案: D

50. 人体主要的热能来源之一，被用来补充热量是

A: 氨基酸

B: 果糖

C: 维生素

D: 葡萄糖

答案: D

51. 下述药物中不属于消毒防腐药的是

A: 过氧乙酸

B: 氨茶碱

C: 戊二醛

D: 硼酸

答案: B

52. 下列说法正确的是

A: 异丙托溴铵口服可提高疗效

B: 长效 β_2 受体激动剂不适合初始用于快速恶化的急性哮喘发作

C: 沙美特罗适用于缓解支气管痉挛的急性症状

D: 氨茶碱可与青霉素合用

答案: B

53. 克拉霉素与环孢素合用()

A: 药理作用拮抗

B: 后者血药浓度下降，药效降低

C: 后者血药浓度升高，不良反应增加

D: 不良反应叠加

答案：C

54. 易产生耐药性,极少单独用药,临床常与两性霉素 B 合用的抗真菌药物是

A: 氟康唑

B: 特比萘芬

C: 卡泊芬净

D: 氟胞嘧啶

答案：D

55. 下列关于吉非替尼的描述，错误的是

A: 与传统化疗药存在交叉耐药

B: 用药期间应监测肝肾功能

C: 常见典型不良反应是皮肤毒性、腹泻

D: 用于治疗经含有铂类或多西他赛治疗失败的晚期非小细胞肺癌患者

答案：A

56. 严重心衰首剂可出现低血压反应的药物是

A: 地高辛

B: 卡托普利

C: 硝酸甘油

D: 氨氯地平

答案：B

57. 可以防治夜盲症的是

A: 维生素 C

B: 维生素 D

C: 维生素 A

D: 维生素 B

答案：C

58. 维持和调节腹膜透析液渗透压的主要物质的是

A: 脂肪乳

B: 维生素

C: 果糖

D: 葡萄糖

答案：D

59. 以下给药途径不能使用氟尿嘧啶的是

A: 鞘内注射

B: 静脉注射

C: 动脉插管注药

D: 静脉滴注

答案：A

60. 治疗急性阿米巴痢疾和阿米巴肝脓肿应首选

A: 依米丁

B: 氯喹

C: 二氯尼特

D: 甲硝唑

答案：D

61. 可导致视神经炎的抗结核药是

A: 吡嗪酰胺

B: 利福平

C: 利福喷丁

D: 乙胺丁醇

答案: D

62. 适用于各种类型疟疾的症状控制，尤其是对抗氯喹恶性及凶险型疟疾有较好疗效的药物是

A: 奎宁

B: 乙胺嘧啶

C: 蒿甲醚

D: 双氢青蒿素

答案: D

63. 较常引起外周神经炎的抗癌药是

A: 巯嘌呤

B: 甲氨蝶呤

C: 氟尿嘧啶

D: 长春新碱

答案: D

64. 静脉注射可出现舌头麻木及口内特殊气味的是

A: 四环素

B: 青霉素

C: 氯霉素

D: 左氧氟沙星

答案: D

65. 强心苷对以下哪种心功能不全疗效最好

A: 严重贫血引起的心功能不全

- B: 高度二尖瓣狭窄引起的心功能不全
- C: 甲状腺功能亢进引起的心功能不全
- D: 伴有心房扑动、颤动的心功能不全

答案：D

66. 治疗钙缺乏症可选用

- A: 依降钙素
- B: 阿法骨化醇
- C: 葡萄糖酸钙
- D: 阿伦膦酸钠

答案：C

67. 可选择性地抑制虫体肌肉中的琥珀酸脱氢酶，使延胡索酸不能还原为琥珀酸，从而影响虫体肌肉的无氧代谢，减少能量产生，同时当虫体与之接触时，能使神经肌肉去极化，肌肉发生持续收缩而致麻痹的药物是

- A: 甲苯咪唑
- B: 左旋咪唑
- C: 哌嗪
- D: 阿苯达唑

答案：B

68. 低剂量可提供接近全效降压作用的药物是

- A: 氢氯噻嗪
- B: 氨苯蝶啶
- C: 阿米洛利
- D: 螺内酯

答案：A

69. 不属于血管紧张素转换酶抑制剂(ACE I)类药物作用特点是()

- A: ACEI 对肾脏有保护作用
- B: ACEI 可防治高血压患者心肌细胞肥大
- C: ACEI 可引起反射性心率加快
- D: ACEI 禁用于双侧肾动脉狭窄者

答案：C

70. 抢救糖尿病合并酮症酸中毒患者

- A: 刺激胰岛 β 细胞释放胰岛素
- B: 静脉用胰岛素
- C: 胰岛素皮下注射
- D: 二甲双胍

答案：B

71. 糖皮质激素的适应证，不包括

- A: 风湿性关节炎
- B: 再生障碍性贫血
- C: 系统性红斑狼疮
- D: 活动性肺结核

答案：D

72. 用于各种原因引起的干咳，成人一次 10~15mg 的药物是

- A: 右美沙芬
- B: 地塞米松
- C: 苯丙哌林
- D: 可待因

答案：A

73. 属于长效和强效的特异性胃肠道脂肪酶抑制剂的是

- A: 阿法骨化醇
- B: 奥利司他
- C: 鲑降钙素
- D: 阿仑膦酸钠

答案：B

74. 治疗耐药金黄色葡萄球菌所致的感染或 β -内酰胺类过敏患者的 G+ 菌严重感染，首选药物是

- A: 替硝唑
- B: 万古霉素
- C: 克林霉素
- D: 红霉素

答案：B

75. 早产儿、新生儿出血宜选用 ()

- A: 尿激酶
- B: 肝素
- C: 维生素 K
- D: 叶酸

答案：C

76. (2019 年真题) 可用于预防风湿热复发的药物是 ()

- A: 呋喃妥因
- B: 苜星青霉素
- C: 甲硝唑
- D: 庆大霉素

答案：B

77. 下列药物可用于治疗小细胞肺癌首选的是

- A: 长春新碱
- B: 替尼泊苷
- C: 依托泊苷
- D: 奥沙利铂

答案：C

78. 白女士，74 岁，以“间断性腹胀 1 月余”主诉入院。患者 1 个月前无明显诱因出现腹胀，既往有乙肝病史 14 年。诊断：肝硬化失代偿期；腹水（大量）。医嘱：

- A: 磺酰脲类过敏
- B: 肝功能不全
- C: 高血钾
- D: 无尿

答案：B

79. 成人使用乙胺嘧啶用于疟疾的预防，服用的时间是

- A: 应于进入疫区前 1~2 周开始服用，一般宜服至离开疫区后 6~8 周
- B: 应于进入疫区前 6~8 天开始服用，一般宜服至离开疫区后 6~8 天
- C: 应于进入疫区前 1~2 天开始服用，一般宜服至离开疫区后 1~2 天
- D: 应于进入疫区前 1~2 周开始服用，一般宜服至离开疫区后 1~2 周

答案：A

80. 患儿，男，5 日。昨起拒食、反应差，今日皮肤明显黄染入院。体检：颈周、前胸多个小脓疱，心肺无异常，肝右肋下 2.5cm，脾肋下 1cm，诊断为新生儿败血症，给予头孢曲松治疗。

- A: 新生儿对头孢曲松不敏感
- B: 新生儿肝功能未发育完全，不宜使用头孢曲松
- C: 新生儿出现明显皮肤黄染时，不宜使用头孢曲松
- D: 新生儿肾功能未发育完全，不宜使用头孢曲松

答案：C

81. 中和胃酸的药物是()

- A: 氢氧化铝
- B: 雷尼替丁
- C: 奥美拉唑
- D: 哌仑西平

答案：A

82. 双嘧达莫最主要的抗凝作用机制是()

- A: 抑制凝血酶
- B: 抑制磷酸二酯酶，使 cAMP 浓度增高
- C: 激活腺苷酸环化酶，使 cAMP 生成增多
- D: 激活纤溶酶

答案：B

83. (2021 年真题) 关于抗心力衰竭药物沙库巴曲缬沙坦的说法，错误的是()

- A: 通过抑制脑啡肽酶，同时阻断血管紧张素 II 的 1 型受体 (AT1) 起效
- B: 与血管紧张素转换酶抑制剂 (ACEI) 合用具有协同作用
- C: 血钾水平 >5
- D: 适用于射血分数降低的慢性心力衰竭 (NYHA II-IV 级，LVEF $\leq 40\%$) 成年患者

答案：B

84. 属于III类抗心律失常药的是

- A: 利多卡因
- B: 奎尼丁
- C: 胺碘酮
- D: 普罗帕酮

答案：C

85. 下列关于林旦的描述中，错误的是

- A: 涂药前勿用热水和肥皂洗澡
- B: 不应与碱性物质接触
- C: 不应与铜制品接触
- D: 不应与铁制品接触

答案：C

86. 长期使用糖皮质激素不会导致

- A: 骨质疏松
- B: 糖尿病
- C: 高血压
- D: 高钾血症

答案：D

87. 变异型心绞痛不宜选用的药物是()

- A: 普萘洛尔
- B: 硝苯地平
- C: 胍乙啶

专业《执业药师之西药学专业二》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: 硝酸甘油

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/135002031123012033>