# 2024河南省马村区《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背200题题库附参考答案（预热题）

## 第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.患者因股癣前来药店购药，不宜推荐的药物是()

A：氢化可的松软膏

B：复方苯甲酸软膏

C：酮康唑软膏

D：联苯苄唑软膏

**答案：A**

2.临床实践验证，一些毒物有相应的特效拮抗剂。因此，在进行排出毒物的同时，应积极使用特效的拮抗剂。

A：青霉胺

B：二巯丁二钠

C：二巯丙醇

D：依地酸钙钠

**答案：C**

3.下列关于脑梗死急性期药物治疗的说法，正确的是（）

A：甘油果糖的脱水作用较甘露醇强且快

B：急性脑梗死的溶栓时间窗是48小时内

C：应在使用溶栓药的同时联合使用阿司匹林

D：血小板计数<100×109/L时禁用溶栓药物

**答案：D**

4.具有心脏毒性，治疗期间每3个月进行一次心脏评估，且在治疗后每6个月重复一次，直至停止治疗后24个月的靶向药是

A: 贝伐珠单抗

B: 帕博利珠单抗

C: 利妥昔单抗

D: 曲妥珠单抗

**答案：D**

5.患者，女，35岁，因患有缺铁性贫血口服硫酸亚铁，该药物主要的不良反应是

A: 心脏相关风险

B: 肾毒性

C: 肝毒性

D: 胃肠道反应

**答案：D**

6.服药饮酒可致使低血糖、呼吸抑制的是

A: 吲哚美辛

B: 甲氨蝶呤

C: 格列本脲

D: 普萘洛尔

**答案：C**

7.下列药物属于改善眼部调节功能的是

A: 山莨菪碱滴眼药

B: 玻璃酸钠滴眼液

C: 羟甲基纤维素钠滴眼液

D: 七叶洋地黄双苷滴眼液

**答案：D**

8.过量服用维生素D所发生中毒的典型临床表现是：

A: 横纹肌溶解或肌痛

B: 间质性骨炎或肾结石

C: 骨骼发育不良或骨软化

D: 骨质疏松症或骨桥

**答案：B**

9.布桂嗪属于

A: 抗组胺药

B: 利尿剂

C: 血管扩张药

D: 镇痛药

**答案：D**

10.原发性蛛网膜下腔出血的常见病因为()

A: 颅内动脉瘤

B: 高血压性动脉硬化

C: 动脉炎

D: 脑血管畸形

**答案：A**

11.服用帕罗西汀等选择性5-羟色胺再摄取抑制剂的患者，如果要更换用单胺氧化酶抑制剂，必须先停药

A: 7天

B: 10天

C: 14天

D: 5天

**答案：C**

12.患者，男52岁，身高168cm，体重85kg，痛风病史6年。近日因多饮、多尿就诊。实验室检查空腹血糖7.8mmol/L(正常值:3.9～6.1mmol/L),餐后血糖148mmo/L(正常值:<7.8mmol/L),血尿酸580μmol/L(正常值:男性180～440μmol/L),血ldlc3.7mmo/L(正常值:2.1~3.1mmo/L)肌酐清除率100ml/min。颈动脉彩超提示:动脉粥样硬化有混合性脂质斑块。临床诊断2型糖尿病、痛风、高脂血症、动脉粥样硬化症.

A: 二甲双胍

B: 甘精胰岛素

C: 格列齐特

D: 阿卡波糖

**答案：D**

13.一般较轻，结膜可充血和水肿，瘙痒而伴有流泪，一般无分泌物或稍有黏液性分泌物的是

A: 过敏性结膜炎

B: 急性卡他性结膜炎

C: 流行性结膜炎

D: 流行性出血性结膜炎

**答案：A**

14.（2018年真题）患者,女,68岁,体重45kg,因发热、咳嗽咳痰入院治疗,临床诊断为社区获得性肺炎。化验结果:白细胞计数11.76×109/L,肌酐清除率18ml/min。该患者使用下列抗菌药物治疗时不需要减量的是（）

A: 头孢噻肟钠

B: 左氧氟沙星

C: 阿莫西林

D: 莫西沙星

**答案：D**

15.属于白三烯受体阻断剂的是

A: 氨茶碱

B: 曲尼司特

C: 多索茶碱

D: 孟鲁司特

**答案：D**

16.利尿药吲达帕胺引起的主要不良反应是

A: 高钾血症

B: 水肿

C: 多毛症

D: 低钾血症

**答案：D**

17.某男性患者，57岁，既往高血压病史10年，与儿子吵架后突然起病，言语不清，左侧肢体无力，意识不清。查体：BP220／120mmHg，中度昏迷，瞳孔不等大，对光反射消失，强痛刺激(+)，左侧肢体不活动，左侧巴彬斯基征阳性。

A：缺血性脑卒中

B：短暂性脑缺血发作

C: 脑血栓形成

D: 脑出血

**答案：D**

18.早餐前半小时服用的药物是（）

A: 雷贝拉唑

B: 枸橼酸铋钾

C: 吉法酯

D: 瑞巴派特

**答案：A**

19.与两性霉素B配伍可以析出沉淀的溶媒是

A: 50%葡萄糖注射液

B: 5%葡萄糖注射液

C: 0.9%氯化钠注射液

D: 复方氯化钠注射液

**答案：C**

20.妊娠期使用某些药物可能导致胎儿发育异常，其中最容易受到药物影响，可能产生形态或者功能上异常而造成胎儿畸形的阶段是

A: 妊娠13～27周

B: 妊娠28～32周

C: 妊娠1～2周

D: 妊娠3～12周

**答案：D**

21.患者，女，65岁，诊断为房性心律失常，给予胺碘酮治疗。近日，因胃溃疡开始用西咪替丁，出现窦性心动过缓症状。

A：①②③④

B：①③⑤

C：①②④⑤

D：②④⑤

**答案：C**

22.患者，男，56岁，诊断为病毒性乙型肝炎。实验室检查：HbeAg（+），HBV-DNA≥20000IU/ml。ALT200U/L。现需要启动抗病毒治疗，采用干扰素α和核苷（酸）类抗病毒药物。

A：替比夫定

B：阿德福韦

C：恩替卡韦

D：拉米夫定

**答案：C**

23.（2017年真题）慢性阻塞性肺病稳定期患者（FEV1<50%）宜选用的治疗方案是（）

A：长效β2受体激动剂+吸入型糖皮质激素

B：吸入型糖皮质激素+镇咳药+抗过敏药

C：吸入型糖皮质激素+磷酸二酯酶抑制剂

D：抗菌药物+短效支气管舒张剂+糖皮质激素

**答案：A**

24.救治磷化锌中毒的过程中，立即应用的催吐药是

A：硫酸钠

B：硫酸镁

C：阿扑吗啡

D：硫酸铜

**答案：D**

25.（2017年真题）处方中外文缩写OS.代表（）

A: 左耳

B: 左眼

C: 右耳

D: 双眼

**答案：B**

26.患者女,25岁,两天前淋雨后开始发热,体温39.0℃,咳嗽,咳铁锈色黏痰,化验结果提示白细胞计数及中性粒细胞比例升高,诊断为肺炎,经验性抗感染治疗时适宜选用的药物（）

A: 头孢他啶

B: 阿米卡星

C: 头孢唑林

D: 阿奇霉素

**答案：C**

27.分为儿童卷、化学药品与生物制品卷的是

A: 《医师案头参考》

B: 《英国国家处方集》

C: 《国家基本药物处方集（2012年版）》

D: 《中国国家处方集（2010年版）》

**答案：D**

28.关于癌症疼痛患者止痛药使用原则的说法，错误的是()

A: 疼痛时用药，不痛时不需用药

B: 提倡无创给药方式，尽量口服

C: 应个体化用药

D: 按阶梯给药

**答案：A**

29.药学服务的具体工作不包括

A: 参与临床药物治疗

B: 处方审核

C: 关注特殊人群

D: 治疗药物监测

**答案：C**

30.两种药物配伍之后效价降低的是()

A: 头孢曲松与复方氯化钠注射液

B: 头孢唑林钠与0.9%氯化钠注射液

C: 青霉素与5%葡萄糖注射液

D: 胰岛素与0.9%氯化钠注射液

**答案：C**

31.血液具有输送营养、氧气、抗体、激素和排泄废物及调节水分、体温、渗透压、酸碱度等功能。成人的血液占体重的8%～9%。血液中的成分分为血浆(无形成分)和细胞(有形成分)两大部分。在正常情况下，血细胞主要包括红细胞、白细胞、粒细胞、淋巴细胞、血小板等。

A: >90g/L

B: 61～90g/L

C: 31～60g/L

D: <30g/L

**答案：D**

32.属于选择性GABAA复合受体拮抗剂

A：艾司唑仑

B：唑吡坦

C：阿戈美拉汀

D：米氮平

**答案：B**

33.患者，女，40岁，既往有风湿性心脏病病史，近2年来出现劳累性呼吸困难，1天前因受凉出现发热、咳嗽，咳粉红色泡沫样痰，不能平卧。查体：半卧位，口唇发绀，两肺大量水泡音及哮鸣音。

A：肺动脉栓塞

B：慢性支气管炎急性发作

C：支气管哮喘

D：急性左心衰竭

**答案：D**

34.以下治疗沙眼的药物中，对急性结膜炎者忌用的是()。

A：硫酸锌滴眼剂

B：红霉素眼药膏

C：利福平滴眼剂

D：酞丁安滴眼剂

**答案：A**

35.用药期间禁止饮酒否则可出现面部潮红、头痛、眩晕等“双硫仑样反应”的药品是

A：庆大霉素?

B：青霉素钾?

C：替硝唑?

D: 克林霉素?

**答案：C**

36.具有长效、平稳、血药浓度无峰值特点的胰岛素/胰岛素类似物是

A: 普通胰岛素

B: 低精蛋白锌胰岛素

C: 预混胰岛素

D: 甘精胰岛素

**答案：D**

37.伏立康唑体内代谢的主要肝药酶是（）

A: CYP1A2

B: CYP2C9

C: CYP2C19

D: CYP2B6

**答案：C**

38.具有临床耐受性良好、无戒断效应特点的治疗失眠症药物为（）

A: 低剂量的多塞平

B: 小剂量米氮平

C: 阿戈美拉汀

D: 艾司唑仑

**答案：A**

39.关于患者用药注意事项的说法错误的是()

A: 应定期监测地高辛血药浓度

B: 在患者症状好转后,应立即停用比索洛尔

C: 应注意观察是否有黑便

D: 应定期监测血压、心率

**答案：B**

40.患者，女，50岁，50kg，157cm，患复发转移性乳腺癌，术后使用曲妥珠单抗进行靶向治疗。药师应告知的用药注意事项和患者教育，错误的是

A: 用药前应进行RAS基因筛查

B: 用药期间应每3个月监测心脏功能

C: 每周给药1次，第1周给药剂量200mg，静脉滴注90min

D: 从第2周起，每次给药100mg，静脉滴注30min

**答案：A**

41.患者，男，68岁，既往体健，因“受凉后咳嗽、咳黄脓痰，伴发热2天”入院。查体：体温39．1℃，血压138／80mmHg，心率102次／分，呼吸32次／分，左肺可闻及湿性哕音。化验结果：白细胞计数11．2×109／L，中性粒细胞百分比85％。胸部x线：左肺下叶渗出性阴影。痰培养结果待归。入院诊断：社区获得性肺炎。

A: 阿奇霉素

B: 多西环素

C: 阿莫西林一克拉维酸钾+阿奇霉素

D: 左氧氟沙星+阿奇霉素

**答案：C**

42.粪外观所对应的疾病,阻塞性黄疸

A: 暗红果酱色

B: 柏油便，黑色有光泽

C: 米泔水样

D: 白陶土便

**答案：D**

43.老年人退热服用贝诺酯，1日3次；1日用量不得超过

A: 2.0g

B: 1.5g

C: 2.5g

D: 3.0g

**答案：C**

44.患者，男，65岁，良性前列腺增生病史3年，高血压病史2年，咳嗽，咳痰10余年，伴哮喘，尤以活动后明显，因近半月咳嗽加重入院，主诉便秘，每周2次排便，长期口服硝苯地平控释片30mg/qd，血压控制良好。体格检查：体温36.6℃，P82次/分，R22次/分，端坐位，喘息貌，桶状胸，双肺叩诊过清音，散在干啰音，双肺下少许湿罗音，辅助检查：血常规WBC11.2×10

A: 硝苯地平控释片

B: 异丙托溴铵溶液

C: 氨溴索注射液

D: 布地奈德混悬液

**答案：B**

45.老年人服用可能出现认知功能受损、谵妄、跌倒的药物是

A: 苯二氮䓬类药

B: 甲氧氯普胺

C: 双嘧达莫

D: 哌替啶

**答案：A**

46.急性汞中毒出现

A：腐蚀性口腔炎

B：恶心、呕吐、视力模糊

C：恶心、呕吐、口内有金属味

D：肌肉震颤、抽搐

**答案：A**

47.药师在处方调剂操作中，下列处方应重新开具才能调剂的是

A：给流感患者开具速感宁胶囊、维生素C片使用一张处方用纸，分行书写

B：给慢性支气管炎患者开具沙丁胺醇气雾剂、中药饮片，使用同一张处方用纸

C：给门诊患者开具7d用量的地西泮片

D：给儿童细菌性腹泻患者开具小檗碱片使用淡绿色处方用纸

**答案：B**

48.下列白细胞计数检查结果中，属于不正常的是

A：新生儿16.0X109/L

B：成人8.0X109/L

C：成人4.3X109/L

D：成人3.0X109/L

**答案：D**

49.（2021年真题）治疗艾滋病的非核苷类逆转录酶抑制剂是（）

A：拉米夫定

B：依非韦伦

C：利巴韦林

D：阿昔洛韦

**答案：B**

50.高血压合并心肌梗死首选（）

A：氢氯噻嗪

B：硫酸镁

C：特拉唑嗪

D：卡托普利

**答案：D**

51.双氯芬酸片的适宜服用时间是

A：餐中

B：餐后

C：餐前

D：早晨

**答案：B**

52.利尿降压药

A：缬沙坦

B：依那普利

C：氨氯地平

D：氢氯噻嗪

**答案：D**

53.患者,男,82岁,诊断为帕金森病,给予左旋多巴联合卡比多巴治疗,产生的药物相互作用属于()

A：降低抗药性,疗效增加

B：增加靶器官药物浓度,药品不良反应减少

C：拮抗作用,药品不良反应增加

D: 敏感化作用,药品不良反应增加

**答案：B**

54.白细胞分类中，淋巴细胞参考范围为

A: 20%～40%

B: 50%～70%

C: 1%～5%

D: 3%～8%

**答案：A**

55.关于匹维溴铵，下列说法不正确的为

A: 松弛胆道口括约肌

B: 为钙离子拮抗剂

C: 降低食管下括约肌压力

D: 有抗胆碱能作用

**答案：C**

56.成年人血清中低密度脂蛋白胆固醇含量是

A: 3.1～5.7mmol/L

B: 0.56～1.70mmol/L

C: 2.1～3.1mmol/L

D: 1.03～2.07mmol/L

**答案：C**

57.有机氟杀虫农药中毒的特效解毒剂是

A: 维生素K1

B: 乙酰胺

C: 碘解磷定

D: 毒扁豆碱

**答案：B**

58.患者，男，72岁，以“间断发热、纳差、精神抑郁半年，再发高热1天”为主诉入院，既往体健，无高血压、糖尿病、冠心病史。入院时查体：T36.9℃，P88次/分，R22次/分，BP112/77mmHg，可触及颈部、锁骨上、腋下多部位浅表淋巴结肿大。经实验室检查、影像学检查，确诊为非霍奇金淋巴瘤。

A: 苯海拉明

B: 维生素B6

C: 美司钠

D: 右雷佐生

**答案：A**

59.患者,男,28岁,外出进餐后出现腹泻,日6次,水样便,无发热和腹痛症状。宜选用的药物是（）

A: 蒙脱石散

B: 奥美拉唑肠溶胶囊

C: 干酵母片

D: 复方阿嗪米特肠溶片

**答案：A**

60.患者，男，62岁，糖尿病病史7年，长期使用胰岛素、二甲双胍治疗，近期为控制血压加服治疗药物，该患者不宜应用的药物是

A: 氢氯噻嗪

B: 普萘洛尔

C: 洛伐他汀

D: 卡托普利

**答案：B**

61.麻醉药品、第一类精神药品处方的前记中，必须添加的项目是

A：药品名称、剂型、规格、数量

B：患者身份证明编号

C：临床诊断

D：患者姓名、性别

**答案：B**

62.为降低肾小管坏死的发生率，应在输注前、后12h给予加入氯化钾的足量生理盐水和呋塞米，保持尿量不少于100ml／h的药物是

A：头孢菌素类药物

B：三环类抗抑郁药

C：格列喹酮

D：顺ｆ铂

**答案：D**

63.用于晚期不宜手术或复发的局限性肿瘤

A：肌内注射

B：腔内注射

C：静脉注射

D：动脉注药

**答案：D**

64.与胆酸螯合剂合用，应至少提前2h服用的药物是

A：螺内酯

B：依折麦布

C：伊曲康唑

D: 他汀类与烟酸类联用

**答案：B**

65.妥布霉素可导致药源性肾病的机制是

A: 结晶沉积

B: 前列腺素合成障碍

C: 肾小球滤过率下降

D: 不可逆性肾小管坏死

**答案：C**

66.(解救常见毒物中毒的催吐措施)，可用口服吐根糖浆15ml、饮水500ml催吐解救的中毒是

A: 丙戊酸钠中毒

B: 丙米嗪中毒

C: 磷化锌中毒

D: 三唑仑中毒

**答案：B**

67.（2016年真题）用于治疗铅中毒的特殊解毒剂是（）。

A: 乙酰胺

B: 青霉胺

C: 氟马西尼

D: 纳洛酮

**答案：B**

68.可引起A/G比值＜1的是

A: 摄入不足、消化不良时

B: 自身免疫性疾病如风湿热、红斑狼疮等

C: 各种原因脱水所致的血液浓缩

D: 慢性肝炎、肝硬化、肝实质性损害

**答案：D**

69.患者，女，62岁，医师处方如下：患者：××X，性别：女，年龄：62岁。临床诊断：2型糖尿病高血压2级高脂血症PCI术后。

A: 二甲双胍

B: 氨氯地平

C: 阿卡波糖

D: 氯吡格雷

**答案：B**

70.可致齿龈增生的抗癫痫药为（）

A: 苯巴比妥

B: 丙戊酸钠

C: 苯妥英钠

D: 卡马西平

**答案：C**

71.长期服用可加重消化道溃疡风险，不宜与非甾体抗炎药合用的药物是

A: 铝碳酸镁

B: 匹伐他汀

C: 多奈哌齐

D: 美金刚

**答案：C**

72.（2017年真题）可能影响儿童骨骼发育的药物是（）

A: 头孢克洛

B: 复方磺胺甲噁唑

C: 阿莫西林

D: 诺氟沙星

**答案：D**

73.良性前列腺增生症老年患者应用 α1 肾上腺素能受体阻断治疗时可能导致的不良反应是()

A: 体位性低血压

B: 尿潴留

C: 干咳

D: 乳腺增生

**答案：A**

74.能显示药师的文献评价能力和技巧的咨询服务方法步骤是

A: 对查阅的资料进行评价、分析和整理

B: 随访工作效果，并建立档案

C: 对问题进行确定并归类

D: 形成答案并以口头形式提供给询问者

**答案：A**

75.重症、急救治疗时，要求药物迅速起效，最不适宜选用的给药途径是

A: 腔道给药

B: 静脉滴注

C: 喷雾给药

D: 吸入给药

**答案：A**

76.患者，男，25岁，咳嗽、咳痰伴胸痛，发热，体温38．5℃，入院检查肺部湿哕音，WBC12×109／L，X线显示片状、斑片状浸润性阴影及间质性改变，不伴胸腔积液。

A：静脉炎

B：宜空腹服用

C：胃肠道反应

D：过敏，白细胞减少

**答案：C**

77.乳酸性酸中毒患者宜选用()。

A：格列喹酮

B：瑞格美脲

C：胰岛素

D：二甲双胍

**答案：C**

78.患者，女，57岁，最近因失眠来门诊就医。经医生咨询，患者反映以前没有过失眠现象，近期因工作原因导致压力加大，心理负担过重，白天想睡觉，晚上却无法入睡，每天睡眠不足5h。医生给予患者建议平时要注意多增加运动，缓解压力，并开具了如下处方：地西泮片：5mg×20／5mgqd

A：门诊处方所开剂量不能超过7日用量

B：处方应写商品名

C：超适应证用药

D：无适应证用药

**答案：A**

79.急、慢性肾小球肾炎可引起

A：尿酸碱度增高

B：尿胆红素检测阳性

C：尿酸碱度降低

D：尿蛋白检测阳性

**答案：D**

80.若需要70%的乙醇1000ml，现有95%的乙醇应如何配制

A：取736.8ml95%的乙醇，加水稀释至1000ml

B：取263.2ml95%的乙醇，加水稀释至1000ml

C：取263.2ml95%的乙醇，加1000ml水

D：取736.8ml95%的乙醇，加1000ml水

**答案：A**

81.对磺胺类药物过敏者可以选用的利尿剂是

A：依他尼酸

B：布美他尼

C：乙酰唑胺

D：氢氯噻嗪

**答案：A**

82.高度心脏传导阻滞抗高血压药物的禁忌证

A：维拉帕米

B：美托洛尔

C：依那普利

D：氢氯噻嗪

**答案：B**

83.（2018年真题）患者,女,71岁,2型糖尿病史10年。化验结果糖化血红蛋白（HbA1c）9.2%,空腹血糖10.5mmol/L,餐后血糖15.5mmo/L。目前服用二甲双胍片0.5gtidpo,格列美脲片2mgtidpo,罗格列酮片2mgbidpo,甲钴胺片0.5mgtidpo,羟苯磺酸钙胶囊250mgbidpo。

A: 甲钴胺片0.5mgtidpo

B: 二甲双胍片0.5gtidpo

C: 罗格列酮片2mgbidpo

D: 格列美脲片2mgtidpo

**答案：D**

84.患者，男，54岁，主因乏力、纳差20天就诊。患者在20天前无明显诱因出现乏力、纳差，偶有腹部隐痛。于当地医院检查乙肝五项示HBsAg（+），HBeAb（+），HBcAb（+）；丙肝抗体（-）。HBV-DNA5.3×106copies／ml。肝功能指标：ALT60.7U／L，AST55.9U／L，ALB39.4g／L，TBIL13.4μmol／L。在20年前因“急性黄疸”住院治疗，化验乙肝病毒阳性。诊断慢性病毒性肝炎（乙型）。给予恩替卡韦0.5mg，每日1次进行治疗。

A: 葡醛内酯

B: 阿昔洛韦

C: 利巴韦林

D: 乙型肝炎疫苗

**答案：A**

85.重组人促红素需要的特殊贮存条件是

A: 低温

B: 密闭

C: 遮光

D：不宜振摇

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/135230100114012033