

病理学专业知识

您的姓名： [填空题 I*1. 下列叙述错误的是() [单选题 1 *

A 胶质瘤多位于大脑实质内 B 脑膜瘤多位于脑表面

C 室管膜瘤多位于脑室 D 髓母细胞瘤几乎位于小脑和第四脑室内

E 毛细细胞星形细胞瘤多位于大脑半球实质内 **正确答案)** 答案解析：毛细细胞星形细胞瘤多位于丘脑下部、视神经和小脑内。

2. 胶质瘤免疫组化染色中，错误的是() [单选题] *AGFAP 阳性

B Vimentin阳性 CCD56 阳性

DCK 阳性**(正确答案)** ENSE 阳性

答案解析：CK 阳性常见于上皮性肿瘤。

3. 1级脑膜瘤不包括() | 单选题 I*A 乳头型**正确答案)**

B 内皮型 C 纤维型

D 砂粒型 E 肾盂、肾间质、肾小管的炎性疾病(j

30. 急性肾盂肾炎最常见的病原体是() [单选题] *A 变形杆菌

B 产气杆菌 C 大肠杆菌**(正确答案)**

D 葡萄球菌 E 链球菌

答案解析：急性肾盂肾炎可由血源性感染和上行感染造成。其中上行感染主要的病原体为革兰阴性菌，如大肠杆菌，本题属于识记题。

31. 肾细胞癌可伴有下列哪种表现() [单选题] *A 高脂血症

B 脂滴沉积 C 低补体血症

D 红细胞增多症**:正级答妄)** E IgA 沉积

32. 肾母细胞瘤来源于() [单选题] *A 肾盂黏膜

B 肾小管上皮细胞 C 肾脏上皮细胞

D 壁层上皮细胞 E 后肾胚基组织正所答案)

33. 男性, 70 岁, 30 多年吸烟史。半年前咳嗽, 咳痰, 发热。X 线检查显示右肺整个下叶不均匀阴影, 经抗感染治疗 3 周, 咳痰、发热症状减轻, 但仍有咳嗽, 且为干咳。再次 X 线检查显示右肺门处不规则分叶状巨大阴影, 边界不清, 支气管镜活检, 显微镜下见: 细胞呈巢状排列, 少部分细胞巢中央有层状角化物, 细胞间可见细胞间桥, 最可能的诊断是。【单选题】 *A 肺鳞状细胞癌 II甫答案)

B 大叶性肺炎 C 小叶性肺炎

D 慢性纤维空洞型肺结核 E 原发性肺结核

34. 分泌期宫内膜的厚度约为() [单选题] *A 5mm (正确答案)

B 2-3mm C 1 0mm

D 8mm E 3-4mm

答案解析:分泌期, 又称黄体期。排卵后, 卵巢内黄体形成; 在黄体分泌的雌激素和孕激素作用下, 子宫内膜增厚至 5mm 。

35. 下列哪些症状与膀胱癌无关() [单选题] *A 肾盂积水

B 尿频、尿急 C 血尿

D 疼痛 E 酸性磷酸酶增高 (正确答案)

36. 下列哪个不同于膀胱癌的转移病灶() [单选题] *A 侵犯输尿管

B 血路转移到肝、肺 C 侵犯子宫

D 淋巴道转移到左锁骨上淋巴结 确答案) E 淋巴道转移到腋动脉旁淋巴结

37. 女性, 40 岁。平日体质弱, 因胃溃疡、胃出血行胃大部切除术, 术后第 5 天开始出现咳嗽、咳黏液脓痰; 查体: 双肺下叶背侧听诊可闻湿啰音; X 线: 双肺下叶散在不规则斑点状模糊阴影。请判断其可能为() [单选题] *A 慢性支气管炎

B 支气管扩张 C 大叶性肺炎

D 病毒性肺炎 E 支气管肺炎(正确答案)

38. CIN 合并哪型 HPV 感染时，恶变倾向较高() [单选题] *A 6、 11 型

B 16、 18、 33 型(正确答案) C6、 16 型

D 11、 16 型 E6、 18 型

39. 肾细胞癌时，下列镜下病变哪个除外() [单选题] *A 透明细胞癌

B 常有出血坏死 C 移行细胞癌(正确答案)

D 嫌色细胞癌 E 乳头状腺癌

答案解析：肾细胞癌镜下透明细胞癌是最常见的类型，次之为颗粒细胞癌，有时癌细胞中有大量乳头状结构称为乳头状腺癌。肾细胞癌血管丰富常有出血、坏死，而移行细胞癌是膀胱癌的主要类型。

40. 血源感染性肾盂肾炎最常见的细菌是() [单选题] *A 链球菌

B 肠球菌 C 大肠杆菌

D 金黄色葡萄球菌(正确答案) E 霉菌

41. 慢性肾炎晚期肾小球最主要的变化是() [单选题] *A 肾小球纤维化、玻璃样变(正确答案)

B 肾小球周围纤维化 C 入球小动脉玻璃样变

D 毛细血管内皮增生 E 肾球囊壁层上皮细胞增生

42. 男孩，6岁。1周前患上呼吸道感染，经治疗好转。近来出现大量蛋白尿、水肿、低蛋白血症和高胆固醇血症。肾脏穿刺检查结果：肾小球和肾小管均未见明显病变，免疫荧光染色均为阴性，本例最有可能是() [单选题] *A 急性弥漫性增生性肾小球肾炎

B 膜性肾小球肾炎 C 膜性增生性肾小球肾炎

D 轻微病变性肾小球肾炎(正确答案) E 系膜增生性肾小球肾炎

答案解析：引起儿童肾病综合征的肾小球肾炎有多种，轻微病变性肾小球肾炎比较常见，轻微病变性肾小球肾炎在光镜下少数肾小管内可见脂质空泡，多数无明显病

变，免疫荧光均为阴性，电镜下可见肾小球脏层上皮细胞的足突广泛融合，消失。

43. 男性患者，54岁，5年前体检时腹部B超发现左肾一个孤立性占位病变，呈囊状，当时未给予任何治疗。5年间随诊观察，占位病变生长缓慢。近半年，常有局部不适和尿路感染症状。手术切除病变。病理检查见一直径4cm的囊性病变，囊壁薄，内含黄色透明液体。显微镜下：囊肿压迫周围正常肾组织，囊壁内衬单层不连续的上皮细胞。其诊断应为（）[单选题] *A 囊肿性肾发育不良

B 髓质海绵肾 C 成人型多囊肾

D 婴儿型多囊肾 E 单纯性肾囊肿 **正确答案)**

答案解析:囊肿性肾发育不良多见于新生儿和儿童，病理上应有原始的小管和化生软骨。髓质海绵肾十分罕见，外观像海绵，大部分为双侧肾发病。成人型多囊肾，一般呈现多个囊肿，各囊肿见有少量相对正常肾组织。婴儿型多囊肾幼儿发病，因此病例为单纯性肾囊肿。

44. 关于甲状腺腺瘤的描述中错误的是（）[单选题] *A 甲状腺滤泡上皮发生的良性肿瘤

B 表现为实性结节样肿块 C 极少并发出血、坏死、囊性变 **正确答案)**

D 中青年女性多见 E 嗜酸细胞型腺瘤又称Hurthle细胞腺瘤

答案解析:甲状腺腺瘤是甲状腺滤泡上皮发生的一种常见的良性肿瘤，中青年女性多见。肉眼观:多为单发的实性结节，圆或类圆形，直径一般3-5cm,切面色暗红或棕黄，可并发出血、囊性变、钙化和纤维化。有完整的包膜，常压迫周围组织。组织学可分为:单纯型腺瘤、大滤泡性(胶样型)腺瘤、小滤泡(胎儿型)腺瘤、胚胎型腺瘤、嗜酸细胞型腺瘤(又称Hurthle细胞腺瘤)等。

45. 临床上常见的子宫颈糜烂为() [单选题] *A 宫颈鳞状上皮因炎症或损伤而坏死、脱落，形成表浅的缺损

B 宫颈鳞状上皮假上皮瘤样增生 C 宫颈黏膜腺体和间质纤维结缔组织呈局限性增生

D 宫颈黏膜的腺腔被黏液或化生的鳞状上皮堵塞使黏液潴留，腺体扩大 E 子宫颈管内柱状上皮外移取代受损伤的宫颈阴道部的鳞状上皮 **正确答案)**

答案解析:临床上常见的宫颈糜烂为宫颈阴道部的鳞状上皮受损后由子宫颈管的柱状上皮外移替代，鳞状上皮，使宫颈表面呈红色似糜烂，实为假性糜烂。

46. 光镜检查显示肾小球毛细血管壁均匀增厚，无明显炎症，最可能的诊断是() [单选题] *

A 脂性肾病 B 膜性肾病(司正确答案)

C 膜性增生性肾小球肾炎 D 系膜增生性肾小球肾炎

E 毛细血管内增生性肾小球肾炎为判断月经周期中的排卵情况，适宜的取材时间为。 [单选题] *

A 月经前 1~2 天(1)正确答案) B 月经第 15~18 天

C 月经第 11~14 天 D 月经第 20-23 天

E 若月经不规则，可在月经结束时刮宫答案解析：判断月经周期中的排卵情况时，宜在月经前 1~2 天取材，月经不规则时，可在月经开始当天取材。

47. 宫颈上皮内瘤变时醋酸白试验，病变处接触醋酸后变为() [单选题] *A 白色(正确答案)

B 不变色 C 红色

D 蓝色 E 黑色

答案解析：宫颈上皮内瘤变醋酸白试验时，病变处变为白色，正常处不变色。

48. 下面 5 组肺癌呈现神经内分泌肿瘤相关标记物阳性(NSE, CgA)的是() [单选题] *A 鳞状细胞癌、腺癌、类癌

B 腺癌、类癌和小细胞癌 C 大细胞癌、小细胞癌和鳞状细胞癌

D 肉瘤样癌、肺母细胞瘤和大细胞癌 E 类癌、小细胞癌和大细胞神经内分泌癌(正确答案)

答案解析：肺癌的组织学分型主要分为：①来源于支气管上皮的癌；②来源于细支气管上皮和 II 型肺泡细胞的癌；③来源于神经内分泌细胞的癌；④来源于支气管黏膜下分泌腺的癌。其中来源于神经内分泌细胞的癌可呈现神经内分泌肿瘤相关标记物阳性，包括：典型类癌、非典型类癌、大细胞神经内分泌癌和小细胞癌。因此本题答案为 E。

49. 下列关于 CIN 的描述错误的是() [单选题] *A 发生 CIN 的风险与性伙伴的数目和 HPV 感染情况密切相关

B 属于癌前病变 C 宫颈液基细胞检查可发现其早期病变

DCINIII 级不包括原位癌:正矿答案)E CINI/R可自然消退

答案解析:CINIII级为明显异型的鳞状上皮细胞超过上皮层的下 2/3鳞状上皮细胞层次消失。表层尚可见一些成熟的扁平细胞相当于重度非典型增生,或异型细胞占据上皮全层相当于原位癌。

50. 女性,70岁,因脑血栓卧床1年余。时有咳嗽、咳黄色黏痰,经抗生素治疗症状可减轻,但近2个月来咳嗽,咳黄色黏脓痰明显加重。查体:患者慢性病容,发热、双肺下叶可闻及湿啰音;X线片示双肺不规则小片状模糊阴影,下叶和背侧的片状阴影较大,该病例肺组织疾病最大可能为() [单选题] *A 大叶性肺炎

B 支气管扩张 C 小叶融合性肺炎(正确答案)

D 慢性支气管炎 E 肺气肿

51. 绝经后老年女性宫颈发生的哪种病变最易误诊为高级别 CIN 病变() [单选题] *A 鳞状上皮化生

B 输卵管上皮化生 C 移行上皮化生(正确答案)

D 柱状上皮乳头状增生 E 鳞状上皮假上皮瘤样增生

答案解析:移行上皮化生常见于老年女性的外宫颈部,常常伴有萎缩,形态上类似于移行上皮。细胞核为卵圆形无非典型性,常有纵行的核沟,易误诊为高级别 CIN 的良性病变。

52. CIN 的标记物是() [单选题] *AP16(正确答案)

B Ki67CP53

DCKEPCNA

答案解析:P16 是一种 cyclin依赖性激酶抑制剂,是 CIN 的标记物。

53. 关于宫颈微偏型腺癌的描述错误的是() [单选题] *A 组织学形态较温和,易漏诊

B 呈内生性侵袭性生长,可早期转移 C 子宫颈常超常肥大或结节状,质硬

D 增生腺体位于子宫颈较深处 E 患者常有阴道不规则出血,阴道血性排泄物,接触性出血症状: 确答案)

答案解析:宫颈微偏型腺癌患者常有大量黏液性白带或阴道排液症状,而E为宫颈鳞癌的常见症状。

54. 子宫内膜腺上皮的核下空泡出现在月经周期的() [单选题] *A 11~14 天

B 20~23 天 C 24~28 天

D 15-19天(正确答案)E 17~20 天

答案解析:核下空泡为分泌早期的特征,月经期第15~19天为分泌早期。

55. 下列关于判断月经周期中的排卵情况的描述错误的是() [单选题] *A 子宫内膜呈现早期分泌期形态时,表示卵巢有排卵功能

B 子宫内膜呈现中期分泌期形态时,表示卵巢黄体功能良好(王确答案)C 内膜间质细胞呈现蜕膜样变时,提示卵巢黄体功能良好

D 若子宫内膜呈现增殖形态而无分泌期变化,说明未排卵 E 若月经周期不规则,可在月经开始的当天行刮宫检查

56. 下列关于更年期子宫内膜的描述错误的是() [单选题] *A 不充分的分泌期形态

B 增殖期形态 C 兼呈增殖期形态和分泌期形态

D 子宫内膜可呈现增生和非典型增生 E 内膜菲薄,腺腔大小不等,不规则腺腔扩张,间质致密(正确答案)

答案解析:E为绝经后子宫内膜的组织学形态。

57. 绝经后子宫内膜生理状态下一般不会出现() [单选题] *A 内膜菲薄,厚0.1cm

B 腺体稀少、小而直 C 间质致密,细胞呈梭形

D 腺腔大小不等,不规则囊性扩张 E 再现分泌期形态(正加答案)

答案解析:A、B、C为单纯性萎缩,D为囊性萎缩,E为病理状态时的改变。

58. 子宫内膜癌WHO的TNM分期中T1a期为。 [单选题] *A 肿瘤局限于子宫内膜(正纳答案)

B 肿瘤浸润子宫肌壁 $\leq 1/2$ 肿瘤浸润子宫肌壁 $1/2$ 或 $>1/2$

D 肿瘤浸润子宫肌壁 $\leq 1/3$ E 肿瘤累及宫颈内膜腺体

答案解析：B 为 T1b 期，C 为 T1c 期，E 为 T2a 期。

59. 患者女性，26 岁，停经 2 个月，阴道排出子宫腔形状、中空的蜕膜组织，最可能诊断为 () [单选题] *E 微囊型

答案解析：乳头型脑膜瘤为 WHO I 级。

4. 不符合神经母细胞瘤特点的是 () [单选题] *A 发生于婴儿和儿童

B 出现 Homer-Wright 菊形团 C 浸润性生长，易转移

DS-100、NSE 和 NF 可阳性 E 恶性度极低 (正确答案)

答案解析：神经母细胞瘤是恶性度很高的肿瘤。

5. 视网膜母细胞瘤的镜下改变，不包括 () [单选题] *A 肿瘤细胞呈假菊花团排列

B 肿瘤细胞呈菊花团排列 C 类似光感受器的结构

D 钙化和坏死 E 肿瘤细胞呈筛样结构排列 (正确答案)

6. 不符合骨母细胞瘤特点的是 () 【单选题】 *A 多见于中青年男性

B 好发于下肢骨、椎骨及颌骨 C 伴发骨痛

D 肿瘤大小多为 2-10cm E 瘤组织富含成骨细胞，细胞异型性明显，核分裂象多见 (正确答案)

答案解析：骨母细胞瘤由成骨细胞并形成骨样组织和不成熟骨小梁构成，小梁间为疏松纤维血管性间质；成骨细胞形态规则，异型性不明显，密集排列，核分裂象罕见。

A 宫内妊娠 B 子宫内膜息肉

C 子宫内膜炎 D 宫外孕 (正确答案)

E 子宫内膜癌 答案解析：患者 26 岁，停经 2 个月，提示可能为妊娠，阴道排出子宫腔形状中空内蜕膜组织为蜕膜管型，未见胚胎及绒毛则提示宫外孕。

60. 男性，20 岁。2 天前路上遇暴雨全身淋透，回家后即发冷、寒战、体温 39.8°C ；伴胸痛、咳嗽、咳铁锈色痰。查体：左肺下叶叩诊浊音，听诊可闻及支气

管呼吸音，X 线检查见左肺下叶大片致密阴影。其最可能患有（） [单选题] *A 急性自发性气胸

B 肺脓肿 C 支气管肺炎

D 大叶性肺炎正铤答案） E 病毒性肺炎

61. 女性，40 岁，阴道不规则流血，超声示子宫黏膜下肌壁间多个大小不等的结节。此病例最可能的诊断是（） 1 单选题 I*

A 子宫内膜异位症 B 绒癌

C 侵袭性葡萄胎 D 子宫平滑肌瘤（正确答案）

E 子宫内膜间质肉瘤（63~65 题共用题干）患者男性，49 岁，年轻时曾患过肺结核。近 1 年来咳嗽，咳痰，痰中带血。X 线检查：可见右肺上叶多个大小不等的厚壁空洞，胸膜增厚，肺门上吊，纹理呈垂柳状，纵隔向右侧偏移，邻近肺组织及对侧肺呈代偿性肺气肿

改变。痰中查见大量结核杆菌。

该患者应诊断为。 [单选题] *A 局灶型肺结核

B 浸润型肺结核 C 干酪样肺炎

D 肺结核球 E 慢性纤维空洞型肺结核（1 确答案）

62. 右肺上叶空洞的病理变化不正确的是（） [单选题] *A 内层为干酪样坏死物

B 中层为结核性肉芽组织 C 外层为纤维结缔组织

D 空洞内结核杆菌较少见（确答案） E 空洞下有播散病灶

63. 该患者不可能发生的后果是（） [单选题] *A 肺组织广泛纤维化

B 肺动脉高压而致肺源性心脏病 C 肺组织严重破坏甚至使肺功能丧失

D 空洞突破胸膜可引起气胸或脓气胸 E 长期病变恶化为肺癌正确答案）

答案解析：慢性纤维空洞型肺结核病变有以下特点：①肺内有一个或多个厚壁空洞。多位于肺上叶，大小不一，不规则。镜下洞壁分三层：内层为干酪样坏死物，其中有大量结核杆菌；中层为结核性肉芽组织；外层为纤维结缔组织。②同侧或对侧肺组织，特别是肺小叶可见由支气管播散引起的很多新旧不一、大小不等、病变类型不同的病灶。愈往下愈新鲜；X 线检查，可见右肺上叶多个大小不等的厚壁空洞，胸膜增厚，肺门上吊，纹理呈垂柳状。③后期肺组织严重破坏，广泛纤维化，胸膜增厚并与胸壁粘连，使肺体积缩小、变形，严重影响肺功能，甚至使肺功能丧失，邻近肺组织及对侧肺呈代偿性肺气肿。如空洞壁的干酪样坏死侵蚀较大血管，

可引起大咯血；空洞突破胸膜可引起气胸或脓气胸。经常排出含菌痰液可引起喉结核。后期由于肺动脉高压而致肺源性心脏病，但不会恶变为肺癌。

64. (66~68题共用题干)患者男性，39岁，3周前发热，全身不适。数天前胸部皮肤曾出现淡红色小斑丘疹，后消失。现持续性高热，心动过缓，食欲缺乏，腹部不适、腹泻。临床检查肝脾肿大；患者反应迟钝，表情淡漠。后因中毒性休克、周围循环衰竭而死亡。尸体检查发现：肝脾肿大，肠系膜淋巴结肿大，弥漫性腹膜炎；回肠末段见有坏死和椭圆形及类圆形溃疡形成，溃疡边缘处肿胀隆起，并见有穿孔。镜下见此处肠壁有坏死，淋巴组织内见有大量吞噬了红细胞的巨噬细胞。该患者正确的诊断是() [单选题] *A 疟疾

B 流行性出血热 C 伤寒(正确答案)

D 阿米巴痢疾 E 急性重型肝炎

65. 患者男性，39岁，3周前发热，全身不适。数天前胸部皮肤曾出现淡红色小斑丘疹，后消失。现持续性高热，心动过缓，食欲缺乏，腹部不适、腹泻。临床检查肝脾肿大；患者反应迟钝，表情淡漠。后因中毒性休克、周围循环衰竭而死亡。尸体检查发现：肝脾肿大，肠系膜淋巴结肿大，弥漫性腹膜炎；回肠末段见有坏死和椭圆形及类圆形溃疡形成，溃疡边缘处肿胀隆起，并见有穿孔。镜下见此处肠壁有坏死，淋巴组织内见有大量吞噬了红细胞的巨噬细胞。该病例按病变自然病程应属于() [单选题] *A 潜伏期

B 髓样肿胀期 C 坏死期

D 溃疡期(正少答案) E 愈合期

66. 患者男性，39岁，3周前发热，全身不适。数天前胸部皮肤曾出现淡红色小斑丘疹，后消失。现持续性高热，心动过缓，食欲缺乏，腹部不适、腹泻。临床检查肝脾肿大；患者反应迟钝，表情淡漠。后因中毒性休克、周围循环衰竭而死亡。尸体检查发现：肝脾肿大，肠系膜淋巴结肿大，弥漫性腹膜炎；回肠末段见有坏死和椭圆形及类圆形溃疡形成，溃疡边缘处肿胀隆起，并见有穿孔。镜下见此处肠壁有

坏死，淋巴组织内见有大量吞噬了红细胞的巨噬细胞。该疾病不可能出现的并发症是（）【单选题】*

A 肠出血、肠穿孔 B 大叶性肺炎正讯答案)

C 支气管肺炎 D 心肌炎

E 肝炎答案解析：伤寒病变特征是全身单核巨噬细胞系统细胞的增生，以回肠末端淋巴组织的病变最为突出。局部可见由吞噬了红细胞、伤寒杆菌等的巨噬细胞形成的伤寒肉芽肿。临床主要表现为持续高热、相对缓脉、脾肿大、皮肤玫瑰疹及中性粒细胞和嗜酸性粒细胞减少等。伤寒肠道病变以回肠下段集合和孤立淋巴小结的病变最为常见和明显。按病变发展过程分四期：①髓样肿胀期：回肠下段淋巴组织略肿胀，隆起于黏膜表面，色灰红，质软。隆起组织表面形似脑的沟回，以集合淋巴小结最为典型。②坏死期：病灶局部肠黏膜坏死。③溃疡期：坏死肠黏膜脱落后形成溃疡，溃疡边缘隆起，底部不平。集合淋巴小结发生的溃疡，其长轴与肠的长轴平行，孤立淋巴小结处的溃疡小而圆，溃疡一般深及黏膜下层，坏死严重者可深达肌层及浆膜层，甚至穿孔。④愈合期：溃疡处肉芽组织增生将其填平，溃疡边缘上皮再生覆盖而告愈合。伤寒患者可有肠出血、肠穿孔、支气管肺炎、心肌炎、肝炎等并发症，但一般不会出现大叶性肺炎。

67. （69~72题共用题干）男性患者，46岁，2个月前阴茎龟头曾出现过溃烂，后愈合，腹股沟淋巴结出现过肿大。最近全身皮肤出现多数红色斑丘疹，且全身浅表淋巴结肿大。取病变处皮肤做病理检查，见局部有淋巴细胞和浆细胞浸润，并见闭塞性小动脉内膜炎及血管周围大量单核细胞、淋巴细胞和浆细胞浸润，病灶内可找到螺旋体。

该患者的正确诊断是（）[单选题]*A 钩端螺旋体病 B 尖锐湿疣

C 梅毒 D 伤寒：正确答案)E 艾滋病

68. 男性患者，46岁，2个月前阴茎龟头曾出现过溃烂，后愈合，腹股沟淋巴结出现过肿大。最近全身皮肤出现多数红色斑丘疹，且全身浅表淋巴结肿大。取病变处皮肤做病理检查，见局部有淋巴细胞和浆细胞浸润，并见闭塞性小动脉内膜炎及血管周围大量单核细胞、淋巴细胞和浆细胞浸润，病灶内可找到螺旋体。对于该病基本病变的描述，不正确的是（）[单选题]*A 浆细胞的恒定出现是本病的特征之一

B 闭塞性动脉内膜炎及血管周围炎 C 病变结构类似结核性肉芽肿

D 病灶内出现凝固性坏死 E 病灶常可钙化愈合(正确答案)

69. 男性患者，46岁，2个月前阴茎龟头部曾出现过溃烂，后愈合，腹股沟淋巴结出现过肿大。最近全身皮肤出现多数红色斑丘疹，且全身浅表淋巴结肿大。取病变处皮肤做病理检查，见局部有淋巴细胞和浆细胞浸润，并见闭塞性小动脉内膜炎及血管周围大量单核细胞、淋巴细胞和浆细胞浸润，病灶内可找到螺旋体。关于该病下列描述错误的是() [单选题] *A 可导致主动脉炎

B 可导致二尖瓣狭窄(正确答案) C 可导致主动脉瘤

D 可导致主动脉瓣关闭不全 E 主动脉瘤破裂是患者猝死的主要原因

70. 男性患者，46岁，2个月前阴茎龟头部曾出现过溃烂，后愈合，腹股沟淋巴结出现过肿大。最近全身皮肤出现多数红色斑丘疹，且全身浅表淋巴结肿大。取病变处皮肤做病理检查，见局部有淋巴细胞和浆细胞浸润，并见闭塞性小动脉内膜炎及血管周围大量单核细胞、淋巴细胞和浆细胞浸润，病灶内可找到螺旋体。该病特征性病变不发生于() [单选题] *A 皮肤

B 周围神经(正确答案) C 肝脏

D 骨 E 睾丸

71. (73-75题共用题干) 女性，46岁，诊断颈部淋巴结非霍奇金淋巴瘤8个月，具体类型不详。现今发现双侧卵巢肿物，包膜完整，切面白色；镜下见卵巢结构未完全破坏，肿瘤细胞排列成条索状、岛状、梁状，细胞中等大，一致，核居中，核仁明显。此时最先应考虑的诊断是() [单选题] *

A 卵巢淋巴瘤 B 白血病(正确答案) C Krukenberg瘤 D 生殖细胞肿瘤

E 性索间质肿瘤 答案解析：卵巢的淋巴瘤可分为原发性和继发性，后者更常见。1/2病例累及双侧卵巢，镜下形态与其他部位的淋巴瘤相似。

72. 女性，46岁，诊断颈部淋巴结非霍奇金淋巴瘤8个月，具体类型不详。现今发现双侧卵巢肿物，包膜完整，切面白色；镜下见卵巢结构未完全破坏，肿瘤细胞排列成条索状、岛状、梁状，细胞中等大，一致，核居中，核仁明显。

卵巢淋巴瘤最常见的类型为() [单选题] *A 弥漫性大B细胞淋巴瘤(正确答案)

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/136150142201011011>