

2023 年-2024 年主治医师之内科主治 303 自我提分 评估(附答案)

单选题（共 40 题）

1、P 波消失，代之以大小不等的小 f 波

- A. 尖端扭转型室速
- B. 心房颤动
- C. 心房扑动
- D. 心室扑动
- E. 心室颤动

【答案】 B

2、男性，20 岁，高热，乏力，肌肉酸痛，伴鼻塞 1 天，同班同学中数人有同样症状，最可能的诊断是

- A. 普通感冒
- B. 流行性感
- C. 急性咽炎
- D. 肺炎
- E. 支气管炎

【答案】 B

3、新型隐球菌性脑膜炎

- A. 脑脊液中细胞数常达数千 $\times 10$
- B. 细胞数多为数百，以淋巴细胞为主
- C. 细胞数可正常

D. 细胞数轻度增加，多为数十 $\times 10$

E. 细胞数 $<500 \times 10$

【答案】 B

4、下述哪些因素不引起小细胞性支气管癌

A. 砷

B. 吸烟

C. 硅沉着病(原称矽肺)

D. 铬与镍蒸气

E. 石棉

【答案】 C

5、男性，30岁，2周前曾去南方出差，2天前突然寒战高烧，体温最高达 39.5°C ，4小时后大汗淋漓，热退。

A. 血常规

B. 血液涂片查疟原虫

C. 骨髓象检查

D. 疟原虫抗体检查

E. 血细菌培养

【答案】 B

6、慢性支气管炎

A. 咳嗽、咳痰伴喘息每年持续3个月，连续2年以上

B. 午后低热、盗汗、咳嗽、咳痰、痰中带血

- C. 寒战，高热，脓痰，白细胞升高，胸部 X 线：肺气囊肿，脓胸，肺脓肿
- D. 寒战，高热，胶冻样痰，胸部 X 线：肺脓肿，叶间裂下坠
- E. 寒战、高热、胸痛、铁锈色痰

【答案】 A

7、血小板生成减少的出血性疾病为

- A. 脾功能亢进
- B. DI
- C. 特发性血小板减少性紫癜
- D. 再生障碍性贫血
- E. 过敏性紫癜

【答案】 D

8、对于传染病诊断的流行病学资料，下列哪项是不正确的

- A. 流行病学资料在诊断中占有重要地位
- B. 考虑传染病诊断时必须取得有关流行病学资料作参考
- C. 是否患过该病表明有无发病的可能
- D. 某些传染病在发病年龄和职业方面有选择性
- E. 是否在流行地区、流行季节表明有无感染该病的可能

【答案】 C

9、女性，35 岁，患急性肾衰竭，已进入多尿期，每日尿量为 4500ml。血压 90 / 60mmHg。化验血 Na^+ 125mmol / L， CO_2CP 16mmol / L，血 K^+ 3.5mmol / L， Scr 467 μmol / L，HCT 55%

- A. 休息，使病人自行恢复

- B. 限制水入量，使血钠得以浓缩
- C. 补充容量，高渗盐水为主
- D. 静脉点滴甘露醇
- E. 血液透析改善低钠血症

【答案】 C

10、男，68岁，持续性上腹部隐痛3个月，多次大便隐血阳性，消瘦，查体：上腹部压痛，未触及包块。下列哪项检查对确诊有帮助

- A. 肝放射性核素扫描
- B. 血清促胃液素测定
- C. 胃镜伴活检
- D. B型超声检查
- E. 胃酸测定

【答案】 C

11、以下哪项不符合静脉溶栓治疗原则

- A. 应尽早用药以起病6小时内为最佳
- B. 尿激酶用药前应先用地塞米松及异丙嗪
- C. 同时应用口服阿司匹林并长期服用
- D. 溶栓剂的剂量应尽量小，以防止不良反应
- E. 严重高血压病人不宜应用

【答案】 B

12、当病史不清时，急性肾衰竭和慢性肾衰竭鉴别诊断最有价值的手段是

- A. 血钙高低
- B. 恶心呕吐的程度
- C. 血色素高低
- D. 夜尿是否增多
- E. B超肾大小

【答案】 C

13、男性，60岁，高血压病10年。1个月前开始乏力、食欲缺乏，伴恶心、呕吐。查体血压160/100mmHg，Hb75g/L，血肌酐600 μ mol/L

- A. 氢氯噻嗪
- B. 钙拮抗药
- C. ACEI
- D. 安体舒通
- E. A-II受体阻断药

【答案】 B

14、对于干燥综合征诊断较特异的自身抗体为

- A. 抗Jo-1抗体
- B. 抗SSB抗体
- C. 抗Sc1-70抗体
- D. p-ANCA
- E. c-ANCA

【答案】 B

15、贫血按病因和发病机制分类为

- A. 红细胞再生障碍、红细胞溶血破坏
- B. 红细胞生成减少、红细胞破坏过多、失血
- C. 红细胞内在缺陷、红细胞破坏过多
- D. 红细胞生成减少、红细胞破坏过多
- E. 造血物质缺乏、造血功能障碍

【答案】 B

16、患者，女，15岁，甲状腺肿大，甲状腺功能检查正常，应如何治疗

- A. 无需治疗
- B. 服用甲状腺素片
- C. 放射性碘治疗
- D. 抗甲状腺药物
- E. 甲状腺次全切除

【答案】 A

17、肠结核患者出现腹痛最常见的部位是

- A. 脐周
- B. 右上腹
- C. 左上腹
- D. 右下腹
- E. 左下腹

【答案】 D

18、高血压危象

- A. 血压急剧升高，短时间内出现氮质血症
- B. 血压急剧升高，剧烈头痛，呕吐，大汗
- C. 血压波动明显伴头晕心悸
- D. 持续性高血压，蛋白尿持续阳性，眼底动脉痉挛
- E. 反复蛋白尿，后期出现轻、中度高血压

【答案】 A

19、下列脑神经中属于混合性神经的是

- A. 三叉神经
- B. 滑车神经
- C. 嗅神经
- D. 视神经
- E. 展神经

【答案】 A

20、女性，56岁，发热咳嗽20天，胸片发现右上肺阴影，其内可见空洞，痰涂片发现抗酸杆菌(0~2个)，有糖尿病史10年。查血糖：17.5mmol/L

- A. 抗结核药物异烟肼、利福平、吡嗪酰胺和乙胺丁醇的使用，会影响糖尿病的治疗，应该先控制血糖，再抗结核治疗
- B. 治疗该类患者的药物与单纯肺结核病的药物和治疗时间完全一样
- C. 肺结核会影响糖尿病，只要结核控制了，糖尿病就会自然控制
- D. 治疗该类患者的药物与单纯肺结核病的药物一样，疗程要延长，一般为1年
- E. 药物相同，治疗时间延长到2年

【答案】 D

21、女性，30岁，半年来间断性腹泻每日5~6次，量中等，黏液血便腥臭味，查生命体征平稳，心肺未见异常，肝脾未触及，腹软右下腹压痛

- A. 血生化检查
- B. 便原虫检查
- C. 肠镜
- D. 便常规
- E. 腹部B超

【答案】 B

22、过敏性紫癜糖皮质激素治疗的疗程一般不超过

- A. 1个月
- B. 7天
- C. 2个月
- D. 3个月
- E. 14天

【答案】 A

23、急性菌痢的基本病变为

- A. 全身小血管内皮细胞肿胀渗出，外周水肿
- B. 弥漫性纤维蛋白渗出性炎症
- C. 肠系膜淋巴结肿大
- D. 结肠水肿增厚，溃疡形成
- E. 结肠溃疡形成可伴穿孔

【答案】 B

24、高温环境下，气温超过 35℃时，人体主要通过哪种方式进行散热

- A. 辐射
- B. 蒸发
- C. 对流
- D. 传导
- E. 呼出

【答案】 B

25、急性膀胱炎

- A. 有尿急、尿频、尿痛的症状，多次检查无真性菌尿
- B. 糖尿病患者病程已有十多年，突发寒战，继之高热，伴尿急、尿痛，腰痛
- C. 静脉肾盂造影显示有肾盂狭窄变形
- D. 新婚女性尿频尿急尿痛，无发热
- E. 有尿急、尿频、尿痛的症状，尿培养分枝杆菌阳性

【答案】 D

26、患者，女，26岁，反复口腔溃疡、颜面部皮疹3年，化验检查外周血白细胞及血小板减少，尿蛋白(+)，ANA1:640，C

- A. 重叠综合征
- B. 白塞病
- C. 混合结缔组织病
- D. 系统性红斑狼疮

E. 复发性口腔溃疡

【答案】 D

27、男，66岁。急性下壁心肌梗死第2天，心电监测示二度I型房室传导阻滞，心室率50次/分，血压110/70mmHg，应选用上述哪种治疗措施

A. 先观察若病情恶化再治疗

B. 直流电复律

C. 肾上腺素

D. 临时心脏起搏器植入

E. 毛花苷C

【答案】 A

28、下列哪项肺功能检查对阻塞性肺气肿的诊断最有价值

A. V-V曲线

B. 肺活量

C. 动脉血氧分压

D. 残气量及残气量/肺总量(%)

E. 最大每分通气量(MVV)

【答案】 D

29、鉴别良性与恶性溃疡最重要的方法是

A. 胃黏膜组织病理学检查

B. 便隐血

C. 胃液分析

D. 溃疡大小

E. Hp 检查

【答案】 A

30、男性，14岁，暑假中暴饮暴食，尤其多饮甜饮料，近期感口渴、多尿，查空腹血糖7.4mmol/L，母亲患糖尿病。查体：BMI27kg/m

A. 饮食控制、体育锻炼

B. 磺脲类药物

C. 胰岛素治疗

D. 双胍类药物

E. α -糖苷酶抑制药

【答案】 A

31、患者男性，75岁，突发意识丧失

A. β 受体阻滞剂

B. 冠状动脉搭桥手术

C. PTCA 支架术

D. 硝酸甘油

E. 埋藏式心脏复律除颤器

【答案】 D

32、男性，48岁，患尿毒症行维持性腹膜透析5年，行标准(2APE)方案，每天换腹透液4次，其中1. 5%2000ml×3次，4. 25%2000ml×1次，无明显不适症状且一直上班工作。近2天患者诉腹痛伴恶心，且放出腹透液浑浊

A. 腹膜功能衰竭

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/136155104112011001>