

2024 吉林省九台区《执业药师之西药学专业二》考试必刷 200 题题库大全有答案

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 在体外无抗凝作用，在体内有抗凝血作用的是

- A: 华法林
- B: 尿激酶
- C: 噻氯匹定
- D: 肝素

答案：A

2. 肝功能不全者应禁用氯化铵，是因为氯化铵()

- A: 可增加血氨浓度，诱发肝性昏迷
- B: 可降低门脉压力，诱发出血
- C: 可升高门脉压力，诱发出血
- D: 可降低血氨浓度，诱发肝性昏迷

答案：A

3. 关于利伐沙班注意事项的描述，不正确的是()

- A: 如伤口已止血，首次用药应于术后立即给药
- B: 对于不同的手术选择的疗程不同
- C: 用药过量可导致出血并发症
- D: 用药期间需定期测定血红蛋白

答案：A

4. 克林霉素与红霉素合用()

- A: 不良反应叠加
- B: 后者血药浓度下降，药效降低
- C: 药理作用拮抗
- D: 后者血药浓度升高，不良反应增加

答案：C

5. 可见头晕、耳鸣、视力减退、出汗等不良反应的是

- A: 氨基己酸
- B: 卡巴克络
- C: 蛇毒血凝酶
- D: 甲萘氢醌

答案：B

6. 属于二氢叶酸还原酶抑制剂的抗肿瘤药物是

- A: 甲氨蝶呤
- B: 阿糖胞苷
- C: 顺铂
- D: 环磷酰胺

答案：A

7. (2016 年真题) 治疗绦虫病的首选药品是

- A: 伯氨喹
- B: 吡喹酮
- C: 伊维菌素
- D: 吡喹酮

答案：D

8. 鲑降钙素对骨质疏松症进行治疗期间，为防继发性甲状旁腺功能亢进需要补充

- A: 阿仑膦酸钠
- B: 铁剂
- C: 维生素 D
- D: 钙剂

答案：D

9. 蛔虫病和鞭虫病治疗首选

- A: 三苯双脒
- B: 吡喹酮
- C: 甲苯咪唑
- D: 噻嘧啶

答案：C

10. 巨细胞病毒可致

- A: 急性出血性结膜炎
- B: 角膜炎
- C: 巨细胞病毒性视网膜炎
- D: 流行性结膜炎

答案：C

11. 关于铂类药物的描述，下列说法错误的是()

- A: 细胞增殖周期非特异性抑制剂
- B: 作用机制是破坏 DNA 的结构和功能
- C: 广谱抗瘤药物
- D: 顺铂是结直肠癌的首选药之一

答案：D

12. 作用机制是抗代谢的是

- A: 紫杉醇
- B: 巯嘌呤
- C: 吉非替尼
- D: 枸橼酸他莫昔芬

答案：B

13. 静脉滴注给药用于真菌性肺炎的药物是

- A: 特比萘芬
- B: 灰黄霉素
- C: 酮康唑
- D: 两性霉素 B

答案：D

14. （2019 年真题）选择性沉积在牙齿和骨骼中，不可用于 8 岁以下患儿的药物是（）

- A: 氟喹诺酮类
- B: 四环素类
- C: 大环内酯类
- D: 氨基糖苷类

答案：B

15. 下述药物中不属于消毒防腐药的是

- A: 硼酸
- B: 戊二醛
- C: 氨茶碱
- D: 过氧乙酸

答案：C

16. 袢利尿药发挥利尿的作用点是

- A: 碳酸酐酶
- B: Na^+-Cl^- 共转运子
- C: 磷酸二酯酶
- D: $\text{Na}^+-\text{K}^+-2\text{Cl}^-$ 同向转运子

答案：D

17. 强心苷的作用机制不包括()

- A: 使细胞内的 Na^+
- B: 使细胞内的 Ca^{2+}
- C: 使细胞内的 Na^+
- D: 抑制 Na^+

答案：C

18. 下列关于抗 M 胆碱药作用特点的描述中，错误的是

- A: 使用眼膏剂可减少药物全身吸收
- B: 不同药物作用效能基本一致
- C: 可散大瞳孔，麻痹睫状肌
- D: 作用时间短

答案：B

19. 甘草酸二铵可作为保护肝细胞结构和功能的药物，其属于

- A: 促进代谢类药物及维生素
- B: 必需磷脂类
- C: 抗炎类药
- D: 解毒类药

答案：C

20. 可引起出血性膀胱炎的抗肿瘤药物是

- A: 多柔比星
- B: 环磷酰胺
- C: 氟尿嘧啶
- D: 甲氨蝶呤

答案：B

21. 亚胺培南西司他丁一般不宜用于

- A: 对其他药物耐药的革兰阴性杆菌感染
- B: 严重需氧菌与厌氧菌混合性感染
- C: 病原菌未查明严重感染
- D: 社区获得性感染

答案：D

22. 关于黄体酮的叙述，下列说法正确的是

- A: 是短效类口服避孕药的组成成分
- B: 是天然孕激素
- C: 具有雄激素作用
- D: 是长效类口服避孕药的组成成分

答案：B

23. (2019 年真题) 患者，女，13 岁，有哮喘病史，半年前月经初潮，周期 28 天经期持续 4-5 天，月经前两天疼痛明显，影响正常的学习和活动，诊断为原发性痛经，适宜该患者使用的缓解痛经的药物是 ()

- A: 吲哚美辛栓

B: 布洛芬片

C: 对乙酰氨基酚片

D: 塞来昔布胶囊

答案: C

24. 属于第一代喹诺酮类药物的是

A: 吡哌酸

B: 诺氟沙星

C: 萘啶酸

D: 莫西沙星

答案: C

25. 与唑来膦酸合用可使颌骨坏死的发生率升高的药物是

A: 高钙食品

B: 沙利度胺

C: 萘普生

D: 抗血管生成药

答案: D

26. 骨折患者、低磷血症患者不宜服用

A: 三硅酸镁

B: 氢氧化镁

C: 氢氧化铝

D: 碳酸钙

答案: C

27. 抗血小板药西洛他唑属于

A: 整合素受体阻断剂

B: 磷酸二酯酶抑制剂

C: 二磷酸腺苷 P2Y₁₂ 受体阻断剂

D: 维生素 K 拮抗剂

答案：B

28. 容易引起视神经炎的抗结核药物是

A: 异烟肼

B: 链霉素

C: 利福平

D: 乙胺丁醇

答案：D

29. 高血压合并脑血管功能不全不宜选用

A: 胍乙啶

B: 肼屈嗪

C: 普萘洛尔

D: 氢氯噻嗪

答案：A

30. 糖尿病合并轻度肾功能不全患者宜选用

A: 普通胰岛素

B: 低精蛋白锌胰岛素

C: 二甲双胍

D: 格列喹酮

答案：D

31. (2020 年真题) 关于非那雄胺作用特点的说法，错误的是

A: 易引起直立性低血压

B: 能降低血清前列腺特异性抗原 (PSA) 水平

C: 可抑制酮在前列腺内转化为双氢睾酮

D: 小剂量可促进头发生长，用于治疗源性脱发

答案：A

32. 成人应用 0.1% 溶液，儿童应用 0.05% 溶液，这种药物是

A: 麻黄碱滴鼻液

B: 羟甲唑啉滴鼻液

C: 酚甘油滴耳液

D: 赛洛唑啉滴鼻液

答案：D

33. 长期大量使用林旦后可导致下列哪种不良反应 ()

A: 中枢神经系统毒性

B: 肝脏损害

C: 眼部水肿

D: 白细胞减少

答案：A

34. 有肾功能不全史的患者解热镇痛应慎用布洛芬，其主要原因是用药后可能发生

A: 过敏反应

B: 尿潴留和水肿

C: 重度肝损伤

D: 急性肾衰竭

答案：B

35. 治疗弥散性血管内凝血 (DIC) 宜选用 ()

- A: 阿司匹林
- B: 叶酸
- C: 达比加群酯
- D: 肝素

答案：D

36. 关于氨基糖苷类和第三代头孢菌素类联合应用，错误的是

- A: 治疗急性感染通常疗程不宜超过 7~14 日
- B: 两类药不能混入同一容器内
- C: 可在身体同一部位给药
- D: 联合应用治疗败血症、肺炎等革兰阴性杆菌引起的严重感染

答案：C

37. ACTH 的血浆浓度波动大，变化也很快，这是因为它是以脉冲方式从垂体中释放出来，在血液循环中的半衰期是

- A: 8 小时
- B: 10~25 分钟
- C: 7~12 分钟
- D: 4 小时

答案：C

38. 属于二肽基肽酶-4（DPP-4）抑制剂的是

- A: 罗格列酮
- B: 沙格列汀
- C: 格列美脲
- D: 瑞格列奈

答案：B

39. 属于非麻醉性镇痛药的是

- A: 布洛芬
- B: 吗啡
- C: 可待因
- D: 美沙酮

答案：A

40. 人体主要的热能来源是

- A: 维生素
- B: 果糖
- C: 氨基酸
- D: 葡萄糖

答案：D

41. 抗瘤谱较广，恶性淋巴瘤疗效显著，还可治疗自身免疫性疾病的药物是()

- A: 塞替派
- B: 丝裂霉素
- C: 奥沙利铂
- D: 环磷酰胺

答案：D

42. 患者，女，49 岁，间断上腹部饱胀、恶心 1 年。患者 1 年前无明显诱因出现恶心、上腹饱胀感，自行服用胃药（具体不详）治疗后症状好转。2 个月前患者上述症状再次发作，查体：上腹部轻微压痛，无反跳痛。胃镜、腹部 B 超检查未见明显异常。诊断：功能性消化不良。

医嘱：枸橼酸莫沙必利片，5mg，口服，3 次/日。

A: 功能性消化不良

- B: 糖尿病胃轻瘫
- C: 化疗所致的恶心、呕吐
- D: 胃食管反流病

答案：C

43. 用药时需关注肺毒性的药物是

- A: 紫杉醇
- B: 博来霉素
- C: 长春新碱
- D: 柔红霉素

答案：B

44. 氨力农常见的不良反应是

- A: 视物模糊
- B: 严重低血压
- C: 色觉异常
- D: 血小板计数减少

答案：D

45. 同时具有短效和长效双时相)作用的胰岛素/胰岛素类似物是()

- A: 预混胰岛素注射液
- B: 甘精胰岛素注射液
- C: 普通胰岛素注射液
- D: 精蛋白锌胰岛素注射液

答案：A

46. 防治血栓性疾病如心肌梗死、脑梗死的药物是()

- A: 香豆素类

- B: 维生素 K
- C: 非格司亭
- D: 氨甲环酸

答案：A

47. 属于血管紧张素 II 受体阻断剂的药品是()。

- A: 哌唑嗪
- B: 依那普利
- C: 替米沙坦
- D: 坦洛新(坦索罗辛)

答案：C

48. 治疗维生素 D 中毒导致的变应性骨炎可选用

- A: 鲑降钙素
- B: 奥利司他
- C: 阿仑膦酸钠
- D: 阿法骨化醇

答案：A

49. 可与硝酸酯类药物发生相互作用的是

- A: 呋塞米
- B: 丙酸睾酮
- C: 伐地那非
- D: 坎利酮

答案：C

50. 阻止胞苷酸转化为脱氧胞苷酸

- A: 羟基脲

B: 甲氨蝶呤

C: 氟尿嘧啶

D: 阿糖胞苷

答案：A

51. 重症甲状腺功能亢进症病情未控制者不宜使用

A: 大剂量碘制剂

B: 甲状腺素

C: None

D: 小剂量碘制剂

答案：C

52. 与硝酸酯类药物联合应用发生严重低血压的药物是

A: 坎利酮

B: 西地那非

C: 丙酸睾酮

D: 去甲肾上腺素

答案：B

53. 属于白三烯受体阻断剂的是

A: 乙酰半胱氨酸

B: 孟鲁司特

C: 右美沙芬

D: 奥关拉唑

答案：B

54. 治疗强心苷中毒所引起的窦性心动过缓和轻度房室传导阻滞应选用

A: 维拉帕米

B: 去甲肾上腺素

C: 阿托品

D: 麻黄碱

答案: C

55. 与奥美拉唑-替硝唑合用的三联疗法治疗胃溃疡

A: 万古霉素

B: 红霉素

C: 克拉霉素

D: 克林霉素

答案: C

56. (2019 年真题) β -内酰胺酶抑制剂的抑酶活性由强到弱的顺序是
()

A: 舒巴坦>克拉维酸>他唑巴坦

B: 舒巴坦>他唑巴坦>克拉维酸

C: 他唑巴坦>舒巴坦>克拉维酸

D: 他唑巴坦>克拉维酸>舒巴坦

答案: D

57. 促进钙吸收()

A: 阿仑膦酸钠

B: 阿法骨化醇

C: 依降钙素

D: 葡萄糖酸钙

答案: B

58. 降压不引起重要器官血流量减少，不影响脂和糖代谢的药物是

- A: 可乐定
- B: 拉贝洛尔
- C: 普萘洛尔
- D: 依那普利

答案: D

59. 属于白三烯受体阻断剂的平喘药是

- A: 多索茶碱
- B: 沙美特罗
- C: 布地奈德
- D: 孟鲁司特

答案: D

60. 以下食物与华法林钠不存在相互作用的是

- A: 菠菜叶
- B: 洋葱
- C: 脱皮黄瓜
- D: 红叶苋菜

答案: C

61. 选择性直接作用于 M 胆碱受体，引起缩瞳，眼压下降，并有调节痉挛等作用的是

- A: 碳酸酐酶抑制剂
- B: 前列腺素衍生物
- C: 拟胆碱药
- D: α_2 受体激动剂

答案: C

62. 属于碳酸酐酶抑制剂的药物是

- A: 拉坦前列素
- B: 阿托品
- C: 乙酰唑胺
- D: 奥布卡因

答案：C

63. 可用于吗啡中毒解救的药物是

- A: 苯甲酸钠咖啡因
- B: 纳洛酮
- C: 阿托品
- D: 氟马西尼

答案：B

64. 与肝素相比，华法林的作用特点不包括

- A: 起效快
- B: 作用持久
- C: 口服有效，应用方便
- D: 价格便宜

答案：A

65. 羟基脲选择性作用于肿瘤细胞

- A: S 期
- B: G1 期
- C: G0 期
- D: M 期

答案：A

66. 可用于肝硬化腹水以及加速某些毒物排泄的药物是

- A: 氢氯噻嗪
- B: 乙酰唑胺
- C: 托拉塞米
- D: 氨苯蝶啶

答案：C

67. 用于治疗低磷血症的药物是()

- A: 碳酸钙
- B: 二磷酸果糖
- C: 葡萄糖
- D: 三磷酸腺苷

答案：B

68. 下列药物中，属于非二氢吡啶类钙通道阻滞药的是()

- A: 尼莫地平
- B: 硝苯地平
- C: 维拉帕米
- D: 氨氯地平

答案：C

69. 常规剂量应用多潘立酮不易导致的不良反应是

- A: 锥体外系反应
- B: 室性心律失常
- C: 男子乳房女性化
- D: 女性月经不调

答案：A

70. 通过与敏感需氧革兰阴性菌细胞膜上 PBP3 的高度亲合而发挥杀菌作用，仅对需氧革兰阴性菌包括铜绿假单胞菌具有良好抗菌活性，对革兰阳性菌和厌氧菌作用差的是

- A: 头孢噻肟
- B: 头孢他啶
- C: 头孢美唑
- D: 氨曲南

答案：D

71. 胰酶与下述哪种环境中药效最好

- A: 微酸性
- B: 酸性
- C: 强碱性
- D: 微碱性

答案：D

72. 夜盲症患者应选用的维生素是

- A: 维生素 D
- B: 维生素 B
- C: 维生素 A
- D: 维生素 B

答案：C

73. 关于地西泮的作用特点，叙述错误的是

- A: 可增强其他中枢抑制药的作用
- B: 小于镇静剂量时即有抗焦虑作用
- C: 剂量加大可引起麻醉
- D: 有良好的抗癫痫作用

答案：C

74. 黏液性水肿选用

- A: 丙硫氧嘧啶
- B: 甲状腺素
- C: 血管神经性水肿
- D: 粒细胞下降

答案：B

75. 痛风首选

- A: 非药物治疗
- B: 丙磺舒
- C: 外源性拉布立酶
- D: 别嘌醇

答案：A

76. 属于长效糖皮质激素的是

- A: 甲羟孕酮
- B: 泼尼松龙
- C: 地塞米松
- D: 尼尔雌醇

答案：C

77. 与普通肝素相比，低分子肝素的抗凝作用特点是

- A: 对凝血因子 IIa、VIIa 灭活作用强，对 Xa 作用弱
- B: 对凝血因子 Xa、XIIa 灭活作用强，对 IIa 作用弱
- C: 对凝血因子 Xa、XIa 灭活作用强，对 IIa 作用弱
- D: 对凝血因子 IIa、IXa 灭活作用强，对 Xa 作用弱

答案：B

78. 抑制细菌叶酸合成的抗菌药物是

- A: 磺胺甲噁唑甲氧苄啶
- B: 利福喷丁
- C: 头孢米诺
- D: 头孢吡肟

答案：A

79. 连续使用应间隔 4 小时以上()

- A: 麻黄碱
- B: 羟甲唑啉
- C: 赛洛唑啉
- D: 酚甘油滴耳液

答案：B

80. 噻嗪类利尿药略增加 HCO_3^- 的排泄，是因为其可以抑制

- A: $\text{Na}^+-\text{K}^+-2\text{Cl}^-$ 同向转运子
- B: 磷酸二酯酶
- C: Na^+-Cl^- 共转运子
- D: 碳酸酐酶

答案：D

81. (2018 年真题) 关于氨基糖苷类药物作用特点的说法, 错误的是 ()

- A: 氨基糖苷类药物是浓度依赖型速效杀菌剂
- B: 氨基糖苷类药物对多数需氧的革兰阴性杆菌具有很强的杀菌作用
- C: 氨基糖苷类药物常见的不良反应为耳毒性和肾毒性

D: 氨基糖苷类药物主要抑制细菌蛋白质合成,影响细菌细胞壁黏肽的合成

答案: D

82. (2015 年真题) 降糖作用迅速, 被称为“餐时血糖调节剂”的降糖药是 ()。

A: 二甲双胍

B: 瑞格列奈

C: 格列美脲

D: 普萘洛尔

答案: B

83. (2018 年真题) 属于贝丁酸类的调节血脂药是 ()

A: 辛伐他汀

B: 非诺贝特

C: 依折麦布

D: 烟酸

答案: B

84. (2017 年真题) 具有磺胺类药物结构, 作用于近曲小管的利尿药是 ()

A: 螺内酯

B: 氢氯噻嗪

C: 乙酰唑胺

D: 呋达帕胺

答案: C

85. 以下哪项不属于硝酸酯类药物的使用禁忌证 ()

- A: 急性前壁心肌梗死
- B: 收缩压<90mmHg 的严重低血压
- C: 重度主动脉瓣和二尖瓣狭窄
- D: 梗阻性肥厚型心肌病

答案：A

86. 患者，女，49 岁，间断上腹部饱胀、恶心 1 年。患者 1 年前无明显诱因出现恶心、上腹饱胀感，自行服用胃药(具体不详)治疗后症状好转。2 个月前患者上述症状再次发作，查体：上腹部轻微压痛，无反跳痛。胃镜、腹部 B 超检查未见明显异常。诊断：功能性消化不良。医嘱：枸橼酸莫沙必利片，5mg，口服，3 次 / 日。

- A: 可作为术后预防呕吐的常规用药
- B: 对泌乳素的分泌无影响
- C: 无心脏不良反应
- D: 对化疗所致的呕吐有效

答案：B

87. (2018 年真题) 普通感冒患者, 有单纯性咳嗽症状, 宜选用的药物是 ()

- A: 右美沙芬片
- B: 茶碱缓释片
- C: 对乙酰氨基酚滴剂
- D: 氯苯那敏片

答案：A

88. 下列关于氟尿嘧啶的说法，错误的是 ()

- A: 与四氢叶酸合用时，可降低其毒性，提高其疗效

专业《执业药师之西药学专业二》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

B: 应当先给予氟尿嘧啶，再用四氢叶酸

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/136201153103011030>