

2022 年基层预防接种工作全员培训试卷和答案（6）

共 3 种题型，共 150 题

一、单选题(共 50 题)

1. 发现脊灰野病毒阳性病例，需要每隔天采集 1 次粪便标本进行检测，直到连续次粪便标本检测结果阴性为止。（ ）

A: 7; 3

B: 7; 2

C: 14; 3

D: 14; 2

【答案】: A

2. 对冷链设备温度监测频率要求是每天应至少____次，间隔不少于____小时。（ ）

A: 1, 6

B: 2, 6

C: 1, 8

D: 1, 5

【答案】: B

3. 麻疹疑似病例调查与录入专病系统要求时限。（ ）

A: 接到疫情报告后 12 小时内完成调查，完成调查后 24 小时内录入专病系统。

B: 接到疫情报告后 24 小时内完成调查，完成调查后 24 小时内录入

专病系统。

C: 接到疫情报告后 24 小时内完成调查, 完成调查后 48 小时内录入专病系统。

D: 接到疫情报告后 48 小时内完成调查, 完成调查后 48 小时内录入专病系统。

【答案】: D

4. 下列冷链使用方法表达正确的是 ()

A: 冰箱疫苗应摆放整齐, 疫苗与疫苗间不留空隙

B: 疫苗较多时, 可在冰箱门架上内摆放疫苗

C: 冰箱应由专人负责管理、每天记录冰箱内的温度及使用情况

D: 集体单位接种时, 可一次性将疫苗拿出冷藏箱, 方便取用

【答案】: C

5. 某儿童 2014 年 1 月 2 日出生, 1 月 3 日接种首剂乙肝疫苗, 第二剂乙肝疫苗接种时间错误的是 ()。

A: 2014 年 1 月 30 日

B: 2014 年 2 月 2 日

C: 2014 年 2 月 3 日

D: 2014 年 2 月 3 日~3 月 2 日期间

【答案】: A

6. 预防接种过程中破损的疫苗需要在山东省预防接种信息管理系统-门诊(金苗客户端)生物制品进销存管理中进行_____操作。()

A: 制品耗苗

- B: 系统自动耗苗
- C: 制品退苗
- D: 制品出库

【答案】: A

7. 关于肾综合征出血热低血压期血象变化情况的描述哪项是错误的?

()

- A: 出现异型淋巴细胞
- B: 白细胞总数增高
- C: 中性粒细胞增多
- D: 红细胞数减少

【答案】: B

8. 根据《山东省病毒性肝炎行动计划》要求, 儿童甲肝和乙肝疫苗的全程接种率应达到_____以上。()

- A: 80%
- B: 85%
- C: 90%
- D: 95%

【答案】: D

9. 是最大的外周免疫器官。

- A: 胸腺
- B: 骨髓
- C: 脾脏

D: 淋巴结

【答案】: C

10. 关于手足口病，以下说法错误的是：（ ）

A: 疫苗目前只针对 EV71 病毒

B: EV71 病毒和 CA16 病毒是主要病原体

C: A16 病毒是主要病原体 C 手足口病暂时还不是法定传染病

D: 疫苗对重症手足口病的保护率达到 90%

E: V71 病毒 BEV71 病毒和 CA16 病毒是主要病原体 C 手足口病暂时还不是法定传染病 D 疫苗对重症手足口病的保护率达到 90%

【答案】: C

11. 预防接种异常反应鉴定专家组为人以上的单数？（ ）

A: 3

B: 5

C: 7

D: 9

【答案】: B

12. 在麻疹专病系统中，指标分析模块中以年为单位进行监测指标统计分析时，按“终审日期”“发病日期”“报告卡生成日期”进行的年度指标统计分别在某一时间完成（公历）？（ ）

A: 当年最后 1 日 24 时，次年 1 月 14 日 24 时，次年 1 月 31 日 24 时。

B: 当年最后 1 日 24 时，次年 1 月 31 日 24 时，次年 1 月 31 日 24 时。

C: 次年 1 月 14 日 24 时，当年最后 1 日 24 时，次年 1 月 31 日 24 时。

D: 次年 1 月 31 日 24 时, 次年 1 月 31 日 24 时, 次年 1 月 31 日 24 时。

【答案】: B

13. 我国规定, 麻疹疫苗免疫的起始年(月)龄是:。()

A: 8 月龄

B: 1 岁

C: 1.5 岁

D: 7 岁

【答案】: A

14. 与淋巴细胞上的受体或抗原特异性结合的抗原部分称为。

A: 核心区

B: 抗原决定簇

C: 开放区

D: 特异区

【答案】: B

15. 灭活疫苗超过_____时间未用完, 应将疫苗废弃。()

A: 0.5 小时

B: 1 小时

C: 1.5 小时

D: 2 小时

【答案】: B

16. 下列哪种情况接种人员不能给予处理或指导? ()

- A: 较为轻微的全身性一般反应
- B: 接种局部的一般反应
- C: 留观期间的急性严重过敏反应
- D: 除急性严重过敏反应外的其他较为严重的 A

【答案】: D

17. 关于风疹病毒的描述哪一个不正确 ()

- A: 风疹病毒是一种多形性 RNA 病毒
- B: 风疹病毒属于披膜病毒科风疹病毒属
- C: 风疹病毒是单链, 正链 RNA 病毒
- D: 风疹病毒易感者感染后全部是显性感染

【答案】: D

18. AFP 标本检测结果“L20B 细胞阳性分离物”表示: ()

- A: 检测到了 L20B 细胞
- B: 细胞 B 检测到了脊髓灰质炎疫苗株病毒
- C: 检测到了脊髓灰质炎野病毒
- D: 检测到了脊髓灰质炎病毒

【答案】: D

19. 公民接种非免疫规划疫苗由_____承担费用。()

- A: 政府
- B: 受种者个人
- C: 社会
- D: 受种者或者其监护人

【答案】: D

20. 临时管理儿童接种疫苗后，按照疫苗（剂次）数“ ”进行实种统计报告。（ ）

A: 应种+0，实种+1

B: 应种+1，实种+0

C: 应种+1，实种+1

D: 应种+0，实种+0

【答案】: C

21. 水痘皮疹的主要特点是？（ ）

A: 向心性

B: 离心性

C: 弥漫性

D: 散发性

【答案】: A

22. 关于常用疫苗的禁忌证，哪种是正确的：（ ）

A: 肛周脓肿

B: 青霉素过敏

C: 既往接种同一疫苗或含有相同成分的疫苗后出现严重过敏反应

D: 疾病的恢复期

【答案】: C

23. 扩大国家免疫规划范围，将甲肝、流脑等____种可以通过接种疫苗有效预防的传染病纳入国家免疫规划。（ ）

A: 13

B: 14

C: 15

D: 16

【答案】: C

24. 麻疹和风疹鉴别诊断说法错误的是。()

A: 潜伏期麻疹 7-21 天, 风疹 14-21 天

B: 麻疹有柯氏斑, 风疹没有

C: 麻疹有色素沉着, 风疹没有

D: 麻疹有杨梅舌, 风疹没有

【答案】: D

25. 脑膜炎奈瑟菌镜下形态是。()

A: 革兰氏阴性双球菌

B: 革兰氏阳性双球菌

C: 革兰氏阴性球杆菌

D: 革兰氏阳性棒状杆菌

【答案】: A

26. 接种单位接种免疫规划疫苗是否可以收取相关费用? ()

A: 可以收取疫苗成本费

B: 可以收注射费

C: 不得收取任何费用

D: 不得收取疫苗成本费

【答案】: C

27. AFP 病例完成便标本采样后，应该在几天内将标本送达省级疾控机构？（ ）

A: 2 天

B: 7 天

C: 14 天

D: 28 天

【答案】: B

28. 同一产科接种室，同一接种人员，在同一时间段，为同一人群接种卡介苗后，发现受种者的卡疤有的很小，有的很大。最可能的原因是：（ ）

A: 接种前 BCG 未充分摇匀

B: 接种技术差，皮内注射时深时浅

C: 疫苗不合格

D: BCG 保存温度不当

【答案】: A

29. 市、县级疾控机构至少多长时间进行一次 AEFI 分析报告？（ ）

A: 每月

B: 每季度

C: 每半年

D: 每年

【答案】: B

30. AFP 病例应该采集_____份大便标本用于病毒分离，各标本的采集时间至少间隔_____小时。()

A: 2; 24

B: 2; 48

C: 3; 24

D: 3; 48

【答案】: A

31. 级以上人民政府卫生主管部门可以根据传染病监测和预警信息发布接种非免疫规划疫苗的建议信息，其他任何单位和个人不得发布。()

A: 国家

B: 省

C: 市

D: 县

【答案】: B

32. 麻疹病人应隔离到出疹后 5 天，有并发症者应延长至出疹后天。()

A: 6

B: 8

C: 10

D: 21

【答案】: C

33. 白喉棒状杆菌对以下哪类药物不敏感？（ ）

A: 红霉素

B: 青霉素

C: 磺胺类药物

D: 阿奇霉素

【答案】: C

34. 冷冻室结霜检查周期是：（ ）

A: 每天

B: 每周

C: 每月

D: 每季度

【答案】: B

35. 目前我省未在成人中推广使用甲肝疫苗的主要原因是。（ ）

A: 目前尚无可用于成人中接种的甲肝疫苗。

B: 成人感染甲肝病毒后症状较轻。

C: 目前我省大部分成人已通过自然感染获得甲肝抗体。

D: 成人有良好的卫生习惯，不易感染甲肝病毒。

【答案】: C

36. 山东省预防接种客户端在疫苗结算时，如果出现结算的疫苗和实际不符，需要_____。（ ）

A: 当天处理

B: 48 小时内处理

C: 72 小时内处理

D: 无需处理

【答案】: A

37. I 型变态反应又称为。

A: 细胞毒性反应

B: 速发性过敏反应

C: 免疫复合物反应

D: 迟发性变态反应

【答案】: B

38. 下列对免疫程序描述正确的是: ()

A: 免疫起始月龄越早越好

B: 接种剂量过大, 会使机体在相当长时间内处于免疫抑制状态, 但不影响疫苗免疫效果

C: 如果正常免疫程序被中断, 应重新开始接种或增加接种剂次

D: 流脑疫苗和麻腮风疫苗可以同时在不同部位接种

【答案】: D

39. 婴儿猝死综合征多见于 1 月龄至 1 岁的婴儿, 尤以月龄常见, 其中 95% 死于 6 月龄前。()

A: 1-3

B: 2-4

C: 3-5

D: 4-6

【答案】: B

40. AFP 病例完成便标本采样后, 应该在天内将标本送达省级疾控机构? ()

A: 2 天

B: 7 天

C: 14 天

D: 28 天

【答案】: B

41. 中国免疫规划信息管理系统中常规接种率报表管理市级上报时间是 ()

A: 每月 5 号前

B: 每月 10 号前

C: 每月 15 号前

D: 每月 20 号前

【答案】: C

42. 狂犬病暴露中, 完好的皮肤被舔, 属于哪一级的暴露 ():

A: 不属于狂犬病暴露

B: I 级暴露

C: II 级暴露

D: III 级暴露

【答案】: B

43. 目前使用的脊髓灰质炎减毒活疫苗 (液体) 规格是_____。()

- A: 1 人份/支
- B: 4 人份/支
- C: 5 人份/支
- D: 10 人份/支

【答案】: D

44. 乙肝病毒不通过以下哪种途径传播? ()

- A: 输血传播
- B: 不洁注射器传播
- C: 共同饮食传播
- D: 母婴传播

【答案】: C

45. 疫苗质量和流通的监督管理工作由_____负责? ()

- A: 卫生行政部门
- B: 药品监督管理部门
- C: 各级疾控机构
- D: 卫生行政部门和药品监督管理部门共同负责

【答案】: B

46. 目前水痘疫苗可用的唯一疫苗株是。()

- A: BRDII
- B: Oka
- C: BCG
- D: DPT

【答案】: B

47. 为预防和控制传染病暴发、流行, 在特定范围和时间内, 针对可能受某种传染病威胁的特定人群, 有组织的集中实施的预防接种活动属于: ()

A: 常规接种

B: 群体性预防接种

C: 应急接种

D: 紧急接种

【答案】: B

48. 水痘愈后皮肤有变化? ()

A: 有破损

B: 有瘢痕

C: 无瘢痕

D: 脱屑

【答案】: C

49. 当疫苗瓶开启后, 活疫苗超过____小时、灭活疫苗超过____小时未用完, 应将剩余疫苗废弃。()

A: 0.5 小时、0.5 小时

B: 0.5 小时、1 小时

C: 1 小时、2 小时

D: 1 小时、0.5 小时

【答案】: B

50. 发达国家戊肝发病以为主。()

A: 散发

B: 暴发

C: 流行

D: 散发和暴发交替进行

【答案】: A

二、多选题(共 50 题)

51. 以下关于麻疹网络实验室质量控制, 说法正确的是:。()

A: 国家麻疹实验室负责对省级麻疹实验室进行质量控制和检测试剂的质量评估。

B: 省级麻疹实验室负责对市级疾病预防控制中心麻疹实验室进行质量控制。

C: 承担血清学检测任务的县级疾病预防控制中心和医疗单位麻疹实验室的考核方法与市级麻疹实验室相同。

D: 省级麻疹实验室需接受同级卫生行政部门认证。

E: 市级麻疹实验室需接受同级卫生行政部门认证。

【答案】: ABC

52. 关于 AFP 病例标本的运输, 以下表述正确的是: ()

A: 当装标本的冻存管放进封闭容器后, 周围需要放置冰袋, 不少于 4 个。

B: 运输 AFP 标本时, 如果估计 1 小时内能送达省级实验室, 可以不放置冰块。

C: 运输 AFP 标本时, 如果估计 1 小时内能送达省级实验室, 可用塑料袋运输。

D: 运输 AFP 标本, 无论距离远近, 必须放置冰块或干冰, 不允许用塑料袋运输标本。

【答案】: AD

53. 疾控机构、接种单位在购进或分发疫苗时, 应当做到。()

A: 购进疫苗时, 向疫苗上市许可持有人索要加盖其印章的批签发证明复印件或者电子文件

B: 购进进口疫苗的, 应当索取加盖其印章的进口药品通关单复印件或者电子文件

C: 建立真实、完整的购进、储存、分发、供应记录

D: 相关材料保存至超过疫苗有效期 5 年备查

【答案】: ABCD

54. 关于抽样调查, 正确的是。()

A: 省时间、省人力物力

B: 可用于变异较大的资料

C: 调查范围小

D: 资料分析比较复杂

E: 可用于需要普查普治的计划

【答案】: ACD

55. 以下关于狂犬病的描述不正确是: ()

A: 狂犬病是由狂犬病病毒感染中枢神经系统引起的急性传染病, 因

临床表现以惧怕水为特征，又称“恐水病”；因多为被狗抓咬伤后发病，故我国民间也称“疯犬病”或“疯狗病”；

B：狂犬病是由狂犬病病毒感染所引起的以损害呼吸系统为主的传染病；

C：狂犬病是由狂犬病病毒引起的急性传染病，主要感染家畜、宠物、野生动物，基本不会感染人。

D：狂犬病在我国属于乙类传染病，但按照甲类传染病进行管理。

E：狂犬病一旦发病，几乎 100%死亡。

【答案】：BCD

56. 免疫规划疫苗在产品最小外包装上应标有。（ ）

A：“免费”字样

B：“免疫规划”专用标识

C：疫苗名称和生产厂家

D：疫苗批号和有效期

【答案】：ABCD

57. 抗原的特异性是由抗原决定簇的决定的。

A：基因序列

B：数量

C：性质

D：空间构型

【答案】：ABCD

58. 流脑病例脑脊液标本的实验室检测项目包括。（ ）

- A: 病原培养分离和鉴定
- B: 血清抗体检测
- C: 核酸检测
- D: 以上都不是

【答案】: AC

59. 山东省冷链监测系统需要具有哪些功能? ()

- A: 不间断监测和连续记录数据
- B: 数据存储功能
- C: 数据显示功能
- D: 报警功能

【答案】: ABCD

60. 预防接种信息系统门诊客户端编辑受种者信息中包括 ()

- A: 受种者接种记录
- B: 禁忌症与未种原因
- C: 受种者变迁情况
- D: 接种记录修改轨迹

【答案】: ABCD

61. 下列关于心因性反应的说法正确的是 ()

- A: 心因性反应与疫苗本质因素无关
- B: 主要发生在青少年人群中
- C: 常见原因为害怕注射
- D: 主要表现为紧张、焦虑、换气过度、晕厥 (晕针)、癔症等

【答案】: ABCD

62. 下列关于采集流行性腮腺炎病例标本正确的说法有: ()

A: 取发病后 4~28 天的全血 1ml, 在室温下凝固, 分离血清。

B: 血清标本应无溶血、无污染, 用带有螺旋盖的血清管分装、保存。

C: -20° C 条件下保存。

D: 咽拭子标本采集后应尽快送到实验室, 若不能及时送到, 应-70° C 以下冻存。

E: 咽拭子标本应在冷冻条件下送检, 并要附带标本采样单。

【答案】: ABCDE

63. 制订疫苗和注射器使用计划的原则是_____。()

A: 保证需要

B: 适当储备

C: 避免浪费

D: 足量储备

【答案】: ABC

64. 水痘的临床特征有? ()

A: 疹退后脱皮, 一般不留瘢痕

B: 同时期丘疹、疱疹、干痂并见

C: 病后终身免疫

D: 发热一二天内出疹

【答案】: ABCD

65. 预防接种过敏性休克的处置原则有哪些? ()

- A: 使病人平卧、头部放低、保持安静、注意保暖。
- B: 立即皮下注射 1: 1000 肾上腺素。用肾上腺素 15~30 分钟后，血压仍不回升者宜用地塞米松；儿童可用阿托品，必要时每隔 15~30 分钟后重复应用，至病情稳定。
- C: 发生呼吸衰竭，有条件时予插管给氧，或肌肉注射洛贝林(山梗菜碱) 30mg 或尼可刹米 250mg, 呼吸停止立即进行人工呼吸和作胸外心脏按压，心跳停止立即心室内注射异丙肾上腺素。喉头水肿阻碍呼吸应吸氧，并作气管插管。烦躁不安者可肌注镇静剂，如苯巴比妥。
- D: 基层单位作上述处理后，待病情稍有好转立即转院以便进一步处理，或至少留观 12 小时，以防晚期过敏反应的出现。

【答案】: ABCD

66. 《山东省麻疹监测方案（2014 年版）》中，医疗机构在麻疹监测中应担负的职责有。（ ）

- A: 负责对就诊的监测病例进行报告和主动监测
- B: 采集就诊的监测病例的血标本和病原学标本
- C: 协助各级疾病预防控制中心完成流行病学调查和标本运送工作。
- D: 接受辖区疾病预防控制机构开展的培训，
- E: 对本单位医护人员进行培训。

【答案】: ABCDE

67. 设置预防接种单位时，应当考虑以下哪些因素？（ ）

- A: 人口密度
- B: 服务半径

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/138006142041006051>