

## 2021 年甲乳外科 8 月份业务学习考试试题

1. 世界糖尿病日是( ) [单选题] \*

- A、11 月 12 日
- B、11 月 13 日
- C、11 月 14 日(正确答案)
- D、11 月 15 日

2. 影响胰岛素作用的因素包括( ) [单选题] \*

- A、基础胰岛素
- B、个体的反应差异
- C、注射部位
- D、以上均是(正确答案)

3. 在中国 2 型糖尿病防治指南中, 除血糖和糖化血红蛋白的达标外, 理想的血压是( ) [单选题] \*

- A <140/90 mmHg
- B < 130/80 mmHg(正确答案)
- C < 135/90 mmHg
- D.< 130/90 mmHg

4. 主要抑制多糖的水解, 使葡萄糖的吸收减慢, 使餐后血糖曲线较为平稳, 从而降低餐后高血糖的药物是( )。 [单选题] \*

- A、磺脲类药物
- B、双胍类药物
- C、 $\alpha$ 糖苷酶抑制剂(正确答案)

D、胰岛素增敏剂

5. 噻唑烷二酮类药物的副作用，包括( ) [单选题] \*

A、体重增加

B、头痛、乏力

C、贫血和红细胞减少

D、以上均是(正确答案)

6. 磺脲类药物的禁忌证是( )

[单选题] \*

A、I型糖尿病

B、肝肾功能不全

C、孕妇、需要手术

D.以上都是(正确答案)

7. 糖尿病患者死亡的最主要原因是( ) [单选题] \*

A、视网膜病变

B、大血管并发症(正确答案)

C、微血管并发症

D、糖尿病肾病

8. 吡格列酮口服降糖药是

[单选题] \*

A、胰岛素增敏剂(正确答案)

B、 $\alpha$ 糖苷酶抑制剂

C、双胍类药物

D、磺脲类药物

9. 下列药物不属于磺脲类药物的是 [单选题] \*

- A、米格列奈(正确答案)
- B、优降糖
- C、美吡哒
- D、亚莫利

10. 人是具有多种需要的复杂的“社会人”，是生产力发展最活跃的因素是什么原理的思想基础 ( ) [单选题] \*

- A.人本原理(正确答案)
- B.行为激励
- C.参与管理
- D.系统原理
- E.科学管理

11. 外科预防用抗菌药物时，接受清洁手术者，应在什么时间内给药 ( ) 。 [单选题] \*

- A 术前 24 小时
- B 术后 24 小时
- C 术前 0.5-2 小时(正确答案)
- D 术后 0.5-2 小时

12. 上、下呼吸道、上、下消化道、泌尿生殖道手术，或经以上器官的手术，如经口咽部大手术、经直肠前列腺手术，以及开放性骨折或创伤手术应是。 [单选题] \*

- A 清洁手术
- B 清洁-污染手术(正确答案)
- C 污染手术

D 感染手术

13. 预防性用药应当在发生艾滋病病毒职业暴露后尽早开始，最好在几小时内实施，最迟不得超过 24 小时() [单选题] \*

A 2

B 4(正确答案)

C 6

D 12

14. 女性，55 岁，发现右乳腺肿物 1 周，查右乳外上象限肿物 1.5cm×1.0cm，质硬，活动度小最可能的诊断是。 [单选题] \*

A.乳腺癌

B.乳腺囊性增生病

C.乳腺纤维腺病

D.乳腺结核(正确答案)

E.乳腺炎

15. 急性乳腺炎最常见的病因是： [单选题] \*

A. 乳汁淤积

B. 雌激素分泌增加

C. 雄激素分泌增加

D. 卵巢内分泌功能失调(正确答案)

E. 性激素的改变与紊乱

16. 甲亢术前药物准备应以下列哪项作为术前准备的重要环节: [单选题] \*

A.降低心率

B.改善睡眠

- C.增加体重
- D.降低基础代谢率(正确答案)
- E.稳定情绪

17. 甲状腺癌根治术不会产生 。 [单选题] \*

- A.手足抽搐
- B.血钙过多(正确答案)
- C.磷的排泄减少
- D.血钙过少
- E.任何这些症状

18. 甲状腺癌中，预后最好的是下列哪一型？ [单选题] \*

- A.未分化癌
- B.滤泡状腺癌
- C.乳头状腺癌(正确答案)
- D.髓样癌
- E.鳞癌

19. 下列除哪一条外，都是亚急性甲状腺炎具有的特点？ [单选题] \*

- A.基础代谢率略增高
- B.甲状腺疼痛，并可波及耳、颞部
- C.先前有上呼吸道感染史
- D.腺体坚硬如石(正确答案)
- E.甲状腺增大，并有压痛

20. 18.甲状腺癌根治术不会产生： [单选题] \*

- A.手足抽搐

B.血钙过多(正确答案)

C.磷的排泄减少

D.血钙过少

E.任何这些症状

21. 甲状旁腺功能亢进可伴有： [单选题] \*

A.血钙升高、血磷降低(正确答案)

B.血钙、血磷都升高

C.血钙降低、血磷升高

D.血钙、血磷都升高

E.血钙、血磷均无异常

22. 功能性甲状旁腺腺瘤通常是： [单选题] \*

A.良性和单发的(正确答案)

B.恶性和单发的

C.良性和多发的

D.恶性和多发的

E.混合的

23. 乳腺癌最常见的部位是： [单选题] \*

A.内上象限

B.外上象限(正确答案)

C.内下象限

D.外下象限

E.乳晕区

24. 年轻女性病人有分界不清的乳房肿块，月经来潮时有明显疼痛，提示： [单选题] \*

- A.乳腺癌
- B.乳腺炎
- C.乳腺病(正确答案)
- D.乳管内乳头状瘤
- E.乳腺纤维腺瘤

25. 关于乳房检查，除了哪条外，下列各条都是正确的？ [单选题] \*

- A.触痛提示炎症或囊性乳腺病
- B.一个硬的无痛性不规则结节时癌症的特征
- C.检查时以手指掌面而不是指尖作叩诊(正确答案)
- D.乳头内陷表示有病变
- E.多发性结节提示囊性乳腺病

26. 乳腺病的突出表现是： [单选题] \*

- A . 乳房胀痛和乳头溢液
- B . 乳房胀痛和肿块(正确答案)
- C . 乳房胀痛
- D . 乳房肿块
- E . 乳头溢液

27. 反映近两三个月糖尿病控制情况最理想的指标为( ) [单选题] \*

- A、空腹血糖
- B、餐后血糖
- C、尿糖
- D、糖化血红蛋白(正确答案)

28. 除哪条外，下列都是急性乳腺炎的表现： [单选题] \*

- A . 出现寒战、发热
- B . 患侧腋窝淋巴结肿大、压痛(正确答案)
- C . 白细胞计数明显增高
- D . 乳房皮肤红肿、增厚、粗糙
- E . 乳房疼痛, 局部红肿、发热

29. 乳腺癌的主要转移途径是： [单选题] \*

- A . 经血运转移至肺
- B . 经内侧淋巴管达锁骨上淋巴结
- C . 经同侧腋窝淋巴结转移(正确答案)
- D . 经皮下淋巴管转移至对侧乳房
- E . 经血运转移至骨

30. 下列除哪个外, 都属于乳房肉瘤： [单选题] \*

- A . 乳房间质肉瘤
- B . 乳房淋巴肉瘤
- C . 乳房纤维肉瘤
- D . 乳房分叶状纤维腺瘤
- E . 乳房纤维腺瘤(正确答案)

31. 关于乳管内乳头状瘤, 下列哪一条不正确： [单选题] \*

- A . 肿瘤小, 常不能触及
- B . 多见于经产妇
- C . 可从乳头溢出血性液
- D . 除乳头溢液外, 一般无自觉症状
- E . 属于良性病变, 不会恶变(正确答案)

32. 关于乳腺癌病因, 下列不正确的是： [单选题] \*



- A. 病因不清楚
- B. 雌激素和乳腺癌发病有直接关系
- C. 月经初潮早、绝经年龄晚与乳腺癌发病有关
- D. 初次足月产的年龄与乳腺癌发病有关
- E. 乳腺纤维腺瘤与乳腺癌有关(正确答案)

33. 甲状腺癌中，预后最好的是下列哪一型？（） [单选题] \*

- A. 未分化癌
- B. 滤泡状腺癌
- C. 乳头状腺癌(正确答案)
- D. 髓样癌
- E. 鳞癌

34. 下列除哪一条外，都是亚急性甲状腺炎具有的特点？（） [单选题] \*

- A. 基础代谢率略增高
- B. 甲状腺疼痛，并可波及耳、颞部
- C. 先前有上呼吸道感染史
- D. 腺体坚硬如石(正确答案)
- E. 甲状腺增大，并有压痛

35. 甲状腺癌根治术不会产生：（） [单选题] \*

- A. 手足抽搐
- B. 血钙过多(正确答案)
- C. 磷的排泄减少
- D. 血钙过少
- E. 任何这些症状

36. 甲状旁腺功能亢进可伴有：（） [单选题] \*

- A.血钙升高、血磷降低
- B.血钙、血磷都升高
- C.血钙降低、血磷升高(正确答案)
- D.血钙、血磷都升高
- E.血钙、血磷均无异常

37. 功能性甲状旁腺腺瘤通常是：（） [单选题] \*

- A.良性和单发的(正确答案)
- B.恶性和单发的
- C.良性和多发的
- D.恶性和多发的
- E.混合的

38. 乳腺癌最常见的部位是：（） [单选题] \*

- A.内上象限
- B.外上象限(正确答案)
- C.内下象限
- D.外下象限
- E.乳晕区

39. 年轻女性病人有分界不清的乳房肿块，月经来潮时有明显疼痛，提示：（）  
[单选题] \*

- A.乳腺癌
- B.乳腺炎
- C.乳腺病(正确答案)
- D.乳管内乳头状瘤
- E.乳腺纤维腺瘤

40. 关于乳房检查，除了哪条外，下列各条都是正确的？（） [单选题] \*

- A. 触痛提示炎症或囊性乳腺病
- B. 一个硬的无痛性不规则结节时癌症的特征
- C. 检查时以手指掌面而不是指尖作扪诊
- D. 乳头内陷表示有病变(正确答案)
- E. 多发性结节提示囊性乳腺病

41. 关于乳腺癌，除了哪条外，下列各条都是正确的？（） [单选题] \*

- A. 乳腺癌多无疼痛
- B. 单发的乳房包块为其主要症状
- C. 累及 Cooper 韧带，使乳头回缩、凹陷(正确答案)
- D. 皮下淋巴管堵塞，皮肤呈“桔皮样”改变
- E. 乳腺癌淋巴转移多见于腋窝

42. 静脉穿刺是实验室试验获取（）样本的主要技术和方法。 [单选题] \*

- A、体液
- B、血液(正确答案)
- C、脑脊液
- D、尿液

43. 疫情处理、流行病调查、体检等,凡是涉及抗体检测及（）项目,都需要静脉穿刺采集血液样品。 [单选题] \*

- A、流调项目
- B、体检项目
- C、现场监测项目
- D、临床血液检测(正确答案)

44. 处理疫情时提前准备采样包,常规采样前 ( ) 作好准备工作,采样前 10 分钟对器材再次进行检查。 [单选题] \*

- A、30 分
- B、半天
- C、2 天
- D、1 天(正确答案)

45. 抽血室要 ( ) 静脉抽血注意事项,同时采样人员须用简明语言提示采血对象。 [单选题] \*

- A、口头提醒
- B、告知
- C、明示(正确答案)
- D、重视

46. 采样前后分别对采样环境紫外线消毒 ( ) ,并按照《消毒技术规范》,用规定浓度的含氯消毒剂擦拭采样台面和地面,紫外线消毒时,人员不能进入。 [单选题] \*

- A、10 分
- B、20 分
- C、30 分(正确答案)
- D、40 分

47. 采血对象取坐位或卧位,手臂伸直平放在床边或台面,腕下垫枕上,暴露穿刺部位,找好合适采血静脉后,在静脉穿刺部位上方 ( ) 厘米处扎紧压脉带,捆绑时间不应超过 1 分钟。 [单选题] \*

- A、5-6
- B、6—7
- C、1—2

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/138032132054006033>