



休克病人的急救护理



目录



- 休克概述
- 休克病人的急救措施
- 休克病人的护理
- 休克病人的转运与后续治疗
- 病例分享与讨论




01

休克概述




定义与分类




01

定义




休克是一种由于有效循环血容量减少，导致组织灌注不足，进而引发细胞代谢紊乱和功能受损的病理生理状态。




02

分类



休克可以根据病因、病程和血流动力学特点进行分类，如感染性休克、过敏性休克、低血容量性休克等。



休克的症状与体征



下肢抬高30度



症状

休克早期可能出现口渴、尿少、乏力、心慌等症状，随着病情加重，可能出现意识模糊、昏迷、四肢厥冷等严重症状。



体征

休克时可能出现血压下降、心率加快、呼吸急促等体征，皮肤湿冷、发绀，甚至出现花斑等表现。

●●●● 休克的原因与病理生理

原因

休克的原因多种多样，包括失血、失液、感染、过敏等，这些因素可能导致有效循环血容量减少，引发休克。

病理生理

休克时，由于有效循环血容量减少，组织灌注不足，导致细胞代谢紊乱和功能受损。同时，机体可能产生一系列应激反应，如炎症反应、凝血反应等，这些反应可能加重病情。






02

● 休克病人的急救措施





基础生命支持

01

02

03

保持呼吸道通畅


及时清理呼吸道异物，确保患者能够正常呼吸。

维持有效循环血容量

快速建立静脉通道，补充血容量，维持血压稳定。

观察病情变化

密切监测患者生命体征，包括呼吸、心率、血压、体温等。



高级生命支持

01

心肺复苏

在心脏骤停的情况下，立即进行心肺复苏，恢复心脏泵血功能。

02

机械通气

对于呼吸衰竭或呼吸肌麻痹的患者，应及时进行机械通气，保证氧气供应。

03

药物治疗

根据病情需要，给予相应的药物治疗，如升压药、强心药等。

特殊情况处理



过敏性休克



立即停止过敏原的接触，给予抗过敏药物治疗，如肾上腺素。



心源性休克



在心肺复苏的基础上，给予相应的药物治疗，如多巴胺等血管活性药物。



低血容量性休克



迅速补充血容量，同时针对失血原因进行治疗，如止血、输血等。



03

休克病人的护理



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/13805406310006043>