

医学三基（神经内科、精神科、康复科）-临床三基 理论试题-神经内科

1、脑血栓形成的临床表现不包括()

- A. 失语
- B. 意识障碍
- C. 血性脑脊液
- D. 偏瘫
- E. 偏盲

2、蛛网膜下腔出血急性期应绝对卧床休息()

- A. 48 小时
- B. 7 天
- C. 2 周
- D. 3 周
- E. 4 周

3、癫痫发作时护理错误的是()

- A. 让患者就地平卧
- B. 立即喂抗癫痫药
- C. 及时给氧
- D. 防止舌咬伤
- E. 专人陪伴

4、脑电图检查前患者准备不包括()

- A. 洗头
- B. 进食
- C. 服抗癫痫药
- D. 心理指导
- E. 停药抗癫痫药

5、确诊新生隐球菌性脑膜炎的主要实验室检查是()

- A. 脑脊液涂片墨汁染色
- B. 脑脊液细胞学检查
- C. 脑脊液生化检查
- D. 血液细菌培养

E. 脑脊液荧光素钠试验

6、癔病性痉挛的主要表现，下列哪项是错误的()

A. 抽搐

B. 痉挛

C. 无发作先兆

D. 病理反射阳性

E. 不易跌伤

7、胰岛素休克治疗精神病应注意预防患者出现()

A. 自伤

B. 伤人

C. 低血糖

D. 中毒性肝炎

E. 内分泌改变

8、电抽搐不宜用于治疗下列哪类精神病患者()

A. 自伤、自杀行为

B. 极度兴奋躁动

C. 拒食

D. 紧张性木僵

E. 神经衰弱

9、颅脑外伤患者出现下列哪项提示颅后窝骨折()

A. 脑脊液鼻漏

B. 吞咽咳嗽反射障碍

C. 脑脊液耳漏

D. “熊猫眼”征

E. 上睑下垂

10、颅内动脉瘤出血的诱因不包括()

A. 卧床休息

B. 情绪激动

C. 便秘

D. 高血压

E. 进食过量

11、颅脑手术后继发出血多发生于术后()

- A. 2~4 小时
- B. 4~6 / 小时
- C. 8~12 小时
- D. 12~24 小时
- E. 24~48 小时

12、脑疝急救首选()

- A. 20%甘露醇
- B. 地塞米松
- C. 苯巴比妥钠
- D. 呋塞米
- E. 地西洋

13、脊髓压迫综合征的主要表现不包括()

- A. 运动障碍
- B. 意识障碍

C. 感觉障碍

D. 反射障碍

E. 自主神经功能障碍

14、颅后窝病变引起颅内压增高患者禁忌()

A. 脑室穿刺

B. 脱水药物

C. 腰椎穿刺

D. 抬高床头

E. 心理指导

15、脑室穿刺引流术后一般每天引流脑脊液量不超过()。

A. 100mL

B. 200mL

C. 300mL

D. 400mL

E. 500mL

16、正常成人颅内压值为()

- A. 0.1~0.5kPA
- B. 0.5~1.0kPA
- C. 0.7~2.0kPA
- D. 2.0~2.5kPA
- E. 2.5~3.0kPA

17、脑疝前驱症状不包括()

- A. 剧烈头痛
- B. 频繁呕吐
- C. 意识障碍加深
- D. 一侧瞳孔散大
- E. 体温升高

18、下列哪项不是急性炎症性脱髓鞘性多发性神经病的症状()

- A. 运动障碍
- B. 感觉障碍
- C. 癫痫发作

D. 呼吸障碍

E. 心肌损害

19、为昏迷患者吸痰时间为()

A. 2.7kPA 为颅内压增高的危险临界点，应立即报告医师。

46、随意运动功能的减弱和丧失称为瘫痪。

47、癫痫癫痫期应停药抗癫痫药。

48、由于阿司匹林有抗血小板聚集作用，2 周内服用该药物患者不宜行开颅手术。

49、后组脑神经损伤患者易致吞咽咳嗽功能障碍。

50、晕厥是突然发生的意识丧失，常需 1 小时以上才能恢复。

51、尿崩症常发生于脑干手术后患者。

52、人工冬眠治疗的禁忌证包括年老体弱、婴幼儿、心血管功能不全或休克未纠正患者。

53、高血压脑出血患者饮食护理时应注意给予低脂、低盐、易消化的食物。

54、脊髓共有脊髓节 31 个，具有传导与反射的功能。

55、5 级肌力是指完全瘫痪，0 级肌力是指正常肌力。

56、腰椎穿刺术后患者应平卧 24 小时，以免引起头痛。

57、脑电图检查前 3 天应服抗癫痫药，以防止检查时癫痫发作。

58、颅脑手术后继发性出血是直接威胁患者生命的最严重并发症。

59、脑疝晚期患者可出现典型的 Cushing 反应。

60、神经内、外科及精神科患者护理评估内容包括健康史、生理评估及心理社会评估。

61、根据癫痫发作临床特征可将癫痫分为_____发作、
_____发作、_____发作、_____发作和_____。

62、脑出血最常见的病因是_____和_____。

63、肌无力危象首选药物为_____。

64、尿崩症患者每 24 小时尿量在_____mL 以上，尿相对密度在
以下_____。

65、脑血管造影术后患者卧床至少_____小时，以防止穿刺部位
_____。

66、意识障碍分为_____、_____、_____、_____。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/138066020023006034>