

眼科常见病护理常规理论考核试题

一、选择题

- 1

·白内障的主要症状是（） [单选题] *

A.视力障 ✓

B.眼痛

C.眼充血

D.眼部分泌物增多
- 2

·最常见的白内障类型是（） [单选题] *

A.先天性

B.代谢性

C.外伤性

D.并发性

E.老年性 V
- 3

·老年性白内障最好的治疗方法是（） [单选题] *

A.手术治疗 V

B.药物治疗

C.放射治疗

D.验光配镜
- 4

·白内障术前检查包括（） 多选 [多选题] *

A.血压 ✓

去留无意，闲看庭前花开花落；宠辱不惊，漫随天外云卷云舒。——《幽窗小记》

B.血糖 ✓

C.心电图 V

D.血、尿常规 ✓

5. 下列哪些疾病可以引起并发性白内障（）多选 [多选题] *

A.葡萄膜炎 ✓

B.青光眼 ✓

C.视网膜脱离 ✓

D.糖尿病

E.眼球挫伤

6. 为以为年龄相关性白内障未成熟期的病人进行健康教育时，护士要告诉病人及家属特别

注意（）多选 [多选题] *

A.异物感

B.视力下降 ✓

C.眼部痒感

D.眼部红痛 ✓

E.头疼、眼痛 V

7 . 白内障术前护理（）多选 [多选题] *

A.术前滴抗生素眼药水 ✓

8 .为病人准备全麻或局麻，常用表面麻醉 ✓

C.术前充分散大瞳孔，以便术者在术中有清晰的视野 V

D.必要时遵医嘱服药 ✓

勿以恶小而为之，勿以善小而不为。——刘备

E.术前晚洗头，剪指甲，取下首饰 ☒

8. 白内障术后眼部护理及眼药使用（）多选多选题】*

A.保持纱布及眼罩清洁 ☒

B.睡觉时，切勿侧向术眼 ☒

C.遵医嘱按时用药 ☒

9. 白内障术后饮食、活动需注意（）多选 [多选题] *

A.可正常进食，无需戒口 ☒

B.多吃蔬菜、水果，避免便秘 ☒

C.避免揉眼，使头部受震荡，避免提重物 ☒

D.避免低头拾物 ☒

E.如病人需要洗头，手术后第一个星期需仰卧式，洗澡及洗头时避免污水流入眼内 ☒

E 小心起居，避免感冒 ☒

10.白内障术后如发现下列情况，应及时就诊（）多选 [多选题] *

A.眼睛红、严重疼痛 ☒

B.大量眼部分泌物 ☒

C.视力突然下降 ☒

11. 翼状青肉是一种常见的（）疾病 [单选题] *

A.角膜性疾病

B.结膜性疾病

C.巩膜性疾病 ☒

D.浅表性疾病

12、翼状胃肉病因不包括（） [单选题] *

A.紫外线

以家为家，以乡为乡，以国为国，以天下为天下。——《管子》

B.粉尘

C.慢性炎症

D.先天因素 ✓

13、翼状蜀肉的临床表现不正确的（） [单选题] *

A.单眼发病 ✓

B.鼻侧多见

C.有异物感

D.可引起角膜散光

14、翼状符肉术后的护理正确的是（） [单选题] *

A.嘱病人卧床休息 24H,但并非绝对卧床，头部放松，可进行一般的起居活动

B.术后当天避免使用硬质食物，避免刺激性食物，避免吸烟、饮酒

C.术后患者术眼会自觉疼痛，协助患者保持舒适体位，保持病室环境安静，整洁，必要时

给予止痛药

D.以上都对 ✓

15、翼状符肉术后的拆线时间（） [单选题] *

A.可吸收建线，不用拆线

B. 3- 4 天

C. 7-10天 ✓

D. 14 天

16、以下哪项症状最常与泪囊炎相关？（） [单选题] *

A.眼球疼痛

B.眼睛干燥

君子忧道不忧贫。——孔丘

C.流泪 ✓

D.眼睑M 胀

17、对于泪道阻塞的最佳治疗方法是什么？（） [单选题] *

A.药物治疗

B.手术治疗 V

C.激光治疗

D.抗生素治疗

18、以下哪项检查对于诊断泪囊炎和泪道阻塞最为重要？（） [单选题] *

A.视力检查

B.眼压检查

C.泪道冲洗试验 ✓

D.眼球超声检查

19、如果泪道阻塞合并炎症，最佳治疗方法是什么？（） [单选题] *

A.口服抗生素药物

B.局部使用抗生素药物

C.手术治疗 V

D.激光治疗

20 以下哪项症状最不可能出现在泪囊炎患者中？ [单选题] *

A.眼睑肿胀

B.眼球疼痛 ✓

C.流泪

D.眼睛充血

不飞则已，一飞冲天；一鸣则已，一鸣惊人。——《韩非子》

A.流泪症状

B.眼睑痉挛

C.眼部红肿 ✓

D. 以上都是

22、翼状得肉的健康指导（） 多选 [多选题] *

A.注意眼部卫生 ✓

B.清淡饮食，保持大便通畅 V

C.户外活动时佩戴防尘，防紫外线眼睛 ✓

D.术后 7-10天拆线 ✓

23、翼状符肉病因于下列哪些因素有关（） 多选 [多选题]

A.风沙 ✓

B 花粉 ✓

C.烟尘 ✓

D.紫外线 ✓

24、翼状符肉术前常见护理诊断有哪些（） 多选 [多选题]

A 感知紊乱 ✓

B.知识缺乏 ✓

C.视觉障碍 ✓

D.有感染的风险

25、泪道阻塞的主要原因是什么？（） 多选 [多选题] *

A.泪腺分泌过多 V

先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。——范仲淹

B.眼部细菌感染 ✓

C.鼻窦炎 V

D.以上都不是

26、泪囊炎的常见治疗方法有哪些？（） [单选题] *

A.药物治疗

B.手术治疗

C.以上都是 ✓

D.以上都不是

27、为病人进行冷疗时，时间应控制在（） [单选题] *

A. 20min

B. 30min ✓

C. 40min

D. 50min

E. 60min

28、禁用冷疗法的部位是（） [单选题] *

A. 腋窝

B. 心前区 V

C.大血管行走处

D. 腹股沟

E.后背

29、对冷过敏者使用冷疗会出现（） [单选题] *

B. 心脏病

C.休克

D.水肿

E.红斑、荨麻疹 ✓

30、当温度超过 45。C 会刺激引起不舒适的感受器是（） [单选题] *

A. 热感受器

B. 冷感受器

C.痛觉感受器 ✓

D. 热疼痛感受器

E.以上都不是

31、乙醇拭浴时，热水袋放置足底原因是（） [单选题] *

A. 保暖

8 . 使体温骤降

C.促进足底血管扩张，减轻头部充血 ✓

D. 预防发生心律不齐

E.以上都不是上只

32、使用冰袋后应测量体温的时间是（） [单选题] *

A. 15min

9 . 20min

C. 25min

D. 30min ✓

E35min

学而不知道，与不学同；知而不能行，与不知同。——黄晞

- A、反射性调节
- B、近感知调节 ✓
- C、张力性调节
- D、聚散性调节

34、电脑验光仪（）至患者角膜顶点一般为 12mm [单选题] *

- A、目镜
- B、主体
- C、中央
- D、物镜 ✓

35、全身冷疗法包括（） [单选题] *

- A.冰袋、温水擦浴部放
- B.乙醇拭浴、冰袋
- C.冰帽、冷湿敷法
- D.温水擦浴、乙醇拭浴 ✓
- E.冰槽、化学制冷袋

36、使用冰袋时操作正确的是（） [单选题] *

- A. 将小冰块装满水袋即拧紧袋口
- B. 将冰块砸成小块，用水冲去棱角 V
- C. 擦干冰袋外水立即装入布套
- D. 不需要检查冰袋有无漏水
- E. 直接将冰袋置于病人需要冰敷的部位

人人好公，则天下太平；人人营私，则天下大乱。——刘鹗

37、炎症初期用冷的目的是（） [单选题] *

A, 解除疼痛 ✓

B. 血管扩张

C. 促进愈合

D. 使炎症消散

E. 以上都不是

38、调节眼压最主要的因素是（） [单选题] *

A 房水 ✓

B 晶状体

C 玻璃体

D 眼内血容量

E 巩膜硬度

39、我国正常人眼压范围（） [单选题] *

A $\geq 21\text{mmHg}$

B $10-21\text{mmHg}$ ✓

C $> 10\text{mmHg}$

D $10\sim 24\text{mmHg}$

E $\leq 24\text{mmHg}$

40、一般正常人双眼压差异小于（） [单选题] *

古之立大事者，不惟有超世之才，亦必有坚忍不拔之志。——苏轼

A2mmHg

B5mmHg ✓

C8mmHg

D10mmHg

E 不确定

41、一眼急性闭角型青光眼急性发作，对侧未发作眼为（） [单选题] *

A 临床前期 ✓

B 先兆期

C 间歇期

D 慢性期

E 正常眼

42、急性闭角型青光眼好发于（） [单选题] *

A 青壮年

B 老年男性

C 老年女性 ✓

D 青少年

E 婴幼儿

43、急性闭角型青光眼最主要的发病机制为（） [单选题] *

A.眼轴短

B.小角膜

C.小梁网功能不全

D.房角窄

百学须先立志。——朱熹

E.瞳孔阻滞 ✓

44、闭角型青光眼的促发因素中, 不包括（） [单选题] *

A.情绪波动 V

其身正，不令而行；其身不正，虽令不从。——《论语》

- B.过度疲劳
- C.近距离过度用眼
- D.暗室环境
- E.瞳孔缩小

45、口服乙酰唑胺片可出现（） [单选题] *

- A 房角开放
- B 心率减慢
- C 眼压升高
- D 瞳孔缩小
- E 四肢末端麻木 V

46、对于青光眼病人术后随访，出现哪种情况应及时就诊（） 多选 [多选题] *

- A 突发眼睛胀痛 ✓
- B 有异物感
- C 出现虹视 ✓
- D 眼睛干涩
- E 看书后双眼不适

47、间歇性外斜视患者表现不包括（） [单选题] *

- A 双眼视力常接近
- B 往往表现为弱视 ✓
- C 双眼视功能出现异常
- D 斜视角度不稳定

子曰：“知者不惑，仁者不忧，勇者不惧。”——《论语》

A. 上转

B. 下转

C. 外转

D. 内旋 ✓

E. 外旋

49、动眼神经支配（） [单选题] *

A. 内直肌、外直肌、上直肌、下斜肌

B. 内直肌、外直肌、下直肌、上斜肌

C. 内直肌、上直肌、下直肌、上斜肌

D. 内直肌、外直肌、上直肌、下直肌

E. 内直肌、上直肌、下直肌、下斜肌，

50、先天性内斜解口获得性内斜视的区别要点（） [单选题] *

A 后者斜视角随年龄的增大而增大 ✓

B 前者的斜视角偏大（ $>40^\circ$ 。）

C 前者常伴有垂直斜视

D 与调节的关系

E 发病年龄

51、下列哪项不是先天性内斜和获得性内斜的相同点（） [单选题] *

A 发病年龄 ✓

B 合并弱视

C 与调节无关

D 治疗原则

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/138071115124007041>