

2024 年广西壮族自治区荔浦县《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题题库答案下载

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 可使维生素 B6 在体内的活性降低的是

- A: 异烟肼
- B: 丙磺舒
- C: 雌激素
- D: 糖皮质激素

答案：C

2. 激动岛受体，对慢性心力衰竭疗效较好()

- A: 氨力农
- B: 硝普钠
- C: 多巴酚丁胺
- D: 地高辛

答案：C

3. 下列药物中，与雌二醇无相互作用的是

- A: 氢化可的松
- B: 卡马西平
- C: 苯巴比妥
- D: 利福平

答案：A

4. 属于非麻醉性镇痛药的是

- A: 可待因
- B: 美沙酮
- C: 布洛芬
- D: 吗啡

答案：C

5. 与促皮质激素合用，能促进尿钾排泄，降低钾盐疗效的是

- A: 氯化钠
- B: 氯化钾
- C: 氯化钙
- D: 枸橼酸钾

答案：B

6. 服用西地那非可导致()

- A: 视物模糊、复视
- B: 肾功能异常
- C: 高血压
- D: 心律失常

答案：A

7. 局部抗炎作用较弱的长效糖皮质激素是

- A: 泼尼松
- B: 倍他米松
- C: 地塞米松
- D: 氢化可的松

答案：C

8. 肾上腺皮质功能不全采用

- A: 糖皮质激素一般剂量长期疗法
- B: 糖皮质激素大剂量冲击疗法
- C: 糖皮质激素小剂量代替疗法
- D: 抗结核病药与糖皮质激素合用

答案：C

9. 雷尼替丁与硫酸铝合用

- A: 减慢药物代谢速度
- B: 使后者药效降低
- C: 出现呼吸抑制或停止
- D: 可升高合用药物的血浆药物浓度

答案：B

10. 属于第四代头孢菌素常用药物的是（）。

- A: 头孢克洛
- B: 头孢拉定
- C: 头孢吡肟
- D: 头孢克肟

答案：C

11. （2018 年真题）蒽醌类抗肿瘤药柔红霉素可引起心脏毒性，临床应用的解毒方案是（）

- A: 在用柔红霉素同时，使用柔红霉素等量的右雷佐生
- B: 在用柔红霉素前 30min，使用柔红霉素 10 倍量的右雷佐生
- C: 在用柔红霉素后 30min，使用柔红霉素 2 倍量的右雷佐生
- D: 在用柔红霉素前 30min，使用柔红霉素 2 倍量的氟马西尼

答案：B

12. 可抑制蛋白质合成全过程，具繁殖期和静止期杀菌作用的药物是

- A: 替加环素
- B: 多黏菌素
- C: 庆大霉素
- D: 环丙沙星

答案：C

13. 可致前庭、耳蜗神经功能障碍，妊娠期妇女和新生儿禁用的抗菌药物是

- A: 林可霉素类
- B: 四环素类
- C: 酰胺醇类(氯霉素)
- D: 氨基糖苷类

答案：D

14. 防止耐药现象的发生，持续用药须有 12 小时以上间歇期的药物是
()

- A: 硝酸甘油
- B: 依那普利
- C: 氨氯地平
- D: 哌唑嗪

答案：A

15. 止泻药 ()

- A: 甘油
- B: 地芬诺酯
- C: 硫酸镁

D: 乳果糖

答案: B

16. 可用于烧伤及伤后感染的是

A: 磺胺米隆

B: 磺胺嘧啶

C: 磺胺甲噁唑

D: 柳氮磺吡啶

答案: A

17. 硫脲类药物的基本作用是

A: 抑制甲状腺过氧化酶

B: 抑制 Na^+-K^+ 泵

C: 抑制甲状腺蛋白水解酶

D: 抑制碘泵

答案: A

18. 属于广谱抗病毒药物的是

A: 阿昔洛韦

B: 干扰素

C: 阿糖腺苷

D: 奥司他韦

答案: B

19. 洋地黄的主要适应症不包括

A: 阵发性室上性心动过速

B: 心房扑动

C: 急、慢性充血性心力衰竭

D: 房室传导阻滞

答案: D

20. 抑制甲状腺内过氧化酶，使碘不能活化的是

A: 甲状腺素

B: 丙硫氧嘧啶

C: 放射性碘

D: 糖皮质激素

答案: B

21. 达那唑的适应证不包括

A: 男性乳房发育

B: 纤维性乳腺炎

C: 白细胞减少症

D: 子宫内膜异位症

答案: C

22. 大量用药可致球后视神经炎的药物是

A: 异烟肼

B: 红霉素

C: 乙胺丁醇

D: 吡嗪酰胺

答案: C

23. 为酸性强氧化性消毒药，遇有机物释放出新生态氧起氧化作用，能杀灭病毒、细菌、真菌、芽孢等各种病原微生物的消毒防腐药是

A: 聚维酮碘

B: 过氧乙酸

C: 依沙吡啶

D: 氯己定

答案: B

24. 链激酶应用过量可选用的拮抗药是()

A: 氨基己酸

B: 维生素 K

C: 葡萄糖酸钙

D: 鱼精蛋白

答案: A

25. 钙通道阻滞剂的药理作用不包括

A: 抗动脉粥样硬化作用

B: 松弛支气管平滑肌

C: 抑制血小板活化

D: 主要舒张静脉，对动脉影响较小

答案: D

26. 主要作用是抗革兰阴性杆菌的半合成青霉素是

A: 替莫西林

B: 哌拉西林

C: 替卡西林

D: 阿莫西林

答案: A

27. 治疗 MRSA 的首选药物是

A: 四环素

B: 林可霉素

C: 万古霉素

D: 青霉素

答案: C

28. 患者，女，46 岁。以"口角歪斜 3 天"之主诉入院。3 天前洗澡冲凉后次日晨起刷牙时发现右口角漏水，右侧闭眼不紧，口角歪斜，伴右眼流泪。查体：大致正常。诊断：面神经麻痹(右侧)。医嘱：

A: 缓解肿瘤患者的骨转移疼痛

B: 骨质疏松

C: 骨发育不全

D: 佝偻病

答案: A

29. 下述利尿药中，可导致血钾升高的是()

A: 乙酰唑胺

B: 呋塞米

C: 氢氯噻嗪

D: 氨苯蝶啶

答案: D

30. 可与硝酸酯类药物发生相互作用的是

A: 丙酸睾酮

B: 呋塞米

C: 伐地那非

D: 坎利酮

答案: C

31. 晚期前列腺癌（乳腺癌、卵巢癌患者禁用）可选用的药物是

- A: 缩宫素
- B: 垂体后叶素
- C: 戊酸雌二醇
- D: 他莫昔芬

答案：C

32. 与多柔比星存在交叉耐药性的抗肿瘤药物是

- A: 柔红霉素
- B: 甲氨蝶呤
- C: 右雷佐生月德
- D: 阿糖胞苷

答案：A

33. 用于青春期前隐睾症的诊断和治疗的是

- A: 绒促性素
- B: 噻嘧啶
- C: 米非司酮
- D: 硝苯地平

答案：A

34. 人工合成的第一个应用于临床的单环 β -内酰胺类抗生素是()

- A: 氨苄西林
- B: 舒巴坦
- C: 头孢唑林
- D: 氨曲南

答案：D

35. 丙戊酸钠的严重毒性是

- A: 口干、皮肤干燥
- B: 肝功能损害
- C: 抑制呼吸
- D: 再生障碍性贫血

答案：B

36. 关于胺碘酮描述，正确的是

- A: 只对室上性心动过速有效
- B: 只对室性心动过速有效
- C: 对室上性和室性心动过速都有效
- D: 特异性针对房颤有效

答案：C

37. 四环素类首选用于()

- A: 钩端螺旋体病
- B: 布鲁菌病
- C: 伤寒、副伤寒
- D: 鼠疫、土拉菌病

答案：B

38. 镇静作用明显的 H

- A: 西咪替丁
- B: 组胺
- C: 苯海拉明
- D: 阿司咪唑

答案：C

39. 对中、重度持续哮喘患者的长期维持治疗的推荐方案是

- A: 长效 β_2 受体激动剂+长效 M 胆碱受体阻断剂
- B: 吸入性糖皮质激素+长效 β_2 受体激动剂
- C: 长效 M 胆碱受体阻断剂+白三烯受体阻断剂
- D: 吸入性糖皮质激素+短效 M 胆碱受体阻断剂

答案：B

40. 属于 β 受体激动剂的非强心苷类的正性肌力药是()

- A: 米力农
- B: 依那普利
- C: 地高辛
- D: 多巴酚丁胺

答案：D

41. 下列关于钠的作用特点描述，错误的是

- A: 维持血压
- B: 调节体内水量的恒定
- C: 调节体液渗透压、电解质及酸碱平衡
- D: 不能调节体内水量的恒定

答案：D

42. 风湿性心脏病重度二尖瓣狭窄宜

- A: 常规剂量的洋地黄
- B: 快速洋地黄化
- C: 停用洋地黄
- D: 不宜使用洋地黄

答案：D

43. 用于治疗黏液性水肿的是()

- A: 司坦唑醇
- B: 甲状腺素
- C: 西地那非
- D: 小剂量碘制剂

答案：B

44. 氨苄西林()

- A: 抗菌作用强，对厌氧菌有效
- B: 特别对铜绿假单胞菌有效
- C: 对 G
- D: 对 G

答案：D

45. 促进复极 4 相 K

- A: 奎尼丁
- B: 利多卡因
- C: 维拉帕米
- D: 普萘洛尔

答案：B

46. 戒断症状是 5-HT 再摄取抑制剂较常见的不良反应，产生的原因是

- A: 长期服用药物对 5-HT 受体无亲和力
- B: 长期服用致 5-HT、NE、DA 分解增加
- C: 长期服用使脑内 5-HT 受体敏感性下调
- D: 长期服用脑内 5-HT 受体数目减少

答案：C

47. (2015 年真题) 不属于抗乙型肝炎病毒的药品是 ()。

- A: 干扰素
- B: 恩替卡韦
- C: 泛昔洛韦
- D: 拉米夫定

答案：C

48. 出现流感样综合征，寒战、发热的药物是()

- A: 异烟肼
- B: 链霉素
- C: 利福平
- D: 对氨基水杨酸

答案：C

49. (2019 年真题) 长期使用可引起听力减退、肾功能下降的抗结核药物是()

- A: 链霉素
- B: 利福平
- C: 乙胺丁醇
- D: 吡嗪酰胺

答案：A

50. 以上药物镇咳作用与可待因相当且没有镇痛作用的是

- A: 吗啡
- B: 右美沙芬
- C: 喷托维林
- D: 可待因

答案：B

51. 用于组织脱水的治疗方案是

- A: 可予 10%~25%葡萄糖注射液滴注，每日 100g 葡萄糖即可控制病情
- B: 一般可给予 10%~25%葡萄糖注射液静脉滴注，并同时补充体液
- C: 应用高渗透压的 25%-50%葡萄糖注射液滴注，常与 20%甘露醇注射液联合应用
- D: 一般采用 50%葡萄糖注射液 20~40ml，快速静脉注射

答案：C

52. 属于必需磷脂类的保肝药是

- A: 甘草酸二胺
- B: 联苯双酯
- C: 多烯磷脂酰胆碱
- D: 还原型谷胱甘肽

答案：C

53. 可用于治疗阴茎勃起功能障碍的药物是

- A: 丙酸睾酮
- B: 他达拉非
- C: 炔诺酮
- D: 米非司酮

答案：B

54. 第一代蒽环类抗肿瘤药物，主要用于急性白血病的药物是

- A: 吡柔比星
- B: 多柔比星
- C: 表柔比星
- D: 柔红霉素

答案：D

55. 属于 α -葡萄糖苷酶抑制剂的是()。

- A: 二甲双胍
- B: 那格列奈
- C: 阿卡波糖
- D: 艾塞那肽

答案：C

56. 氨茶碱的作用特点是

- A: 舒张支气管作用弱且慢，适用于夜间哮喘和痰多的患儿
- B: $10\mu\text{g/ml}$ 为有效治疗浓度， $15\text{--}20\mu\text{g/ml}$ 以上会出现毒性反应
- C: 不宜长期、单一、过量使用，不宜用于重度哮喘患者，对小于 18 个月的婴幼儿和大多数儿童有效
- D: 适用于轻度持续型（2 级以上）哮喘的长期治疗

答案：B

57. 可用于中、重度细菌性感染，半衰期长，可以一日 1 次给药的是

- A: 美罗培南
- B: 亚胺培南
- C: 厄他培南
- D: 西司他丁

答案：C

58. 有机磷酸酯中毒的解救宜选用

- A: 阿托品+新斯的明
- B: 阿托品
- C: 胆碱酯酶复活药

D: 足量阿托品+胆碱酯酶复活药

答案：D

59. 可作为气道痉挛的应急缓解药物的长效 β_2 受体激动剂是

A: 福莫特罗

B: 特布他林

C: 丙卡特罗

D: 沙美特罗

答案：A

60. 患者，诊断为感染性心内膜炎，血液细菌培养为草绿色链球菌，拟用青霉素 G 和下列其中一药合用，应选

A: 奈替米星

B: 庆大霉素

C: 红霉素

D: 阿莫西林

答案：B

61. 神经毒性较严重的是

A: 顺铂

B: 奥沙利铂

C: 卡铂

D: 亚叶酸钙

答案：B

62. (2016 年真题) 与西地那非协同，可导致严重低血压的药品是

A: 丙酸睾酮

B: 甲睾酮

C: 非那雄胺

D: 硝酸甘油

答案: D

63. 抑制 DNA 回旋酶和拓扑异构酶Ⅳ的抗菌药是()

A: 四环素

B: 甲硝唑

C: 苯唑西林

D: 喹诺酮类

答案: D

64. 下列关于蛇毒血凝酶的给药途径，错误的是

A: 口服给药

B: 皮下注射

C: 静脉注射

D: 肌肉注射

答案: A

65. 与 α_1 受体阻断药无相互作用的药物是()

A: 地尔硫

B: 卡马西平

C: 第三代头孢菌素

D: 西咪替丁

答案: C

66. 糖皮质激素的药理作用不包括

A: 抗病毒

B: 抗炎

C: 抗休克

D: 免疫抑制

答案：A

67. 用于肝病的氨基酸制剂的是

A: 复方氨基酸注射液（9AA）

B: 赖氨酸注射液

C: 复方氨基酸注射液（18AA）

D: 复方氨基酸注射液（6AA）

答案：D

68. 替尼泊苷作为常见抗恶性肿瘤药物，首选用于治疗

A: 脑瘤

B: 纤维瘤

C: 慢性淋巴细胞白血病

D: 恶性淋巴瘤

答案：A

69. 用于防止排异反应、糖皮质激素不能长期缓解的多种自身免疫性疾病的是()

A: 甲泼尼龙

B: 环孢素

C: 环磷酰胺

D: 硫唑嘌呤

答案：C

70. 有减轻体重作用的口服降糖药是

A: 那格列奈

- B: 达格列净
- C: 吡格列酮
- D: 格列苯脲

答案：B

71. 患者，男性，46 岁，经常头痛，头晕近 8 年。2 天来头痛加重，伴有恶心、呕吐送往急诊。查体：神志模糊，血压 230 / 120mmHg。尿蛋白(++)，尿糖(+)。入院治疗，经处理，血压仍为 202 / 120mmHg，且气急不能平卧，心率 108 次 / 分，早搏 3 次 / 分。两肺底有湿啰音。

- A: 毛花苷丙静脉注射
- B: 普罗帕酮静脉注射
- C: 硝普钠静脉滴注
- D: 利多卡因静脉滴注

答案：C

72. 关于氨基糖苷类和第三代头孢菌素类联合应用，错误的是

- A: 联合应用治疗败血症、肺炎等革兰阴性杆菌引起的严重感染
- B: 可在身体同一部位给药
- C: 两类药不能混入同一容器内
- D: 治疗急性感染通常疗程不宜超过 7~14 日

答案：B

73. 关于肝素和低分子肝素作用特点的说法，错误的是

- A: 肝素与低分子肝素相比，起效快失效也快德收育
- B: 低分子肝素抗凝作用维持时间较长，可以一日 1 次或 2 次给药
- C: 皮下给药，低分子肝素的生物利用度接近 100%
- D: 肝素与低分子肝素均可使用硫酸鱼精蛋白迅速逆转抗凝作用

答案：D

74. 关于氢氯噻嗪临床应用的说法错误的是（）

- A: 与磺胺类药物存在交叉过敏反应
- B: 老年患者服药后易发生低血压及肾功能损害
- C: 服药期间应关注有无肌痉挛、耳鸣、听力障碍等症状
- D: 对血糖和尿酸无影响,可长期服用

答案：D

75. 属于胰岛素增敏剂的是

- A: 阿卡波糖
- B: 艾塞那肽
- C: 瑞格列奈
- D: 罗格列酮

答案：D

76. 属于解毒类保肝药的是

- A: 异甘草酸镁
- B: 双环醇
- C: 多烯磷脂酰胆碱
- D: 还原型谷胱甘肽

答案：D

77. 下列药物中属于缩瞳药的是

- A: 硫酸阿托品
- B: 毛果芸香碱
- C: 氢溴酸后马托品
- D: 托吡卡胺

答案：B

78. 治疗滴虫病宜选用

- A: 甲苯咪唑
- B: 甲硝唑
- C: 氯喹
- D: 吡喹酮

答案：B

79. 长期使用可能导致血钾升高的降压药物是

- A: 氨氯地平
- B: 硝普钠
- C: 美托洛尔
- D: 贝那普利

答案：D

80. 用于肾病的氨基酸制剂的是

- A: 复方氨基酸注射液（9AA）
- B: 复方氨基酸注射液（18AA）
- C: 赖氨酸注射液
- D: 复方氨基酸注射液（6AA）

答案：A

81. 属于噻唑烷二酮类胰岛素增敏剂的是

- A: 沙格列汀
- B: 罗格列酮
- C: 格列美脲
- D: 瑞格列奈

答案：B

82. 患者，男性，23 岁。患者 2 年前出现咳嗽，低热，气喘，胸闷隐痛，盗汗。经 X 线诊断为“肺结核”，以抗结核药物治疗。

- A: 青霉素
- B: 吡嗪酰胺
- C: 乙胺丁醇
- D: 链霉素

答案：C

83. 属于胃黏膜保护药的是

- A: 多潘立酮
- B: 胶体果胶铋
- C: 熊去氧胆酸
- D: 山莨菪碱

答案：B

84. （2020 年真题）患者，女，26 岁。因心悸、手颤、易饥饿、烦躁易怒前来就诊，实验室检查游离甲状腺素 (FT3、FT4) 增高、促甲状腺素 (TSH) 降低，诊断为甲状腺功能亢进症。医师处方给予抗甲状腺药物治疗。

- A: 甲巯咪唑
- B: 普萘洛尔
- C: 碳酸锂
- D: 丙硫氧嘧啶

答案：A

85. 属于非噻吩并吡啶类二磷酸腺苷 (ADP) P2Y₁₂ 受体阻断剂的是

- A: 替格瑞洛

- B: 双嘧达莫
- C: 替罗非班
- D: 阿司匹林

答案：A

86. 局麻药吸收过量所引起的症状，错误的是

- A: 心律失常
- B: 血压下降
- C: 心缩力增强
- D: 先兴奋，后抑制

答案：C

87. 直接舒张小动脉平滑肌的降压药是

- A: 利血平
- B: 氢氯噻嗪
- C: 硝苯地平
- D: 肼屈嗪

答案：D

88. 男性，70 岁，进食后饱胀不适伴反酸 5 年余，黑便 1 天。胃镜检查提示：胃多发性溃疡（A1 期）伴出血。13C 呼气试验：Hp（+）。患者既往有高血压病史 8 年，口服替米沙坦、美托洛尔及硝苯地平控制血压。医嘱：0.9%氯化钠注射液 100ml+注射用埃索美拉唑钠 40mg，静脉滴注，2 次 / 日；阿莫西林胶囊 1g，口服，2 次 / 日；克拉霉素缓释胶囊 0.5g，口服，2 次 / 日；注射用蛇毒血凝酶 1KU，静脉注射，1 次 / 日；替米沙坦 40mg，口服，1 次 / 日；硝苯地平缓释片 30mg，口服，1 次 / 日；美托洛尔 12.5mg，口服，2 次 / 日；胶体果胶铋胶囊 100mg，口服，3 次 / 日。

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/145221314122012033>