

中医眼科学试题及答案

1、上胞下垂中医又称

- A. 睢目
- B. 侵风
- C. 目
- D. 睑废
- E. 土疳

【答案】 ABD

2、漏睛疮的病因是

- A. 火疳缠绵不愈, 渐侵及黑睛而成
- B. 心经蕴热, 复感风邪所致
- C. 恣嗜烟酒, 过食肥甘之品而生
- D. 屈光不正, 白睛涩痛所致
- E. 风沙阳光长期刺激而成

【答案】 B

3、患者 60 岁, 视力逐渐下降, 晶体混浊, 头痛目涩, 口苦咽干, 大便秘结, 舌红苔薄黄, 脉弦。宜选方

- A. 石决明散
- B. 杞菊地黄丸
- C. 补中益气汤

D. 八珍汤

E. 归脾汤

【答案】A

4、患者,男,28岁,车祸外伤后3个月,视盘色淡近苍白,头痛健忘,舌暗红有瘀点,脉细涩。下列哪一方剂适用

A. 四物五子丸

B. 逍遥散

C. 归脾汤

D. 桃红四物汤

E. 明目地黄汤

【答案】D

5、患眼不慎溅入沸油,灼热剧痛,热泪频流,胞睑红赤浮肿,并见水疱;白睛红赤,黑睛大片翳障,证属

A. 气滞血瘀

B. 火毒犯目

C. 脓毒侵袭

D. 毒伤健眼

E. 风热犯目

【答案】B

6、房水排出眼球的主要通道是

- A. 角膜
- B. 虹膜
- C. 睫状体
- D. 晶状体
- E. 前房角

【答案】 E

【解析】

7、阴虚火旺所致眼病的内治法是

- A. 疏风清热法
- B. 泻火解毒法
- C. 疏肝理气法
- D. 祛风散寒法
- E. 滋阴降火法

【答案】 E

8、患者,男,35岁,视力下降,眼前黑影,视大为小,视物变性;黄斑水肿.渗出;兼见食少便溏.面黄无华.少气乏力,舌淡苔白,脉细,其治法为

- A. 益气养阴,化痰利水
- B. 补脾益肾,利水消滞
- C. 益气健脾,利水渗湿
- D. 补益肝肾,软坚散结

E. 滋阴养血, 行气散结

【答案】C

9、金疳与火疳的鉴别要点中, 不正确的是

A. 金疳位于白睛表层

B. 火疳位于白睛里层

C. 金疳为紫红色结节隆起

D. 火疳容易复发

E. 以上均不对

【答案】C

10、糖尿病最常见. 最严重的并发症为

A. 白内障

B. 虹膜睫状体炎

C. 视网膜病变

D. 青光眼

E. 角膜结膜炎

【答案】C

11、火疳后期, 眼痛轻, 白睛血丝紫暗, 局部结节隆起不甚, 全身潮热额红, 鼻干咽燥, 舌红少津, 脉细数, 应选用的方剂是

A. 龙胆泄肝汤

B. 清胃汤

- C. 养阴清肺汤
- D. 银翘散
- E. 化坚二陈汤

【答案】C

12、下列眼病具有传染性的是

- A. 睑弦赤烂
- B. 椒疮
- C. 粟疮
- D. 眼丹
- E. 针眼

【答案】B

13、麻痹性斜视时

- A. 双眼眼位上斜
- B. 双眼眼位外斜
- C. 患眼眼球斜向麻痹肌作用方向
- D. 患眼眼球斜向麻痹肌作用方向的对侧
- E. 患眼眼位不稳定

【答案】D

14、《秘传眼科龙木论》：“或因打筑，脑中恶血流下，渐入眼内，后经二三年间变成白翳，一如内障形状。”是指

- A. 青风内障
- B. 绿风内障
- C. 惊震内障
- D. 胎患内障
- E. 圆翳内障

【答案】C

15、针眼在未成脓期时不当挤压或可导致（）重症

- A. 胞生痰核
- B. 眼丹
- C. 睑弦赤烂
- D. 眶脓肿
- E. 睑脓肿

【答案】B

16、患者撞击伤目，血灌瞳神，久不消散，舌质紫黯，脉弦涩，治宜

- A. 疏肝解郁，止血散瘀
- B. 行气活血，祛瘀通络
- C. 疏肝理气，化痰散结
- D. 补益肝肾，活血明目
- E. 清热利湿，软坚散结

【答案】B

17、治疗暴露赤眼生翳属肝经风热证的主方是

- A. 石决明散
- B. 龙胆泻肝汤
- C. 小柴胡汤
- D. 新制柴连汤
- E. 银翘散

【答案】A

18、下列哪一种病不属于外障

- A. 漏睛
- B. 聚星障
- C. 混睛障
- D. 瞳神干缺
- E. 疣病

【答案】D

19、睫状充血与()有关

- A. 睫状前动脉
- B. 睫状后短动脉
- C. 睫状后短动脉

D. 视网膜中央动脉

E. 面动脉

【答案】 B

20、以下哪些眼病不属于内障眼病

A. 暴盲

B. 视瞻昏渺

C. 青盲

D. 混睛障

E. 云雾移睛

【答案】 D

21、冷泪长流, 多为

A. 外感风寒

B. 外感风热

C. 肝肾不足

D. 肺经虚热

E. 脾肾阳虚

【答案】 C

22、眼的附属器包括

A. 眼睑与角膜, 眼眶

- B. 视路, 眼睑, 泪器
- C. 眼眶, 玻璃体, 结膜
- D. 眼外肌, 晶状体
- E. 眼睑, 结膜, 泪器, 眼外肌, 眼眶

【答案】 E

23、慢性闭角型青光眼患者拒绝手术治疗, 长期应用毛果芸香破眼药水后自觉流泪和视昏, 眼部检查主要表现为

- A. 近视力下降
- B. 瞳孔散大
- C. 瞳孔缩小
- D. 角膜基质层混浊
- E. 视盘水肿

【答案】 C

24、双眼频频目眨, 不能自主, 病属

- A. 目劓
- B. 目瞤
- C. 风牵偏视
- D. 胞轮振跳
- E. 辘轳转关

【答案】 A

25、强调内外兼治,外治疗程至少 10——12 周以上的眼病为

- A. 眼丹
- B. 睑弦赤烂
- C. 针眼
- D. 椒疮
- E. 风赤疮痍

【答案】D

26、眼部针刺后出现皮下或眶内出血,应该

- A. 口服止血药
- B. 冷敷. 加压包扎
- C. 热敷. 加压包扎
- D. 立即平卧
- E. 转外科处理

【答案】B

27、天行赤眼患眼灼热刺痒, 碜涩疼痛, 羞明流泪, 眼眵稀薄, 白睛红赤有点片状溢血; 伴见发热头痛, 鼻塞流涕, 耳前颌下可扪及肿核; 舌质红, 苔薄黄, 脉浮数。治宜选用

- A. 驱风散热饮子加减
- B. 泻肺饮加减
- C. 泻白散加减
- D. 菊花决明散加减

E. 黄连解毒汤

【答案】A

28、房水总量约占眼内容积的(

A. 0.01

B. 0.02

C. 0.03

D. 0.04

E. 0.05

【答案】D

29、络损暴盲的主要特征是

A. 视网膜渗出

B. 视网膜脱离

C. 黄斑区樱桃红斑

D. 视网膜出血

E. 黄斑区水肿

【答案】D

30、人眼作为一个屈光系统,屈光作用最强的组织是

A. 玻璃体

B. 晶状体

- C. 巩膜
- D. 房水
- E. 角膜

【答案】E

31、第一次提出食用牛羊等动物肝脏具有明目作用的是

- A. 《外台秘要》
- B. 《备急千金要方》
- C. 《伤寒杂病论》
- D. 《银海精微》
- E. 《龙树眼论》

【答案】B

【解析】

32、以角膜映光法测斜视角时,若反光点偏角膜正中央的外侧,位于瞳孔缘,估计其斜视角约为

- A. 内斜 5°
- B. 内斜 10° —— 15°
- C. 内斜 25° —— 30°
- D. 外斜 5°
- E. 外斜 10° —— 15°

【答案】B

33、金疳发病病位在

- A. 巩膜
- B. 睑结膜
- C. 角膜
- D. 球结膜
- E. 虹膜

【答案】D

34、患者视力骤降,神膏混浊,视衣脱离,伴急躁易怒,失眠多梦,耳鸣如潮,口苦,舌红苔黄,脉弦数。宜选下列何方治疗

- A. 导赤散
- B. 龙胆泻肝汤
- C. 抑阳酒连散
- D. 泻心汤
- E. 以上都不是

【答案】B

35、绿风内障西医急救处理时使用 1%毛果芸香碱的目的是

- A. 抑制房水生成,降低眼压
- B. 利尿降压
- C. 缩小瞳孔
- D. 扩大瞳孔

E. 缓解疼痛

【答案】 C

36、冷泪长流, 多为

A. 外感风寒

B. 外感风热

C. 肝肾不足

D. 肺经虚热

E. 脾肾阳虚

【答案】 C

37、肝劳的主要临床表现如头眼胀痛等, 常在以下哪种情况下出现

A. 晨起后

B. 劳动后

C. 游泳后

D. 患肝病后

E. 久视后

【答案】 E

38、《证治准绳》的作者是

A. 傅仁宇

B. 倪维德

- C. 王肯堂
- D. 黄庭镜
- E. 黄岩

【答案】C

39、眼部针刺后出现皮下或眶内出血,应该

- A. 口服止血药
- B. 冷敷. 加压包扎
- C. 热敷. 加压包扎
- D. 立即平卧
- E. 转外科处理

【答案】B

40、以下哪项是云雾移睛的诊断依据

- A. 检眼镜彻照法下可见色泽不同, 形态各异的飘浮物
- B. 检眼镜彻照法下可见固定不动之阴影
- C. 检眼镜下可见视衣火焰状出血
- D. 检眼镜下见黄斑水肿浮起
- E. 检眼镜下见视盘充血水肿

【答案】A

41、以遮盖法检查斜视时, 遮盖右眼, 左眼注视, 将遮盖板迅速移遮左眼时, 若右眼移向鼻侧, 则属

- A. 外斜视
- B. 内斜视
- C. 旋转斜视
- D. 垂直斜视
- E. 眼球震颤

【答案】A

42、患眼痛甚, 视力下降明显, 白睛混赤, 神水混浊, 黄液上冲, 瞳神紧小如针孔; 伴口苦易怒; 舌红苔黄, 脉弦数。证属

- A. 肝胆火炽
- B. 肝经风热
- C. 阴虚火旺
- D. 湿热内蕴
- E. 风湿夹热

【答案】A

43、眼丹的热毒壅盛证主方是

- A. 犀角地黄汤
- B. 黄连解毒汤
- C. 仙方活命饮
- D. 托里消毒散
- E. 银翘散

【答案】 C

44、根据五轮学说,两眦属于

- A. 气轮
- B. 火轮
- C. 血轮
- D. 水轮
- E. 肉轮

【答案】 C

45、五轮学说中,黑睛属于()

- A. 肉轮
- B. 血轮
- C. 气轮
- D. 风轮
- E. 水轮

【答案】 D

46、胞睑红肿热痛,伴大便干结,多为

- A. 外感风热
- B. 阳明实火
- C. 脾胃湿热

D. 心火上炎

E. 肝胆火炽

【答案】B

47、下列西医学名称哪项不属于中医的视瞻昏渺

A. 中心性浆液性视网膜脉络膜病变

B. 中心性渗出性视网膜脉络膜病变

C. 年龄相关性黄斑病变

D. 虹膜炎

E. 视网膜色素变性

【答案】E

48、在距离视力表 3 米处看清 0.1 行视标时,其视力应记录为

A. 0.3

B. 0.03

C. 0.06

D. 0.1

E. 0.04

【答案】C

49、黑睛异物取出术后 3 天,患眼畏光流泪目痛,抱轮红赤.黑睛星翳,舌淡红,苔薄,脉浮数,治疗方选

A. 生蒲黄汤

- B. 祛瘀汤
- C. 石决明散
- D. 泻脑汤
- E. 血府逐瘀汤

【答案】 C

50、瞳神紧小最常见病因是

- A. 气滞血瘀
- B. 肝胆火炽
- C. 阴虚火旺
- D. 肝肾不足
- E. 肝阳上亢

【答案】 B

51、中医眼科从什么朝代开始独立成为一门专科

- A. 隋朝
- B. 唐朝
- C. 宋朝
- D. 元朝
- E. 明朝

【答案】 C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/146002101141010050>