

2024 年北京市顺义区《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库带答案 (培优 A 卷)

第 I 部分 单选题 (100 题)

1. 循证医学证据级别和强度最低的是

- A: 专家意见
- B: 大样本病案系列
- C: 单个样本随机对照试验
- D: 同质随机对照试验的系统评价

答案：A

2. 强烈刺激作用致胃肠黏膜腐蚀性损伤的是

- A: 氯化钠
- B: 磷化锌
- C: 氯化锌
- D: 磷化氢

答案：C

3. 某患者，女，45 岁，身高 160cm，体重 75kg，临床诊断为 2 型糖尿病。实验室检查：空腹血糖 8.7mmol/L，餐后 2 小时血糖 13.1mmol/L，糖化血红蛋白 7.1%。经饮食控制、规律锻炼，血糖控制仍未达到理想水平。

- A: 阿卡波糖
- B: 胰岛素
- C: 二甲双胍

D: 格列齐特

答案：C

4. 艾滋病的传播途径不包括

A: 性途径传播

B: 经血制品传播

C: 消化道传播

D: 经血传播

答案：C

5. 上市前临床试验观测的指标限于实验设计内容，其他临床指标容易忽视，属于

A: 考察不全面

B: 病例数目少

C: 管理漏洞

D: 观察时间短

答案：A

6. 服用胃动力药多潘立酮治疗消化不良，最佳用药时间是

A: 餐后

B: 餐后 1 小时

C: 餐前

D: 餐前 0.5~1 小时

答案：D

7. 用于癌性胸水

A: 静脉注射

B: 肌肉注射

C: 腔内注射

D: 动脉注药

答案：C

8. 糖尿病酮症酸中毒患者应选用

A: 胰岛素

B: 大剂量碘剂

C: 格列本脲

D: 二甲双胍

答案：A

9. 对急性心肌梗死引起的室性心律失常首选

A: 普萘洛尔

B: 地高辛

C: 硝酸酯类

D: 利多卡因

答案：D

10. 多巴胺受体激动剂

A: 苯海索

B: 左旋多巴

C: 司来吉兰

D: 恩托卡朋

答案：B

11. 患者，男，体检发现血清尿素氮升高、血肌酐升高，其他生化指标正常，该患者最可能患有

A: 肾脏疾病

B: 心脏疾病

C: 血液疾病

D: 肝脏疾病

答案：A

12. 普通处方一般不得超过几日用量

A: 3

B: 1

C: 7

D: 5

答案：C

13. 贫血常出现

A: 嗜酸性粒细胞增多

B: 血红蛋白减少

C: 血小板计数增高

D: 中性粒细胞增多

答案：B

14. 容易氧化的药物是

A: 青霉素类

B: 胃蛋白酶

C: 阿扑吗啡

D: 牛痘菌苗

答案：C

15. 根据时辰药理学，选择最适宜的给药时间，可增强药物疗效、避免不良反应、提高用药依从性避免导致肾上腺皮质功能下降的是

- A: 清晨服糖皮质激素
- B: 清晨服氨基糖苷类
- C: 清晨服抗抑郁药
- D: 清晨服利尿药

答案：A

16. 可以抑制菌群的繁殖，可造成球后神经炎的药物是（）

- A: 莫西沙星
- B: 氧氟沙星
- C: 异烟肼
- D: 乙胺丁醇

答案：D

17. 患者，女，61 岁，有痛风病史。间歇期服用别嘌醇、丙磺舒治疗时，又出现一次急性发作，此时应采取的治疗方法是

- A: 停用别嘌醇、丙磺舒，改用秋水仙碱
- B: 加大别嘌醇、丙磺舒剂量，加服秋水仙碱
- C: 加大别嘌醇、丙磺舒剂量，加服对乙酰氨基酚
- D: 减少别嘌醇、丙磺舒剂量，加服秋水仙碱

答案：D

18. 解救氰化物中毒的是

- A: 二巯丁二钠
- B: 亚硝酸异戊酯
- C: 盐酸戊乙奎醚
- D: 单价抗毒血清

答案：B

19. 服用头孢曲松、甲硝唑、氯丙嗪等应该禁用的是

- A: 烟
- B: 咖啡
- C: 酒
- D: 浓茶

答案：C

20. 氨基糖苷类抗生素排泄减慢

- A: 肾小球滤过减少
- B: 肾小管分泌减少
- C: 肾血流量减少
- D: 肾小管重吸收增加

答案：A

21. 重度哮喘的处理不包括

- A: 注射毛花苷 C（西地兰）
- B: 吸氧
- C: 给予糖皮质激素
- D: 补液

答案：A

22. （2015 年真题）为减少共济失调，幻觉及“宿醉现象”，老年失眠患者宜选用（）。

- A: 苯巴比妥
- B: 劳拉西泮
- C: 水合氯醛
- D: 佐匹克隆

答案：D

23. 服用他达拉非后，如果舌下含服硝酸甘油，建议服药间隔时间应为

- A: 48 小时
- B: 1 周
- C: 24 小时
- D: 4 小时

答案：A

24. 患者，男，35 岁，髋关节置换术后 7 天，患者右侧下肢肿胀、疼痛，抬高患肢后可好转。

- A: 氯吡格雷
- B: 利伐沙班
- C: 肝素
- D: 华法林

答案：A

25. 下列药物中，有效治疗浓度范围与中毒浓度范围相接近的是

- A: 四环素
- B: 阿托品
- C: 氯噻嗪
- D: 地高辛

答案：D

26. 某患者，女性，28 岁，近半年出现面色苍白、头晕、乏力，近日头晕加重，并出现心慌、气短，到医院就诊，血常规检查示 $Hb < 90g / L$ 。

- A: 巨幼细胞性贫血
- B: 缺铁性贫血

C: 溶血性贫血

D: 白血病

答案：B

27. COPD 气流受限严重程度分级的方法是

A: CHA, DS, -VAsE 评分

B: CTP 分级

C: FEV1 占预计值%

D: HAS-BLED 评分

答案：C

28. 以质量调整生命年或者质量调整预期寿命为量化指标所开展的药物经济学评价方法属于查

A: 成本-效益分析

B: 最小成本分析

C: 成本-效果分析

D: 成本-效用分析

答案：D

29. 维 A 酸与过氧苯甲酰联合应用治疗寻常痤疮时，正确的用法是（）

A: 睡前应用维 A 酸凝胶或乳膏，晨起洗漱后应用过氧苯甲酰凝胶

B: 睡前应用过氧苯甲酰凝胶，晨起洗漱后应用维 A 酸凝胶或乳膏

C: 将两种药物的凝胶或乳膏充分混合后同时应用

D: 两药的凝胶或乳膏间隔 2 小时交替使用

答案：A

30. （2015 年真题）细菌感染患者可出现（）。

A: 红细胞/血红蛋白减少

- B: 中性粒细胞增多
- C: 嗜酸性粒细胞增多
- D: 血小板增多

答案：B

31. 判别“大三阳”区别于“小三阳”的主要检查项目为

- A: 抗-HBs(+)
- B: 抗-HBc(+)
- C: 抗-HBe(+)
- D: HBeAg(+)

答案：D

32. 一般给予肠外营养物质的热氮比为

- A: NPC5: 5
- B: 150kcal: 1gN
- C: 100kcal: 1gN
- D: NPC7: 3

答案：B

33. (2016 年真题) 应在餐前服用的药物是 ()。

- A: 呋塞米片
- B: 氨茶碱片
- C: 吡罗昔康片
- D: 胶体果胶铋胶囊

答案：D

34. 吸附力强、可阻止毒物吸收的是

- A: 药用炭混悬液

B: 1%氯化钠溶液

C: 1%硫酸镁溶液

D: 淀粉溶液

答案：A

35. 属于选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂的是

A: 吗氯贝胺

B: 文拉法辛

C: 氟西汀

D: 阿米替林

答案：C

36. 患者，女，48 岁，身高 158cm，体重 72kg。最近因感觉易疲劳、怕冷、嗜睡、记忆力逐渐减退等情况前来就医。医生检查发现，患者眼睑和手部皮肤水肿，声音嘶哑、毛发稀落。实验室检查示：血清 TSH 水平升高。确诊为甲状腺功能减退症。

A: 甲巯咪唑

B: 碘化钾

C: L-T₄

D: 丙硫氧嘧啶

答案：C

37. 具有催吐作用，在无禁忌证前提下，可用于多种毒物中毒的催吐排毒药物是

A: 氯丙嗪

B: 昂丹司琼

C: 吗啡

D: 阿扑吗啡

答案：D

38. (2016 年真题) 患者，女，21 岁，未婚，患有甲状腺功能亢进症，应用丙硫氧嘧啶 150mg tid 治疗 4 个月后，出现体重增加，乏力，怕冷，突眼加重，治疗方案应该调整为 ()。

- A: 丙硫氧嘧啶减量并加甲状腺素片
- B: 换用另一种抗甲状腺药物
- C: 放射性 ^{131}I 治疗
- D: 加大丙硫氧嘧啶用量

答案：A

39. 与环丙沙星有相互作用合并使用应做血液浓度监测的药物是

- A: 茶碱片
- B: 异丙托溴铵气雾剂
- C: 沙丁胺醇气雾剂
- D: 孟鲁司特钠咀嚼片

答案：A

40. (2016 年真题) 药库接收了一批药品，其中需要在冷处贮藏的是 ()。

- A: 双歧三联活菌胶囊
- B: 硫普罗宁片
- C: 西地碘片
- D: 乳酶生片

答案：A

41. 服后有幻觉、精神错乱、眩晕、嗜睡、视力模糊

- A: 硝酸甘油

B: 金刚烷胺

C: 西咪替丁

D: 布洛芬

答案：B

42. 对混合型血脂异常，必须联合应用他汀类和贝丁酸类，最佳的给药方法是

A: 早晨服用贝丁酸类，晚上服用他汀类

B: 早、晚联合服用他汀和贝丁酸类

C: 早晨服用他汀类，晚上服用贝丁酸类

D: 晚上联合服用他汀类和贝丁酸类

答案：A

43. 怕热的药品

A: 可贮存于严密的药箱内

B: 可用玻璃瓶软木塞塞紧、蜡封、外加螺旋盖盖紧

C: 用棕色或黑色纸包裹的玻璃器包装

D: 根据不同性质要求，分别存放在阴凉处、凉暗处或冷处

答案：D

44. 二甲双胍用于非糖尿病患者的减肥

A: 超适应证用药

B: 非适应证用药

C: 盲目联合用药

D: 过度治疗用药

答案：A

45. 对伴有血管性水肿的荨麻疹可选用的药物是

- A: 赛庚啉
- B: 氯雷他定
- C: 氯苯那敏
- D: 泮托拉唑

答案：A

46. 规范处方行为与操作流程，归属

- A: 科学发展
- B: 环境与流程的优化与持续改进
- C: 管理规范到位
- D: 知识培训

答案：C

47. 应用铁剂的影响因素预防铁负荷过重，表现为铁的吸收与体内储存量有关，缺铁性贫血者的吸收率为

- A: 10%~20%
- B: 0.4
- C: 10%~30%
- D: 0.3

答案：D

48. 配制青霉素输液的适宜溶媒是()

- A: 复方氯化钠注射液
- B: 50%葡萄糖注射液
- C: 低分子右旋糖酐注射液
- D: 0.9%氯化钠注射液

答案：D

49. 吩噻嗪类抗精神病药中毒时若癫痫发作应给予

- A: 阿托品
- B: 地西泮
- C: 间羟胺
- D: 有机硫类

答案：B

50. IV 期临床试验样本数为

- A: 常见病 $\geq$ 2000 例
- B: 20~30 例
- C: 常见病 $\geq$ 1000 例
- D: 100~300 例

答案：A

51. 低盐饮食、避免情绪大波动，最适合于

- A: 骨质疏松
- B: 糖尿病
- C: 高血压
- D: 焦虑障碍

答案：C

52. 可显著升高 HDL-ch 的是

- A: 依折麦布
- B: 他汀类与烟酸联用
- C: 螺内酯
- D: 依曲康唑

答案：B

53. 宜于睡前服用的药品是

- A: 甲氧氯普胺
- B: 阿卡波糖
- C: 糖皮质激素
- D: 洛伐他汀

答案：D

54. 归属专业学术机构网站的是

- A: www.cmt.tom.cn
- B: [www.google](http://www.google.com)
- C: www.ashp.org
- D: www.merck.com

答案：C

55. 口服避孕药对机体代谢的影响，正确的为

- A: 甘油三酯降低
- B: 糖耐量异常
- C: 低密度脂蛋白升高
- D: 高密度脂蛋白降低

答案：B

56. 可以与多种金属离子结合发生沉淀，影响药物吸收的是

- A: 食盐中的氯化钠
- B: 食醋中的醋酸
- C: 茶叶中的鞣酸
- D: 酒中的乙醇

答案：C

57. 服用磺胺甲噁唑不宜同食

- A: 葡萄柚汁
- B: 食醋
- C: 咖啡
- D: 高蛋白食物

答案：B

58. 非核苷酸类 HIV 逆转录酶抑制剂（）

- A: FIs
- B: NRTIs
- C: NNRTIs
- D: PIs

答案：C

59. 患者，女，32 岁，2 天前无明显诱因出现尿频、尿急、尿痛，伴腰痛。查体：T38℃，肾区叩击痛。血常规见 WBC $15 \times 10^9 / L$ ，中性粒细胞百分比 85%。尿常规见尿液浑浊，尿蛋白阳性，镜检白细胞满视野。

- A: 选用肾毒性小、不良反应少的抗菌药物
- B: 如该患者为妊娠期，可选用氨苄西林
- C: 首选针对革兰阳性菌的药物
- D: 抗菌药物在尿和肾内的浓度要高

答案：C

60. 急性期

- A: 1 个月内
- B: 2 周
- C: 1~6 个月

D: 1~3 个月

答案：A

61. 属于非核苷类逆转录酶抑制剂的是（）

A: 利托那韦

B: 利巴韦林

C: 齐多夫定

D: 依非韦伦

答案：D

62. 以下哪项不是药物流产的适应证（）

A: 本人自愿、年龄>40 岁的健康女性

B: B 超确诊为宫内妊娠

C: 多次人工流产术史

D: 妊娠≤49 日

答案：A

63. 下列关于肾功能不全患者给药方案调整的方法，错误的是

A: 肾功能不全而肝功能正常者，可选用经双通道（肝、肾）消除的药物

B: 肾功能不全者首选经肝胆代谢和排泄的药物

C: 肾功能不全又必须使用明显肾毒性的药物时，可以延长给药间隔或减少给药剂量

D: 肾功能不全又必须使用明显肾毒性的药物时，可以同时服用碳酸氢钠以碱化尿液，促进药物排泄。防止药源性疾病

答案：D

64. 下列药物中，解救氰化物中毒的特效药是

- A: 维生素 C
- B: 维生素 K
- C: 亚甲蓝
- D: 氟马西尼

答案：C

65. 可造成肝脏损害，形成肝硬化或脂肪肝，减弱对药物的代谢速度的是

- A: 茶叶中的鞣酸
- B: 食醋中的醋酸
- C: 酒中的乙醇
- D: 食盐中的氯化钠

答案：C

66. 相互作用使药物吸收增加的联合用药是

- A: 阿托品联用吗啡
- B: 阿托品联用普萘洛尔
- C: 硝苯地平联用普萘洛尔
- D: 铁剂联用维生素

答案：D

67. 下列药物中服用后不影响驾驶行为的是（）

- A: 左甲状腺素钠片
- B: 阿米洛利片
- C: 氟桂利嗪胶囊
- D: 东莨菪碱片

答案：A

68. 患者，男性，80 岁，患有帕金森病伴闭角型青光眼，近 2 个月出现尿频、尿急、夜尿增多，无法控制。诊断为急迫性尿失禁，给予米拉贝隆治疗。药师应告知患者药物的主要不良反应是

- A: 直立性低血压
- B: 鼻咽炎和尿路感染
- C: 卧位和坐位时高血压
- D: 口干、便秘、尿潴留

答案：B

69. 大剂量易引起碱血症的抗酸药是

- A: 莫沙必利
- B: 西沙必利
- C: 奥美拉唑
- D: 碳酸氢钠

答案：D

70. 高血压合并冠心病，偶发窦性心动过速宜选用的药物是

- A: 缬沙坦
- B: 氢氯噻嗪
- C: 非洛地平
- D: 美托洛尔

答案：D

71. (2019 年真题) 下列通用名与别名的组合中，不是同一种药品的是

- A: 醋酸氯己定与洗必泰
- B: 利可君与利血生
- C: 氨甲苯酸与止血敏
- D: 桂利嗪与脑益嗪

答案：C

72. 依据生物钟规律，适宜睡前服用的药品是

- A: 氟伏沙明
- B: 苯海拉明
- C: 沙丁胺醇
- D: 奥利司他

答案：C

73. 融合抑制剂

- A: 依非韦伦
- B: 齐多夫定
- C: 利托那韦
- D: 利巴韦林

答案：D

74. 属于钙通道阻滞剂（第Ⅳ类）的抗心律失常药是

- A: 维拉帕米
- B: 拉贝洛尔
- C: 胺碘酮
- D: 美西律

答案：A

75. 下列药品中，归属妊娠毒性药物 D 级的是

- A: 雷尼替丁
- B: 卡马西平
- C: 二甲双胍
- D: 泮托拉唑

答案：B

76. 可主要引起嗜酸性粒细胞增多的疾病为

A: 过敏性疾病如支气管哮喘、荨麻疹等

B: 胃溃疡

C: 肾移植术后发生排斥反应

D: 糖尿病

答案：A

77. 属于容积性泻药的是

A: 硫酸镁

B: 开塞露

C: 乳果糖

D: 番泻叶

答案：A

78. 药师对药品不良事件、新药上市后被召回或撤市的案例应及时掌握，不能松懈

A: 替加色罗

B: 培高利特

C: 塞来昔布

D: 钆贝葡胺

答案：D

79. 老年糖尿病患者宜选用的药物是

A: 二甲双胍

B: 罗格列酮

C: 格列喹酮

D: 阿卡波糖

答案: D

80. 用于缓解胆石症患者疼痛症状的药物是

A: 复方阿嗟米特

B: 头孢曲松与甲硝唑联用

C: 匹维溴铵

D: 脂肪乳

答案: C

81. 患者，男，27 岁，电话咨询药师朋友，告知目前正在欧洲旅游，从昨夜开始出现腹泻，呈水样便，起夜 4 次，希望药师给出建议。有关药师给予该患者的建议，错误的是

A: 避免高脂肪、高糖饮食

B: 口服左氧氟沙星胶囊 0.2gtid

C: 口服补液盐 ORSIII 50ml/kg，4~6h 内服完

D: 口服双八面体蒙脱石散，与抗菌药物同服

答案: D

82. (2018 年真题) 患者，女，68 岁，体重 45kg，因发热、咳嗽咳痰入院治疗，临床诊断为社区获得性肺炎。化验结果：白细胞计数

$11.76 \times 10^9/L$ ，肌酐清除率 18ml/min。该患者使用下列抗菌药物治疗时不需要减量的是 ()

A: 莫西沙星

B: 左氧氟沙星

C: 阿莫西林

D: 头孢噻肟钠

答案: A

83. 下列药品中，妊娠期妇女禁用的是

- A: 维生素 A
- B: 葡萄糖酸钙
- C: 拉贝洛尔
- D: 环丙沙星

答案：D

84. 发热血常规检查白细胞计数低于正常值，可能有

- A: 细菌感染
- B: 麻疹
- C: 感冒
- D: 病毒感染

答案：D

85. 用于抗结核杆菌的药物是

- A: 庆大霉素
- B: 异烟肼
- C: 新霉素
- D: 妥布霉素

答案：B

86. 可用于强心苷类中毒后快速型心律失常的药物是

- A: 阿托品
- B: 胺碘酮
- C: 利多卡因
- D: 异丙肾上腺素

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

答案：C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/146045240102011030>