

2024 年四川省石渠县《执业药师之西药学综合知识与技能》考试王牌题库【原创题】

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 患者，女性，50 岁，因咳嗽时漏尿明显就诊，患者既往生育史为剖宫产 2 胎，既往有咳嗽，漏尿症状，现症状明显加重，负重后均有尿液流出，每日需用卫生巾 1~2 片。经相关检查确诊为压力性尿失禁，给予米多君治疗。药师应告知患者药物的主要不良反应是

- A: 鼻咽炎和尿路感染
- B: 直立性低血压
- C: 卧位和坐位时高血压
- D: 口干、便秘、尿潴留

答案：C

2. 用药与反应发生时间关系密切，有文献资料佐证；但引发 ADR 的药物不止一种，或原患疾病病情进展因素不能除外；ADR 因果关系可评价为

- A: 可能无关
- B: 可能
- C: 很可能
- D: 待评价

答案：B

3. 哺乳期妇女应用下列药物会对乳婴产生何种不良影响，长期服用阿司匹林

- A: 可能致胎儿畸形

- B: 可能引起乳婴视神经损害、智力障碍
- C: 导致新生儿血钙过高
- D: 可引起过期妊娠、产程过长和产后出血

答案：D

4. 下列关于药物对孕妇的影响哪一项是错误的
- A: 受精后 3 周至 3 个月接触药物，最易发生先天畸形
 - B: 受精后半个月内，几乎见不到药物的致畸作用
 - C: 孕妇不应过量服用含咖啡因的饮料
 - D: 孕妇患有结核、糖尿病应绝对避免药物治疗以防胎儿畸形

答案：D

5. 能客观地反映过去 3 个月内平均血糖水平的指标是 ()
- A: TG
 - B: LDL-C
 - C: HbA1c
 - D: HDL-C

答案：C

6. 患者，女，64 岁，患 2 型糖尿病，高脂血症，给予二甲双胍肠溶片 0.5gtidpo，瑞格列奈片 1mg tidpo，阿托伐他汀钙片 20mg qdpo 等药物治疗。

- A: 开启使用中的低精蛋白锌胰岛素必须放入冷藏保存
- B: 每 3~5 天调整 1 次
- C: 根据血糖水平调整低精蛋白锌胰岛素用量
- D: 每次调整 1~4 单位

答案：A

7. (2015 年真题) 治疗大肠埃希菌所致的尿路感染，不宜选用的抗菌药是 ()。

- A: 左氧氟沙星
- B: 阿奇霉素
- C: 头孢呋辛
- D: 阿莫西林

答案：B

8. 第一类精神药品处方印刷用纸的颜色是

- A: 淡黄色
- B: 淡红色
- C: 淡绿色
- D: 淡橙色

答案：B

9. 患者，女，1 岁 6 个月，因感冒发热到医院就诊，医生处方对乙酰氨基酚滴剂，药师误发成对乙酰氨基酚片，患者家属拿到药品后不知如何使用，故询问药师，此时药师发现发错了药。针对该类型差错，有效的防范措施是 ()

- A: 采用两种方式核对患者身份
- B: 使用药片通用名
- C: 双人核对
- D: 采用电子处方系统

答案：C

10. 急性乙醇中毒的分期大致可分为 ()。

- A: 兴奋期、共济失调期和昏睡期
- B: 兴奋期和昏睡期

C: 兴奋期和共济失调期

D: 共济失调期和昏睡期

答案: A

11. 吩噻嗪类抗精神病药中毒的临床表现是 ()

A: 明显的锥体外系症状

B: 谵妄、躁狂、幻觉

C: 心血管毒性

D: 肌肉震颤、抽搐

答案: A

12. 患者男性，35 岁，髋关节置换术后 7 天，患者右侧下肢肿胀、疼痛，抬高患肢后可好转。

A: 肺动脉栓塞

B: 病理性骨折

C: 下肢深静脉血栓形成

D: 下肢动脉栓塞

答案: C

13. 可提示完全梗阻性黄疸的是

A: $STB 17.1 \mu\text{mol/L} \sim 34.2 \mu\text{mol/L}$

B: $STB > 342 \mu\text{mol/L}$

C: $STB 34.2 \mu\text{mol/L} \sim 171 \mu\text{mol/L}$

D: $STB 17.1 \mu\text{mol/L} \sim 171 \mu\text{mol/L}$

答案: B

14. 脑梗死的治疗药物，抗凝治疗

A: 阿替普酶

- B: 甘露醇
- C: 阿司匹林
- D: 普通肝素

答案：D

15. 如发现“仙牛健骨颗粒”Ⅲ期临床试验过程连续发生严重不良事件，确认后暂停其试验

- A: 发现与规避假、劣药流入市场
- B: 药品上市前风险评估
- C: 药品上市后风险评估
- D: 发现药品质量问题

答案：B

16. 在应用碘解磷定时的注意事项中哪一项是错误的

- A: 对毒蕈碱样作用和防止呼吸中枢抑制的作用较差
- B: 用量过大、注射过快或未经稀释直接注射均可引起中毒
- C: 在碱性溶液中易水解为氰化物，故忌与碱性药物配伍
- D: 对有机磷农药急、慢性中毒均有效

答案：D

17. 对目标适应证患者(多中心试验)治疗作用的初步评价试验阶段，属于

- A: Ⅲ期临床试验
- B: Ⅳ期临床试验
- C: Ⅱ期临床试验
- D: Ⅰ期临床试验

答案：C

18. 与甲氧苄啶组成复方制剂复方新诺明的药物是

- A: 替硝唑
- B: 磺胺甲噁唑
- C: 磺胺多辛
- D: 磺胺嘧啶

答案：B

19. 适用于高血压伴前列腺增生症的高血压患者服用的药物是

- A: 阿利吉仑
- B: 氢氯噻嗪
- C: 多沙唑嗪
- D: 阿替洛尔

答案：C

20. 患者，男性，36 岁，主因“反复上腹部疼痛 3 年，加重伴黑便 2 天”以“胃溃疡”收住入院。患者于入院 3 年前，餐后偶感上腹部隐痛不适，曾在当地医院做胃镜检查示“胃溃疡”。经住院给予对症治疗（具体药物及剂量不详）后症状有所好转。入院前 2 天开始，上述症状发作较为频繁，以胃灼痛为主，多以辛辣刺激及不良饮食为诱因，伴反酸及暖气，并伴有黑便，呈糊状，共排 3 次，每次约 250g 左右，同时伴有恶心。患者自发病以来，无头晕及头痛，有恶心但无呕吐，无胸闷及心慌，无咳嗽及咳痰，无腹泻，体重未见明显增减。查体：T36.2℃、P84 次/分、R20 次/分、BP110/70mmHg，腹平软，未见腹壁静脉显露及胃肠型和蠕动波，中上腹压痛但无反跳痛，肝、脾未扪及，肝、肾区无叩痛，移动性浊音阴性，肠鸣音 3~5 次/分。辅助检查：①便常规：红细胞满视野，隐血阳性；②胃镜检查：胃壁左侧有 1.5cm×2cm 椭圆形溃疡；③尿素酶试验（+）。诊断结论：胃溃疡合并上消化道出血，幽门螺杆菌感染。

- A: 优先选择法莫替丁 20mgqn, 疗程 8 周
- B: 优先选择艾司奥美拉唑 20mgqd, 疗程 4 周
- C: 优先选择法莫替丁 20mgbid, 疗程 8 周
- D: 优先选择艾司奥美拉唑 20mgqd, 疗程 6 周

答案: B

21. 能够影响叶酸利用障碍的药物有

- A: 秋水仙碱
- B: 甲氨蝶呤
- C: 苯乙双胍
- D: 二甲双胍

答案: B

22. 患者，男，32 岁，因细菌性扁桃体炎口服阿莫西林胶囊，出现全身瘙痒。立即停药，无特殊治疗，患者症状逐渐好转，未再给予阿莫西林胶囊治疗。该 ADR 的因果关系评价结果是

- A: 很可能
- B: 可能无关
- C: 可能
- D: 肯定

答案: A

23. 适宜于餐前给药的药物是

- A: 缬沙坦
- B: 二甲双胍
- C: 法莫替丁
- D: 复方铝酸铋

答案: D

24. 患者，女，20 岁，1 天前淋雨后受凉，初始感咽痒、咽干，随后感咽部疼痛，吞咽时更为明显，伴刺激性咳嗽，无发热、畏寒、寒战。查体：T36.5℃，P70 次/分，R18 次/分，BP135/80mmHg。鼻咽黏膜光滑，咽隐窝无异常分泌物；双侧扁桃体 I 度肿大，表面光滑，未见脓性分泌物；颈部未及肿大淋巴结。采用改良 Centor 评分：患者，20 岁，无发热，伴咳嗽，无扁桃体渗出或肿胀，无颈前淋巴结肿痛；改良 Centor 评分为 0 分。药师对该患者的建议，错误的是

- A: 告知患者不要强行发声
- B: 避免环境温度突然变化
- C: 建议口服阿莫西林胶囊 500mgbid，疗程 10d
- D: 可服用布洛芬混悬液止痛

答案：C

25. 双膦酸盐属于

- A: 骨形成刺激剂
- B: 激素替代剂
- C: 促进骨矿化剂
- D: 骨吸收抑制剂

答案：D

26. 同时使用 5 种药物，药物不良事件的发生率为

- A: 0.5
- B: 0.13
- C: 0.38
- D: 0.68

答案：C

27. 下列口服降糖药中，最适宜餐后血糖 (PBG) 高者选用的口服降糖药是

- A: 格列吡嗪
- B: 格列本脲
- C: 格列齐特
- D: 格列美脲

答案：A

28. (2019 年真题) 儿童退热的用药选择和单次用量，正确的是

- A: 对乙酰氨基酚 25~50mg/kg
- B: 阿司匹林 30~60mg/kg
- C: 对乙酰氨基酚 10~15mg/kg
- D: 布洛芬 0.4-0.6g (12 岁以上儿童)

答案：C

29. 患者，男，27 岁，电话咨询药师朋友，告知目前正在欧洲旅游，从昨夜开始出现腹泻，呈水样便，起夜 4 次，希望药师给出建议。有关药师给予该患者的建议，错误的是

- A: 口服双八面体蒙脱石散，与抗菌药物同服
- B: 口服补液盐 ORSIII 50ml/kg，4~6h 内服完
- C: 口服左氧氟沙星胶囊 0.2gtid
- D: 避免高脂肪、高糖饮食

答案：A

30. 类风湿关节炎的治疗目标除了控制症状，更为关键的是应用改善病情的药物，以延缓病情发展，避免致残。下列属于改善病情的抗风湿药是

- A: 抗疟药

- B: 阿达木单抗
- C: 对乙酰氨基酚
- D: 泼尼松

答案：A

31. 关于新型抗凝药物，下列说法不正确的是
- A: 达比加群酯直接作用于凝血酶(主要是 IIa 因子)
 - B: 需监测 INR
 - C: 可特异性阻断凝血瀑布中的某关键环节
 - D: 与食物和药物相互作用小

答案：B

32. “控制被经济利益所驱动的过度药物治疗”体现选择治疗药物的
- A: 安全性
 - B: 有效性
 - C: 方便性
 - D: 经济性

答案：D

33. 促进肾小管对钠的重吸收，引起高血压的药物是
- A: 伪麻黄碱
 - B: 咖啡因
 - C: 糖皮质激素
 - D: 重组人促红细胞生成素

答案：C

34. 药师应告知医师"合理用药信息"的事例是
- A: 培氟沙星引起跟腱炎、合用糖皮质激素可致跟腱断裂

B: 长时间、大剂量应用头孢菌素类引起牙龈出血、手术创面渗血等反应

C: 氟西汀或帕罗西汀与异烟肼等单胺氧化酶抑制剂合用引起 5 羟色胺综合征

D: 他汀类药物合用吉非贝齐或烟酸致横纹肌溶解症

答案: B

35. 患者，男，54 岁，主因乏力、纳差 20 天就诊。患者在 20 天前无明显诱因出现乏力、纳差，偶有腹部隐痛。于当地医院检查乙肝五项示 HBsAg (+)，HBeAb (+)，HBcAb (+)；丙肝抗体 (-)。HBV-DNA 5.3×10^6 copies / ml。肝功能指标：ALT 60.7U / L，AST 55.9U / L，ALB 39.4g / L，TBIL 13.4 μ mol / L。在 20 年前因“急性黄疸”住院治疗，化验乙肝病毒阳性。诊断慢性病毒性肝炎（乙型）。给予恩替卡韦 0.5mg，每日 1 次进行治疗。

A: 阿昔洛韦

B: 葡醛内酯

C: 乙型肝炎疫苗

D: 利巴韦林

答案: B

36. 治疗过敏性结膜炎可选用的药物是 ()

A: 色甘酸钠滴眼液

B: 氧氟沙星滴眼液

C: 酞丁安滴眼液

D: 羟甲基纤维素钠滴眼液

答案: A

37. 骨髓增生病

- A: 白细胞增多
- B: 红细胞沉降率减慢
- C: 血小板增多
- D: 淋巴细胞增多

答案：C

38. 对中重度痤疮伴感染显著者推荐使用

- A: 0.03%维 A 酸乳膏剂
- B: 10%过氧苯甲酰凝胶
- C: 红霉素-过氧苯甲酰凝胶
- D: 0.1%阿达帕林凝胶

答案：D

39. 痛风急性发作期应禁用的药物是

- A: 碳酸氢钠
- B: 秋水仙碱
- C: 布洛芬
- D: 别嘌醇

答案：D

40. 缓泻药连续使用的时间一般不应超过

- A: 7 日
- B: 10 日
- C: 5 日
- D: 3 日

答案：A

41. 患者,男,40 岁,因感冒所致鼻塞到药店购药,药师应推荐的药品是()

- A: 酚麻美敏片
- B: 氯苯那敏片
- C: 萘甲唑啉滴鼻液
- D: 对乙酰氨基酚片

答案：C

42. 毒物种类很多，中毒方式各异，虽然有的毒物中毒尚无特效解毒药，但救治原则基本相同。

- A: 苯巴比妥
- B: 硝西泮
- C: 阿米替林
- D: 卡马西平

答案：B

43. 可导致体重增加的抗癫痫药是

- A: 丙戊酸钠
- B: 苯妥英钠
- C: 卡马西平
- D: 拉莫三嗪

答案：A

44. 并不存在风险，目前不需采取措施；评判为

- A: 确认
- B: 验证
- C: 驳倒
- D: 待验证

答案：C

45. 茶碱、咖啡因、可卡因等容易引起癫痫发作，属于

- A: 药源性肾损害
- B: 药源性血损害
- C: 药源性神经损害
- D: 药源性肝损害

答案：C

46. 胰岛素的给药时间适宜餐前 5~10 分钟给药的胰岛素制剂种类是

- A: 精蛋白锌胰岛素
- B: 普通胰岛素
- C: 赖脯胰岛素
- D: 门冬胰岛素

答案：D

47. (2015 年真题) 患儿，女，4 岁半，身高 110cm，体重 15kg，一天前开始发热 (39.1℃)，咽稍痛，无咳嗽，无吐泻，家长在家选用退烧药对症治疗。发热 20h 左右出现腹泻，约 2~3h 一次大便，量少，黄色粘液便，呕吐 1 次。体格检查，T38.8℃，P118 次/分，R28 次/分，咽微充血。出现轻微脱水症状。双肺呼吸音清，腹平软，肝脾未触及，肠鸣音活跃。实验室检查：WBC $18.5 \times 10^9/L$ (参考值 $4.0 \times 10^9 \sim 10.0 \times 10^9$)，粪便镜检可见红、白细胞。

- A: 洛哌丁胺
- B: 药用炭
- C: 鞣酸蛋白
- D: 小檗碱

答案：A

48. 根据血红蛋白含量评估缺铁性贫血程度轻度贫血为

- A: 60~90g / L
- B: 90~120g / L
- C: 120~160g / L
- D: 30~60g / L

答案：B

49. 理论效价的表示中，以其特定的“盐”1 μ g 作为 1IU 抗生素是

- A: 盐酸四环素
- B: 土霉素
- C: 红霉素
- D: 链霉素

答案：A

50. 属于超适应证用药的是

- A: I 类手术切口应用第三代头孢菌素
- B: 食管癌应用顺铂、氟尿嘧啶、表柔比星进行治疗
- C: 黄体酮用于排除结石
- D: 肠炎、细菌感染性腹泻同时应用小檗碱、双八面体蒙脱石散、盐酸地芬诺酯进行治疗

答案：C

51. 患者，男，42 岁，近期出现烧心（胃灼热）、咳嗽、胸痛症状，疑似胃食管反流病。可作为胃食管反流病的初步诊断方法是给予 1~2 周、每日 2 次标准剂量的

- A: 阿司匹林
- B: 硝酸甘油
- C: 西咪替丁
- D: 艾司奥美拉唑

答案：D

52. 患者,男,80岁,因发热、咳嗽、咳痰2天就诊诊断为社区获得性肺炎,给予左氧氟沙星、甘草合剂、氨溴索、对乙酰氨基酚、维生素C等治疗。患者用药3天后出现失眠、烦躁不安等症状最可能引起该症状的药物是()

- A: 甘草合剂
- B: 氨溴索
- C: 左氧氟沙星
- D: 对乙酰氨基酚

答案：C

53. 易风化的药物是()。

- A: 硫酸镁
- B: 青霉素
- C: 胃蛋白酶
- D: 硝酸甘油

答案：A

54. 可用于氰化物中毒的药物是

- A: 乙酰胺
- B: 亚硝酸钠
- C: 维生素K1
- D: 碘解磷定

答案：B

55. (2017年真题)下列关于烫伤救治措施的说送正确的是()

- A: I度烫伤可冷敷后外涂烧伤膏

- B: 烫伤患者的镇痛镇静药物首选氯丙嗪
- C: 创面及时外涂甲紫溶液预防感染
- D: 可用清洁塑料薄膜覆盖创面,以防创面感染

答案: A

56. 在夏季，用前宜其置入冰水或冰箱中 10~20 分钟；给药后 1~2 小时内尽量不排尿

- A: 膜剂
- B: 泡腾片
- C: 阴道栓剂
- D: 气雾剂

答案: C

57. 患者，男，50 岁，主诉咳嗽，症状持续 8 天，现在每次咳嗽都伴有黄痰，由于咳嗽感到疲劳和睡眠困难，近期末患其他疾病。患者 14 岁的儿子最近患轻度感冒，无恶心、呕吐、发热及畏寒。既往史：服用赖诺普利控制高血压、服用阿托伐他汀治疗高脂血症、服用小剂量阿司匹林预防脑卒中。查体：体温 37.1℃、心率 70 次 / 分、血压 130 / 70mmHg、呼吸 18 次 / 分，动脉血氧饱和度为 98%，肺部可闻及喘鸣音。

- A: 沙丁胺醇
- B: 右美沙芬
- C: 喷托维林
- D: 阿莫西林

答案: B

58. 患者，女，40 岁，既往有风湿性心脏病病史，近 2 年来出现劳累性呼吸困难，1 天前因受凉出现发热、咳嗽，咳粉红色泡沫样痰，不能平卧。查体：半卧位，口唇发绀，两肺大量水泡音及哮鸣音。

- A: 硝普钠
- B: 多索茶碱
- C: 毛花苷丙
- D: 硝苯地平

答案：C

59. 铅中毒

- A: 5%碳酸氢钠溶液
- B: 1%氯化钠溶液
- C: 1%硫酸镁溶液
- D: 药用炭混悬液

答案：C

60. 抑制胃酸分泌作用的药物是

- A: 西沙必利
- B: 碳酸氢钠
- C: 奥美拉唑
- D: 莫沙必利

答案：C

61. 下列医学检查项目中，可用于诊断急性心肌梗死的是

- A: 尿淀粉酶增高
- B: 肌酸激酶增高
- C: 血淀粉酶增高
- D: 胆碱酯酶增高

答案：B

62. 随着人均寿命的提高和人民生活水平的提高，对待疾病的观念也逐渐从治疗转变为预防，通过服用营养保健品来预防疾病的人群日益增加，下列相关说法错误的是

- A: 应有针对性地挑选合适的补充剂才能发挥营养成分的最佳效果
- B: 合理饮食是获取营养成分最简单有效的途径
- C: 复合维生素一般适合于饮食不规律者、多数孕妇、老年人和儿童
- D: 遗传因素对健康长寿起到了决定性作用

答案：D

63. 关于透析患者使用磷结合剂的下列叙述错误的是

- A: 透析患者服用钙剂的量大时易出现高钙血症
- B: 透析患者服用钙剂必须在进食的同时服用
- C: 透析患者服用磷结合剂的钙剂目的是为了补钙
- D: 高磷血症会导致心脏、血管的钙化

答案：C

64. 适宜于清晨服用的药物是

- A: 氢化可的松
- B: 舒林酸
- C: 西咪替丁
- D: 沙丁胺醇

答案：A

65. 病例对照研究试验结果属于循证医学证据级别

- A: 1 级证据
- B: 3 级证据

C: 4 级证据

D: 2 级证据

答案: B

66. 具有解热镇痛抗炎作用，镇痛作用较强、对胃肠道刺激性小的是

A: 阿司匹林

B: 布洛芬

C: 吲哚美辛

D: 贝诺酯

答案: B

67. 因不良反应很小，可在老年人群中使用的治疗失眠症药物为 ()

A: 雷美尔通

B: 米氮平

C: 艾司唑仑

D: 佐匹克隆

答案: A

68. 心力衰竭的支气管哮喘禁用

A: RAAS 抑制剂

B: β 受体阻断剂

C: 利尿剂

D: 强心苷

答案: B

69. “滴、量滴、滴剂”的外文缩写为 ()。

A: gtt

B: Add

C: qod

D: Ad

答案：A

70. 妊娠期使用某些药物可能导致胎儿发育异常，其中最容易受到药物影响，可能产生形态或者功能上异常而造成胎儿畸形的阶段是

A: 妊娠 28~32 周

B: 妊娠 1~2 周

C: 妊娠 3~12 周

D: 妊娠 13~27 周

答案：C

71. 青蒿素与乙胺嘧啶联用增效的机制是

A: 竞争性拮抗作用

B: 促进机体的利用

C: 作用于不同的靶点

D: 延缓或降低抗药性

答案：D

72. 患者，女，34 岁，因易疲劳、体重增加、反应迟钝、肌肉痉挛就诊。化验结果显示 TSH 增高，TT4 降低。临床诊断为甲状腺功能减退症。药师对该患者的用药指导和教育，错误的是

A: 治疗初期每 4~6 周测定甲状腺激素指标，然后根据检查结果调整给药剂量

B: 左甲状腺素钠片应于早餐前 1 小时，空腹将 1 日剂量一次性用水送服

C: 若出现手抖、心悸、心律不齐、多汗、腹泻、体重下降、失眠和烦躁，必要时需停药，直至不良反应消失后，再从更小的剂量开始

D: 推荐使用甲状腺激素含量稳定的甲状腺素片

答案：D

73. 较易导致肾损伤的药品是

A: 氯化钾

B: 新霉素

C: 阿米卡星

D: 酮康唑

答案：B

74. 单纯餐后血糖高，而空腹和餐前血糖不高的 2 型糖尿病患者首选

A: 比格列酮

B: 二甲双胍

C: 阿卡波糖

D: 格列喹酮

答案：C

75. 验证药物对目标适应证患者的治疗作用和安全性是指

A: 临床预试验

B: II 期临床试验

C: I 期临床试验

D: III 期临床试验

答案：D

76. 伴有过敏性鼻炎、阿司匹林哮喘可选用的药物是

A: 异丙托溴铵

B: 孟鲁司特

C: 沙美特罗

D: 沙丁胺醇

答案：B

77. 收缩血管平滑肌，引起高血压的药物是

A: 伪麻黄碱

B: 咖啡因

C: 糖皮质激素

D: 重组人促红细胞生成素

答案：A

78. 易经乳汁分泌药物的特性是

A: 蛋白结合率高

B: 脂溶性高

C: 分子量大

D: 弱酸性

答案：B

79. (2018 年真题) 可以引起视物模糊、红绿色视野受限的药物是 ()

A: 异烟肼

B: 对氨基水杨酸钠

C: 乙胺丁醇

D: 链霉素

答案：C

80. 避免与辛伐他汀合用的药物是 ()

A: 美罗培南

B: 克拉霉素

C: 万古霉素

D: 头孢哌酮

答案: B

81. 三叉神经痛，应选的药物是

A: 卡马西平片

B: 羟考酮缓释片

C: 芬太尼透皮贴剂

D: 对乙酰氨基酚片

答案: A

82. 静滴、静注不良反应发生率较高

A: 生理因素

B: 生活和饮食习惯

C: 药物的使用

D: 药物制剂因素

答案: C

83. 延缓胃排空，影响同服药物吸收的是

A: 阿司匹林

B: 丙磺舒

C: 丙胺太林

D: 西沙必利

答案: C

84. 患者，男，69岁，BMI27.8kg/m²，既往有骨性关节炎病史。近期爬山后，再次出现膝关节疼痛，患者热敷后疼痛未缓解，前来咨询如何选用“止痛药”。

A: 疼痛加重时，可将止痛药嚼碎服用

- B: 应适当减轻体重
- C: 遵医嘱，不得自行增加剂量
- D: 注意关节保暖

答案：A

85. 实施静脉注射给药时，不宜选用 0.9% (g / ml) 氯化钠注射液做溶媒溶解的药品是

- A: 阿昔洛韦
- B: 苯妥英钠
- C: 头孢菌素
- D: 氟罗沙星

答案：D

86. 磺胺类药物用于抗感染不宜食用的是

- A: 食盐
- B: 脂肪
- C: 蛋白质
- D: 食醋

答案：D

87. 减轻前列腺张力和膀胱出口梗阻的是 ()

- A: 度他雄胺
- B: 哌唑嗪
- C: 特拉唑嗪
- D: 索利那新

答案：C

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

88.（2015 年真题）患者，女。62 岁，医师处方如下：

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/146050021220011030>