

氨基糖苷类的抗结核药是（ ）

A、链霉素

（ ）是最常见的小区取得性感染

A、急性上呼吸道感染

氨基糖苷类抗生素不宜与呋塞米合用的原因是（ ）

A、呋塞米增加其耳毒性

对尚未发生侵袭性真菌感染的高危患者进行（ ）

A、预防性治疗

对厌氧菌无效的药物是（ ）

A、克林霉素

对厌氧菌无效的药物是（ ）

A、克林霉素

对于实行隧道式血管导管或药盒置入术的患者，提议（ ）

A、不推荐预防用药

对于实行积极脉内支架植入术的高危患者，提议预防性使用抗菌药物（ ）次

A、1

有关白喉抗毒素说法正确的是（ ）

A、青霉素不可替代白喉抗毒素

有关脓胸的治疗标准，论述有误的是（ ）

A、慢性脓胸患者可口服给药，若无好转可静脉给药

有关社区取得性肺炎的治疗标准，论述有误的是（ ）

A、重症患者选用口服药，若临床体现无明显改进可肌肉注射

有关碳青霉烯类抗菌药物在小朋友群体中应用说法错误的是（ ）

A、不小于6月龄小朋友的碳青霉烯类抗菌药物临床应用适应证与成人相仿

有关头霉素类药物的使用注意事项说法错误的是（ ）

A、不推荐头孢西丁用于<6个月的婴儿

经验治疗动物咬伤，宜选药物为（ ）

A、阿莫西林/克拉维酸

抗菌药物品种的选用，标准上应依照病原菌种类及病原菌对抗菌药物敏感性，即

（ ）而定

A、药敏试验成果

可诱发红斑狼疮的抗真菌药物是（ ）

A、灰黄霉素

流行性脑脊髓膜炎患者家庭的小朋友，可预防性予以下列哪种抗菌药物

A、利福平

葡萄球菌性烫伤样综合症的病原体为（ ）

A、产毒素金黄色葡萄球菌

侵袭性真菌病的治疗疗程一般较长，需要考虑患者的免疫状态、感染病原菌和药

物种类，一般在（ ）周或以上

A、6~12

时间依赖性抗菌药如青霉素类、头孢菌素类和其他β-内酰胺类、红霉素、克林霉

素等，应（ ）给药

A、一日数次

实行心脏射频消融术的患者，提议预防性使用（ ）类抗菌药物 1 次

A、第一代头孢菌素

使用（ ）时，应注意抗生素有关腹泻和假膜性肠炎的发生，如有可疑应及时停药

A、克林霉素

鼠咬伤所致的皮肤、软组织感染可选药物（ ）

A、多西环素

四环素用于（ ）

A、斑疹伤寒

碳青霉烯类抗菌药物临床合理应用的重点不包括（ ）

A、多重耐药定植菌或携带状态，不宜使用碳青霉烯类抗菌药物治疗

碳青霉烯类抗菌药物使用量增加的重要原因不包括（ ）

A、免疫抑制治疗患者减少

下列有关青霉素类药物的使用，论述错误的是（ ）

A、青霉素钾盐应迅速静脉注射

下列有关碳青霉烯类药物使用注意事项描述错误的是（ ）

A、本类药物不宜用于治疗轻症感染，可作为预防用药

下列有关吸入炭疽的治疗说法错误的是（ ）

A、宜选磺胺类治疗

下列有关中性粒细胞缺乏伴发热说法错误的是（ ）

A、常见病原体以病毒为主

下列有关中性粒细胞缺乏伴发热说法错误的是（ ）

A、常见病原体以病毒为主

下列属于引起细菌性眼内炎的革兰阴性杆菌是（ ）

A、铜绿假单胞菌及肠杆菌科细菌

医疗机构应每个月对院、科两级抗菌药物临床应用情况开展调查，项目不包括

（ ）

A、II、III类切口手术抗菌药物预防使用率和品种选择，给药时机和使用疗程合理率

如下对于抗菌药物给药剂量的认识，错误的是（ ）

A、治疗单纯性下尿路感染时，应应用可耐受的最大剂量

如下哪类手术Ⅱ、Ⅲ类切口也许含有革兰阴性杆菌、厌氧菌(如脆弱拟杆菌)()

A、结肠、直肠、阑尾手术

如下哪类手术Ⅱ、Ⅲ类切口也许含有厌氧菌(如脆弱拟杆菌)()

A、肝、胆系统及胰腺手术

治疗阿米巴肠病宜选药物()

A、甲硝唑

治疗肠球菌属所致的血流感染，宜选药物为()

A、氨苄西林或青霉素+氨基糖苷类

治疗蜱传回归热可选多西环素 100mg 口服，()，7~10 天

A、bid

治疗由金黄色葡萄球菌（甲氧西林耐药）所致的脓胸，宜选药物为（ ）

A、糖肽类土磷霉素

中性粒细胞缺乏伴发热治疗标准说法错误的是（ ）

A、尽早开始诊疗性试验治疗

（ ）与异烟肼、吡嗪酰胺、乙胺丁醇联合是各型肺结核短程疗法的基石

B、利福平

大环内酯类（ ）严禁与特非那定合用，以免引起心脏不良反应

B、克拉霉素

对磺胺类药物不敏感的细菌是（ ）

B、立克次体

对青霉素过敏的细菌性脑膜炎病人，可选用（ ）

B、氯霉素

对于实行下腔静脉滤器植入术的患者，有关预防性应用抗菌药物的提议是（ ）

B、不推荐常规预防使用抗菌药物

对于头霉素类药物的适应证描述错误的是（ ）

B、大肠埃希菌等肠杆菌科细菌、拟杆菌属等需氧菌引起的腹腔感染

有关感染性心内膜炎的治疗标准论述有误的是（ ）

B、依照病原选用杀菌剂，应单一用药

抗菌药物疗程因感染不一样而异，一般宜用至体温正常、症状消退后（ ）小时，

有局部病灶者需用药至感染灶控制或完全消散

B、72～96

抗菌药物临床应用的（ ）是抗菌药物管理的核心方略

B、分级管理

青霉素类抗菌药物适应证不包括（ ）

B、下呼吸道感染

人工瓣膜感染性心内膜炎、真菌性心内膜炎疗程需（ ）或更长，以减少复发率

B、6~8周

伤寒、副伤寒的首选药物是（ ）

B、氯霉素

属于大环内酯类抗生素的是（ ）

B、罗红霉素

替加环素的作用机制是（ ）

B、抑制细菌蛋白质的合成

万古霉素对哪种细菌引起的感染无效（ ）

B、绿脓杆菌

为预防外固定架植入术Ⅱ类手术感染，围手术期能够预防应用下列哪类抗菌药物

（ ）

B、第一、二代头孢菌素

下列有关肾功效减退的成人美罗培南使用剂量错误的是（ ）

B、血液透析患者剂量每次为 0.5g，每 12h 给药一次

下列哪些品种不属于 β -内酰胺类/ β -内酰胺酶抑制剂（ ）

B、头孢拉定/舒巴坦

下列哪种抗菌药物已证明对妊娠期妇女有危险性，但仍也许受益多（ ）

B、替加环素

如下哪项属于IV类切口（污秽—感染手术）（ ）

B、有失活组织的陈旧创伤手术

如下哪种抗菌药物能够引起新生儿的溶血性贫血（ ）

B、磺胺药及呋喃类

由A组溶血性链球菌引起的颌面部感染不选的药物是（ ）

B、第三代头孢菌素

（ ）可用于治疗重症或伴血流感染的尿路感染患者

C、碳青霉烯类

氨基糖苷类药物的不良反应不包括（ ）

C、肝毒性

滴虫阴道炎的宜选药物是（ ）

C、甲硝唑

对庆大霉素的描述，下列说法错误的是（ ）

C、耐药菌少

肝病时防止应用如下哪种抗菌药物（ ）

C、两性霉素 B

钩端螺旋体病治疗时为防止治疗后出现（ ），初始治疗阶段抗菌药物的剂量宜

小

C、赫氏反应

有关替加环素，下列说法错误的是（ ）

C、替加环素可用于铜绿假单胞菌感染

急性化脓性骨髓炎疗程为（ ）

C、4~6 周

常常发生链球菌咽峡炎或风湿热的小朋友及成人，可预防性予以下列哪种抗菌药物（ ）

C、苄星青霉素

可用于合并 HIV 患者的抗分枝杆菌感染的预防与治疗的药物是（ ）

C、利福布汀

利奈唑胺的适应证不包括（ ）

C、社区获得性肺炎，由敏感的肺炎链球菌所致

伤寒带菌者治疗可选用阿莫西林或氟喹诺酮类口服，疗程为（ ）周

C、6

肾功效减退的患者使用磺胺甲噁唑时，应（ ）

C、轻、中、重度肾功效减退时均需减量

实行经颈静脉肝内门腔静脉分流术的患者，提议预防性使用抗菌药物，但如下哪

种药物不在推荐之列（ ）

C、阿奇霉素

实行淋巴管造影术的患者，提议预防性使用（ ）类抗菌药物 1 次

C、第一代头孢菌素

世界卫生组织推荐的成人麻风病患者少菌型疗程为（ ）个月

C、6

碳青霉烯类抗菌药物临床应用存在的问题不包括（ ）

C、自我国开展抗菌药物临床应用专项整治以来，我国住院患者抗菌药物使用率
上升

碳青霉烯类抗菌药物临床应用评价细则中不包括下列哪种药物（ ）

C、多立培南

替加环素适应证不包括（ ）

C、中枢神经系统感染患者

下列有关立克次体病说法正确的是（ ）

C、立克次体病是由立克次体科，柯克斯体科，巴通体科中的多个属、种的病原
微生物引起的感染病

下列有关碳青霉烯类抗菌药物在特殊人群中的使用说法错误的是（ ）

C、肝功效不全患者使用时一般都需要调整剂量

下列哪种抗菌药物已证明对人类致畸，危险性不小于受益（ ）

C、奎宁

心脏人工瓣膜置换术、人工关节置换术等，若术前发觉有耐甲氧西林金黄色葡萄球菌（MRSA）定植的也许或者该机构 MRSA 发生率高，可选用（ ）预防感染，但应严格控制用药连续时间

C、万古霉素、去甲万古霉素

新生儿期应防止应用可导致脑性核黄疸及溶血性贫血的（ ）

C、磺胺类药和呋喃类药

猩红热重要由（ ）引起

C、A 组溶血性链球菌

严重中性粒细胞缺乏连续时间超出（ ）天的高危患者和实体器官移植及造血干

细胞移植的患者，在某些情况下也有预防用抗菌药物的指征

C、7

如下哪类手术 II、III类切口也许含有口咽部厌氧菌（如消化链球菌）（ ）

C、胃、十二指肠、小肠手术

如下情况标准能够预防使用抗菌药物（ ）

C、尚无细菌感染征象但暴露于致病菌感染的高危人群

易透过血脑屏障，对隐球菌性脑膜炎有很好疗效的药物是（ ）

C、氟胞嘧啶

由流感嗜血杆菌引起的细菌性结膜炎不选的药物是（ ）

C、阿糖腺苷

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/146215135030011003>