
A 型题（最佳选择题）

17. 对于“药物治疗慢性阻塞性肺疾病的目的”叙述错误的是

- A. 减少急性加重的频次
- B. 预防和控制症状
- C. 排痰化痰
- D. 减少急性加重的程度
- E. 改善健康状况和运动耐力

【答案】

A 型题（最佳选择题）

18. 茶碱类支气管平滑肌松弛剂用于治疗慢阻肺疾病，产生的主要不良反应是

- A. 口渴
- B. 尿频
- C. 肝功能异常
- D. 水肿
- E. 失眠

【答案】

B 型题（配伍选择题）

- A. 吡嗪酰胺
- B. 利福平
- C. 链霉素
- D. 乙胺丁醇
- E. 左氧氟沙星

19. 用药后有可能出现球后视神经炎的抗结核药物是

【答案】

20. 用药期间尿液可呈橘红色的抗结核药物是

【答案】

B 型题（配伍选择题）

- A. 链霉素
- B. 吡嗪酰胺
- C. 对氨基水杨酸
- D. 异烟肼
- E. 乙胺丁醇

21. 会引起球后视神经炎的是

【答案】

22. 会损害第Ⅷ对脑神经的是

【答案】

B 型题（配伍选择题）

- A. 异烟肼
- B. 利福平
- C. 乙胺丁醇
- D. 吡嗪酰胺
- E. 对氨基水杨酸

23. 患者，女，39 岁，因肺结核使用抗肺结核药后，四肢出现针刺感，导致这种症状的药物是

【答案】

24. 患者平日佩戴隐形眼镜，使用抗肺结核药后，导致患者隐形眼镜染色的结核药物是

【答案】

第十章 心血管系统常见疾病

高频考点	重要级别
高血压治疗原则和降压药的合理使用、用药注意事项、患者教育	☆☆☆
冠心病（心绞痛、急性心梗）分类、临床表现、治疗、用药注意事项	☆☆
血脂异常临床分型、心衰分类、治疗、用药注意事项	☆☆☆
心房颤动、深静脉血栓形成	☆☆

【考点】抗高血压药主要不良反应

氢氯噻嗪、呋塞米——低钾、高尿酸

阿米洛利、氨苯蝶啶、螺内酯——高血钾

洛尔类——支气管痉挛、心功能抑制

普利类——刺激性咳嗽、高血钾（双侧肾动脉狭窄）

沙坦类——高血钾

地平类——面部潮红，踝部水肿、食管反流症状

利血平——心动过缓，消化性溃疡

B 型题（配伍选择题）

A. 卡托普利 B. 硝苯地平 C. 氢氯噻嗪

D. 普萘洛尔 E. 特拉唑嗪

1. 高血压伴前列腺增生患者适宜选用的药物是

【答案】

2. 高血压伴痛风的患者慎用的药物是

【答案】

B 型题（配伍选择题）

A. 高血钾

B. 痛风

C. 体位性低血压

D. 双侧肾动脉狭窄

E. 2～3 度房室传导阻滞

3. β 受体阻断剂的禁忌症

【答案】

4. 血管紧张素转化酶抑制剂的禁忌症

【答案】

5. 噻嗪类利尿药的禁忌症

【答案】

6. α 受体阻断剂的禁忌症

【答案】

B 型题（配伍选择题）

- A. 低血钾 B. 高血钾
C. 低血钙 D. 心律失常
E. 踝部水肿

7. 氢氯噻嗪的主要不良反应是

【答案】

8. 醛固酮受体阻断剂螺内酯的主要不良反应是

【答案】

9. 钙通道阻滞剂氨氯地平的主要不良反应是

【答案】

A 型题（最佳选择题）

10. 患者，男，46 岁，患有胃食管反流病，服用兰索拉唑治疗，近期诊断为高血压，血压 155/90mmHg，为了避免加重食管反流症状，应避免使用的降压药是

- A. 吲达帕胺 B. 哌唑嗪
C. 卡托普利 D. 氯沙坦
E. 硝苯地平

【答案】

A 型题（最佳选择题）

11. 治疗高血压伴稳定性心绞痛何种药物为宜

- A. β -受体阻滞剂
B. 利血平
C. 甲基多巴
D. 硝苯地平
E. 可乐定

【答案】

A 型题（最佳选择题）

12. 患者，男，70 岁，外出登山途中突然出现胸前区疼痛，疼痛放射至左肩，休息 2 分钟后缓解，立即急诊就医。查体：血压 150/95mmHg，心率 55 次/min。化验结果：TC 5.0mmol/L，TG 1.78mmol/L。结合心电图检查结果，临床诊断为稳定型心绞痛。该患者不宜选用的药物是

- A. 比索洛尔片 B. 阿司匹林肠溶片
C. 依那普利片 D. 阿托伐他汀钙片
E. 硝酸甘油片

【答案】

B 型题（配伍选择题）

- A. 阿司匹林 B. 低分子肝素
C. 阿昔单抗 D. 硝酸甘油
E. 氯贝丁酯

13. 稳定型心绞痛发作时应选用哪种药物治疗

【答案】

14. 稳定型心绞痛缓解期应选用哪种药物治疗

【答案】

B 型题（配伍选择题）

- A. 他汀类
- B. 烟酸
- C. 贝特类
- D. ω -3 脂肪酸
- E. 胆酸整合剂

15. 治疗高胆固醇血症首选

【答案】

16. 治疗混合型高脂血症一般首选

【答案】

17. 治疗高三酰甘油血症首选

【答案】

18. 治疗低 HDL-C 血症应选

【答案】

A 型题（最佳选择题）

19. 羟甲戊二酰辅酶 A 还原酶抑制剂（他汀类）与贝特类调节血脂药联合应用时，可能引起死亡的应为

- A. 输尿管结石
- B. 横纹肌溶解
- C. 急性心肌梗死
- D. 十二指肠溃疡
- E. 糖尿病性坏疽

【答案】

C 型题（综合分析选择题）（20-22 题）

患者，男 64 岁，身高 174cm，体重 92kg，既往有高血压、高脂血症及心肌梗死病史，近日因反复胸闷就诊，特拉唑嗪片、氨氯地平片、阿司匹林肠溶片、曲美他嗪片、单硝酸异山梨酯注射液进行治疗。

20. 该患者使用的药物中，降压作用的药物是

- A. 特拉唑嗪片、氨氯地平片、阿司匹林肠溶片
- B. 特拉唑嗪片、氨氯地平片、单硝酸异山梨酯注射液
- C. 特拉唑嗪片、氨氯地平片、辛伐他汀
- D. 特拉唑嗪片、辛伐他汀、阿司匹林肠溶片
- E. 氨氯地平片、曲美他嗪片、单硝酸异山梨酯注射液

【答案】

21. 该患者用药中，在首次用药，剂量增加或停药后重新用药时，应让患者平卧，以免发生眩晕而跌倒的药物是

- A. 氨氯地平片
- B. 曲美他嗪片
- C. 阿司匹林肠溶片
- D. 特拉唑嗪片
- E. 辛伐他汀

【答案】

22. 关于本病例符合用药指导意见的说法，错误的是

- A. 应注意监护血压变化，防止血压过度降低
- B. 患者使用抗血小板聚集药物，应注意预防出血
- C. 单硝酸异山梨酯能扩张血管引起头痛，即便可忍耐受也必须停药

- D. 出现弥漫性肌痛或乏力，同时伴有全身不适时，应及时就医
- E. 口服阿司匹林肠溶片时不要嚼碎或掰开服用

【答案】

C 型题（综合分析选择题）（23-26 题）

患者，女，51 岁，体检时发现血压 160/105mmhg，糖耐量试验餐后 2 小时血糖为 9.56mmol/L(参考范围<7.8mmol/L)，甘油三酯 1.52mmol/L(参考范围 0.56-1.70mmol/L)，总胆固醇 6.26mmol/L（参考范围<5.2mmol/L），低密度脂蛋白胆固醇 4.85mmol/L（参考范围 2.1-3.1mmol/L），高密度脂蛋白胆固醇 1.20mmol/L（参考范围 1.2-1.65mmol/L）肌酐 60 μmol/L（参考范围 45-84 μmol/L），蛋白尿：++。临床诊断为高血压、高脂血症、糖耐量异常。

23. 该患者宜选用治疗高血压的药物是

- A. 氢氯噻嗪
- B. 复方利血平
- C. 依那普利
- D. 特拉唑嗪
- E. 螺内酯

【答案】

24. 该患者首选调节血脂的药物是

- A. 依折麦布
- B. 普罗布考
- C. 非诺贝特
- D. 阿托伐他汀
- E. 多烯酸乙酯

【答案】

25. 应该告知患者用药过程中可能出现最严重的不良反应是

- A. 踝关节水肿
- B. 牙龈出血
- C. 心悸
- D. 便血
- E. 横纹肌溶解

【答案】

26. 对该患者的健康教育，说法错误的是

- A. 控制体重
- B. 不必限盐
- C. 适当运动
- D. 减少脂肪摄入
- E. 戒烟限酒

【答案】

B 型题（配伍选择题）

- A. 卡维地洛 B. 氢氯噻嗪 C. 呋塞米
- D. 比索洛尔 E. 地高辛

27. 患者心力衰竭症状加重而发生水钠潴留时，应选用的利尿剂是

【答案】

28. 患者有轻度液体潴留，伴有高血压而肾功能正常的心力衰竭

【答案】

A 型题（最佳选择题）

29. 老年人使用可导致甲状腺功能异常、肺毒性或 Q-T 间期延长，不宜作为心房颤动一线用药的是

- A. 福辛普利
- B. 地高辛
- C. 美托洛尔
- D. 胺碘酮
- E. 华法林

【答案】

B 型题（配伍选择题）

- A. 利伐沙班 B. 硝苯地平
- C. 地尔硫 D. 胺碘酮
- E. 去乙酰毛花苷

30. 可用于房颤时转复并维持窦性心律的药物是

【答案】

31. 可用于房颤时控制心室率的是

【答案】

32. 可用于房颤时抗凝的新型抗凝血药物是

【答案】

A 型题（最佳选择题）

33. 下列关于新型抗凝药物说法不正确的是

- A. 与食物和药物相互作用小
- B. 达比加群酯直接作用于凝血酶（IIa 因子）
- C. 利伐沙班和阿哌沙班为直接 Xa 因子抑制剂
- D. 可特异性阻断凝血瀑布中的某关键环节
- E. 需监测 INR

【答案】

X 型题（多项选择题）

34. 治疗深静脉血栓形成的药物有

- A. 华法林
- B. 肝素
- C. 达比加群酯
- D. 利伐沙班
- E. 尿激酶

【答案】

X 型题（多项选择题）

35. 患者，女，30 岁，因肺栓塞使用华法林抗凝治疗。药师除了需要关注患者的合并用药外，还需关注非药物因素对华法林疗效的影响。下列说法正确的有

- A. 吸烟可减弱华法林的抗凝作用
- B. 大蒜可增强华法林的抗凝作用
- C. 菠菜可减弱华法林的抗凝作用
- D. 高蛋白饮食可增加华法林的抗凝作用
- E. 葡萄柚可增强华法林的抗凝作用

【答案】

执业药师资格考试

《药学综合知识与技能》

刷题班

主讲：伊然

第十一章 神经系统常见疾病

重要考点	重要分级
缺血性脑血管病治疗原则、合理使用药物、患者教育	☆☆☆
出血性脑血管病（脑出血） 治疗原则、患者教育	☆☆
癫痫临床表现、治疗、患者教育	☆☆
帕金森病治疗药物的合理使用	☆☆☆
痴呆的治疗药物、患者教育	☆☆
焦虑症治疗药物的合理使用	☆
抑郁症治疗药物的合理使用	☆
失眠症治疗原则、用药注意事项	☆☆

A 型题（最佳选择题）

1. 下列药物中，可以增加缺血性脑卒中发作风险的药物是

- A. 口服避孕药
- B. 叶酸
- C. 阿司匹林
- D. 银杏叶片
- E. 非洛地平

【答案】

A 型题（最佳选择题）

2. 不可用于治疗短暂性脑缺血发作的药物是

- A. 阿司匹林
- B. 巴曲酶
- C. 尿激酶
- D. 双嘧达莫
- E. 华法林

【答案】

A 型题（最佳选择题）

3. 患者，女，75 岁，三周前因缺血性脑卒中入院治疗，经积极治疗，病情显著缓解后出院。目前无其他伴随疾病，为进行心脑血管事件的二级预防，应首选的药物是

- A. 肝素
- B. 氯吡格雷
- C. 阿司匹林
- D. 利伐沙班
- E. 噻氯匹定

【答案】

C 型题（综合分析选择题）（4-5）

男性，57 岁，既往高血压病史 10 年，与儿子吵架后突然起病，言语不清，左侧肢体无力，意识不清，查体：BP220/120mmHg，中度昏迷，瞳孔不等大，对光反射消失，强痛刺激，左侧肢体不活动，左侧巴宾斯基征阳性。

4. 该患者最可能诊断为

- A. 脑出血
- B. 短暂性脑缺血发作
- C. 脑血栓形成
- D. 腔隙性脑梗死
- E. 缺血性脑卒中

【答案】

5. 该患者首选治疗方法为

- A. 止血
- B. 扩容
- C. 预防感染
- D. 脱水
- E. 降压

【答案】

A 型题（最佳选择题）

6. 育龄期癫痫患者应酌情选用

- A. 丙戊酸钠 B. 乙琥胺
- C. 苯巴比妥 D. 卡马西平
- E. 托吡酯

【答案】

【考点解析】育龄期患者可酌情选用卡马西平和拉莫三嗪，其致畸性相对小。

B 型题（配伍选择题）

癫痫的药物治疗

- A. 卡马西平 B. 苯妥英钠
- C. 地西泮 D. 丙戊酸钠
- E. 拉莫三嗪

7. 适用于各型癫痫的是

8. 癫痫持续状态可用

【答案】

A 型题（最佳选择题）

9. 患者，男，70 岁，右手抖动和行走缓慢 3 个月，经过神经科检查后诊断为帕金森病，既往前列腺肥大史 3 年，临床上对该患者不宜选用

- A. 苯海索 B. 左旋多巴
- C. 多巴丝肼 D. 司来吉兰
- E. 金刚烷胺

【答案】

B 型题（配伍选择题）

- A. 苯海索 B. 司来吉兰
- C. 拉莫三嗪 D. 左旋多巴
- E. 恩托卡朋

10. 属抗胆碱能药的是【答案】

11. 属于 MAO-B 抑制剂的是【答案】

12. 属多巴胺受体激动剂的是【答案】

13. 属于 COMT 抑制剂的是【答案】

A 型题（最佳选择题）

14. 患者，男，55 岁，呈典型“面具脸”，“慌张步态”及“小字症”表现，诊断为帕金森病，患者同时患有闭角型青光眼，不宜选用的治疗帕金森病的药物是

- A. 左旋多巴
- B. 普拉克索
- C. 多奈哌齐
- D. 司来吉兰
- E. 金刚烷胺

【答案】

A 型题（最佳选择题）

15. 患者，女，67 岁，有高血压病史，右手抖动，行走缓慢 4 年，诊断为帕金森病。服用复方左旋多巴治疗，症状一度好转后又反复加重，随后采用加大复方左旋多巴剂量，并加用苯海索。患者同时服用氨氯地平、缬沙坦等药物控制血压。近日出现运动症状波动，伴有异动症。导致该不良反应的药物是

- A. 左旋多巴
- B. 苧丝肼
- C. 苯海索
- D. 氨氯地平
- E. 缬沙坦

【答案】

A 型题（最佳选择题）

16. 使用左旋多巴时，饮食方面应注意

- A. 避免同时进食脂肪类食物
- B. 同时补充蛋白质类食物
- C. 避免同时进食淀粉类食物
- D. 避免同时进食蛋白质类食物
- E. 同时补充脂肪类食物

【答案】

A 型题（最佳选择题）

17. 下列用于治疗痴呆的药物，不属于胆碱酯酶抑制剂的是

- A. 美金刚
- B. 卡巴拉汀
- C. 加兰他敏
- D. 多奈哌齐
- E. 石杉碱甲

【答案】

A 型题（最佳选择题）

18. 对于有睡眠障碍的抑郁症患者，适宜选用的抗抑郁药是

- A. 地西泮
- B. 雷美尔通
- C. 米氮平
- D. 佐匹克隆
- E. 唑吡坦

【答案】

A 型题（最佳选择题）

19. 患者，女，因抑郁症用文拉法辛（75mg, bid）治疗，用药 7 天后无效进行咨询。下列药师用药指导意见，正确的是

- A. 药物剂量太小，应增大剂量
- B. 此药疗效差，建议换用氟西汀
- C. 此药疗效差，建议换用丙米嗪
- D. 抗抑郁药多数需要至少 2 周才有显著的情绪改善，建议继续服药
- E. 单一用药无效，建议用联合使用氟伏沙明

【答案】

B 型题（配伍选择题）
下列治疗失眠症的药物

- A. 艾司唑仑

B. 阿戈美拉汀
- C. 帕罗西汀

D. 唑吡坦
- E. 米氮平

20. 属苯二氮卓类药物的是【答案】
21. 属于非苯二氮卓类 GABAA 复合受体拮抗剂的是【答案】
22. 属于褪黑素受体激动剂的是【答案】
23. 属于选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂的是【答案】

A 型题（最佳选择题）

24. 为减少共济失调，幻觉及“宿醉现象”，老年人失眠患者宜选用

- A. 苯巴比妥

B. 劳拉西泮
- C. 佐匹克隆

D. 水合氯醛
- E. 地西泮

【答案】

谢谢大家

第十二章 消化系统常见疾病

重要考点	重要分级
胃食管反流病治疗药物的合理使用、用药注意事项、患者教育	☆☆
消化性溃疡治疗药物的合理使用、临床表现、治疗、用药注意事项	☆☆☆
胆石症、胆囊炎治疗原则、患者教育	☆

A 型题（最佳选择题）

1. 胃食管反流的患者应避免使用的药物是

- A. 阿司匹林
- B. 阿仑膦酸钠
- C. 扑尔敏
- D. 美托洛尔
- E. 多潘立酮

【答案】

B 型题（配伍选择题）

- A. 埃索美拉唑

B. 铝碳酸镁
- C. 碳酸氢钠

D. 法莫替丁
- E. 多潘立酮

2. 属 H2 受体拮抗剂【答案】
3. 属质子泵抑制剂的是【答案】
4. 属促动力药的是【答案】
5. 黏膜保护剂的是【答案】

B 型题（配伍选择题）

- A. 复方氢氧化铝

B. 阿莫西林
- C. 奥美拉唑

D. 伊托必利
- E. 甲硝唑

6. 应在餐前 15～20min 服用的是【答案】
7. 应在餐前 1h 服用的是【答案】
8. 餐前 30min 服用的药物是【答案】

- A 型题（最佳选择题）
9. 关于消化性溃疡抗 Hp 的三联疗法，下列选项正确的是
- A. 兰索拉唑+克拉霉素+甲硝唑
 - B. 奥美拉唑+阿莫西林+阿奇霉素
 - C. 胶体次碳酸铋+硫糖铝+甲硝唑
 - D. 胶体次碳酸铋+哌仑西平+替硝唑
 - E. 兰索拉唑+阿莫西林+法莫替丁

- 【答案】
- A 型题（最佳选择题）
10. 可作为根除幽门螺杆菌感染的一线治疗方案是
- A. 埃索美拉唑 20mg bid+克拉霉素 500mg qd+阿莫西林 0.5g tid
 - B. 埃索美拉唑 20mg bid+克拉霉素 500mg tid+枸橼酸铋钾 0.6gbid
 - C. 埃索美拉唑 20mg qd+克拉霉素 1.0g qd+枸橼酸铋钾 0.6gbid
 - D. 埃索美拉唑 20mg bid+克拉霉素 500mg bid+阿莫西林 1.0g bid+枸橼酸铋钾 0.6g bid
 - E. 埃索美拉唑 20mg bid+克拉霉素 500mg tid+阿莫西林 1.0g tid+枸橼酸铋钾 0.6g tid

- 【答案】
- X 型题（多项选择题）
11. 用于胆石症的非手术治疗，属于钙通道阻滞剂，不可掰开嚼碎，避免卧位服用的药物是
- A. 熊去氧胆酸片
 - B. 鹅去氧胆酸片
 - C. 匹维溴铵片
 - D. 山莨菪碱片
 - E. 消炎利胆片

【答案】

谢谢大家

第十三章 内分泌及代谢性疾病

重要考点	重要分级
甲亢、甲减治疗药物的合理使用、用药注意事项、患者教育	☆☆
糖尿病分型、并发症、治疗药物的合理使用、用药注意事项、患者教育	☆☆☆
骨质疏松、佝偻病临床表现、治疗药物的合理使用、用药注意事项、患者教育	☆☆☆
高尿酸血症、痛风治疗药物的合理使用、用药注意事项、患者教育	☆☆

- A 型题（最佳选择题）
1. 治疗哺乳期妇女甲亢首选
- A. 碘化钾
 - B. 丙硫氧嘧啶
 - C. 甲巯咪唑
 - D. 放射性 131I
 - E. 碳酸锂

- 【答案】
- A 型题（最佳选择题）
2. 患者，女，20 岁，未婚，患有甲状腺功能亢进症，应用丙硫氧嘧啶 150mg，tid 治疗 3 个月 后，出现体重增加，乏力、怕冷、突眼加重，治疗方案应调整为

- A. 加大丙硫氧嘧啶用药
- B. 放射性 131I 治疗
- C. 换用另一种抗甲状腺药物
- D. 丙硫氧嘧啶减量并加甲状腺素片
- E. 手术治疗

【答案】

X 型题（多项选择题）

3. 为避免病情加重，在服用抗甲状腺药治疗期间应当禁服的药品有
- A. 泼尼松
 - B. 利血平
 - C. 西地碘
 - D. 碘化钾
 - E. 胺碘酮

【答案】

A 型题（最佳选择题）

4. 下列关于甲状腺功能减退患者激素替代治疗的说法，错误的是
- A. 需要终身服药
 - B. 服用过量可能出现甲状腺激素功能亢进症状
 - C. 左甲状腺素应于早餐前半小时空腹服用
 - D. 妊娠期妇女必须联合使用丙硫氧嘧啶
 - E. 治疗目标是将 TSH 和甲状腺激素水平恢复到正常范围内

【答案】

B 型题（配伍选择题）

- A. 二甲双胍
 - B. 吡格列酮
 - C. 胰岛素
 - D. 阿卡波糖
 - E. 格列喹酮
5. 餐后血糖升高为主，伴餐前血糖轻度升高的 2 型糖尿病患者首选【答案】
6. 单纯餐后血糖高，而空腹和餐前血糖不高的 2 型糖尿病患者首选【答案】
7. 2 型肥胖型糖尿病患者首选【答案】
8. 糖尿病合并肾病者首选【答案】

治疗（一）非药物治疗

饮食干预、体育锻炼和控制体重是血糖控制的基石。

（二）药物治疗

1. 1 型糖尿病的药物治
- 首选胰岛素治疗；
- 或与 α-糖苷酶抑制剂、双胍类降糖药联合。
2. 2 型糖尿病的药物治
- 口服降糖药的选用。

表 13-2 胰岛素的制剂种类与其特点（2019 版）

类别	制剂名称	给药方法
速效	门冬胰岛素	餐前 5-10min 或餐后立即给药
	赖脯胰岛素	餐前 10-15min 或餐后立即给药
短效	普通（常规）胰岛素	餐前 15-30min（皮下）、抢救
长效	低精蛋白锌胰岛素	早餐前 30-60min，qd

	精蛋白锌胰岛素	早餐前 30-60min, qd
	地特胰岛素	睡前 30-60min, qd
	甘精胰岛素	睡前 30-60min, qd
预混*	预混人胰岛素 30R	个体化给药; 注射后 30min 内必须进食
	预混人胰岛素 50R	个体化给药; 注射后 30min 内必须进食

降糖药	
胰岛素增敏剂 (餐后血糖升高为主, 伴餐前血糖轻度升高)	罗格列酮 (分服次数 1-2 次)、吡格列酮 曲格列酮 (已经淘汰) 赛格列酮、恩格列酮
磺酰脲类 (2 型非肥胖型)	
第一代	甲苯磺丁脲、氯磺丙脲
第二代	格列本脲、格列吡嗪、格列齐特 格列喹酮 (糖尿病合并肾病者可首选) 格列波脲
第三代	格列美脲 (分服次数 1 次)
双胍类 (2 型肥胖型、儿童)	二甲双胍 (分服次数 2-3 次) 苯乙双胍
α-葡萄糖苷酶抑制剂 (单纯餐后血糖高)	阿卡波糖、伏格列波糖
餐时血糖调节剂	瑞格列奈

用药注意事项与患者教育

(1) 注射胰岛素时宜注意

- ①注射时宜变换注射部位, 两次注射点要间隔 2cm, 以确保胰岛素稳定吸收, 同时防止发生皮下脂肪营养不良。
- ②未开启的胰岛素应冷藏保存, 冷冻后的胰岛素不可再应用。
- ③使用中的胰岛素笔芯不宜冷藏, 可与胰岛素笔一起使用或随身携带, 但在室温下最长可保存 4 周。

(2) 应用磺酰脲类降糖药宜注意: 监测血糖, 警惕低血糖发作。

B 型题 (配伍选择题)

- A. 甘精胰岛素 B. 低精蛋白锌胰岛素
- C. 赖脯胰岛素 D. 精蛋白锌胰岛素
- E. 普通胰岛素

9. 属于速效的胰岛素制剂是【答案】

10. 属于短效的胰岛素制剂是【答案】

C 型题 (综合分析选择题)

男性, 48 岁, 肥胖多年, 自觉口渴、消瘦 5 个月, 尿糖阳性, 空腹血糖 8.9mmol/L, 餐后两小时血糖 15.1mmol/L。

11. 最可能的诊断为

- A. 1 型糖尿病 B. 甲状腺功能亢进症
- C. 2 型糖尿病 D. 肥胖症
- E. 库欣综合征

【答案】

12. 首选以下哪种药物治疗

- A. 胰岛素
- B. 磺脲类降糖药
- C. 双胍类降糖药
- D. α -葡萄糖苷酶抑制剂
- E. 噻唑烷二酮类胰岛素增敏剂

【答案】

13. 使用上述药物的不良反应为

- A. 乳酸性酸中毒
- B. 心力衰竭
- C. 肝功异常
- D. 体重增加
- E. 头痛

【答案】

C 型题（综合分析选择题）[14~17]

患者，女，71 岁，2 型糖尿病史 10 年。化验结果：糖化血红蛋白(HbA1c)9.2%，空腹血糖 10.5mmol/L，餐后血糖 15.5mmol/L。目前服用二甲双胍片 0.5g tid po，格列美脲片 2mg tid po，罗格列酮片 2mg bid po，甲钴胺片 0.5mg tid po，羟苯磺酸钙胶囊 250mg bid po。

14. 患者用药中，用法用量错误的是

- A. 二甲双胍片 0.5 g tid po
- B. 格列美脲片 2 mg tid po
- C. 罗格列酮片 2 mg bid po
- D. 甲钴胺片 0.5 mg tid po
- E. 羟苯磺酸钙软胶囊 250 mg bid po

【答案】

15. 针对患者病情，临床加用胰岛素治疗，应选用的治疗方案是

- A. 门冬胰岛素餐前 30~60min，皮下注射，tid
- B. 甘精胰岛素睡前 30min，皮下注射，qd
- C. 普通胰岛素餐前 30min，皮下注射，qd
- D. 低精蛋白锌胰岛素餐前 30mn，皮下注射，tid
- E. 精蛋白锌胰岛素餐前 30min，皮下注射，tid

【答案】

16. 患者在用药过程中，出现心悸、大汗、无力和饥饿感，正确的处理方法是

- A. 立刻喝白开水 200ml
- B. 立刻舌下含服硝酸甘油片
- C. 立刻口服糖水或糖块
- D. 立刻服用美托洛尔片
- E. 立刻服用阿卡波糖片

【答案】

17. 对该患者注射胰岛素制剂的注意事项和用药指导的说法，正确的是

- A. 在注射胰岛素制剂时，针头可重复使用
- B. 未使用的胰岛素可以冷冻保存
- C. 注射胰岛素制剂时，应变换注射部位，两次注射点要间隔 2cm
- D. 开启的胰岛素需要冷藏保存
- E. 使用中的胰岛素笔芯可以室温保存 8 周

【答案】

B 型题（配伍选择题）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/147004154134006141>