专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷200题题库，word格式可自由下载编辑，附完整答案！

2024湖南省临澧县《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷200题真题题库及答案（网校专用）

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.可了解工作效果、并为之后工作的进一步完善的是

A：随访了解效果，并建立档案

B：形成答案并以口头形式提供给询问者

C：对问题进行确定并归类

D：对查阅的资料进行评价、分析和整理

答案：A

2.（2017年真题）患者女45岁。一年前临床诊断为室上性心动过速服用美托洛尔片25mgbid。近日因反复胃痛就诊，胃镜检查诊断为胃溃疡幽门螺杆菌阳性。医师处方：埃索美拉唑镁肠溶片20mgbid，甲硝唑片0.4gbid，克拉霉素片50mgbid，枸橼酸铋钾胶囊0.6gbid。

A：维生素A缺乏

B：维生素B12缺乏

C：维生素B2缺乏

D：维生素B6缺乏

答案：B

3.以下医学检查项目中，主要用于诊断急性胰腺炎的是

A：淀粉酶增高

B：尿淀粉酶

C：肌酸激酶增高

D: 血淀粉酶

答案：A

4.属于 β 受体激动剂的是

A: 福莫特罗

B: 美托洛尔

C: 异丙托溴铵

D: 乙酰胆碱

答案：A

5.癫痫持续状态首选的药物是

A: 卡马西平

B: 拉莫三嗪

C: 地西泮

D: 丙戊酸钠

答案：C

6.孕妇使用四环素可使胎儿牙齿黄染、牙釉质发育不全，骨生长障碍，发生的时间是

A: 妊娠2个月后

B: 妊娠4～9个月

C: 妊娠5个月后

D: 妊娠3个月内

答案：C

7.（2015年真题）消化不良患者宜选用（）。

A: 干酵母

B: 小檗碱

C: 乳果糖

D: 阿苯达唑

答案：A

8.患者，女，40岁，既往有风湿性心脏病病史，近2年来出现劳累性呼吸困难，1天前因受凉出现发热、咳嗽，咳粉红色泡沫样痰，不能平卧。查体：半卧位，口唇紫绀，两肺大量水泡音及哮鸣音。

A: 急性左心衰竭

B: 大叶性肺炎

C: 支气管哮喘

D: 急性心肌炎

答案：A

9.下列关于乙型肝炎病毒“大三阳”的表述，正确的是

A: 如果肝功能正常，可定期监测，不需要抗病毒治疗

B: 乙型肝炎血清免疫学检查表现为HBsAg、HBeAb和HBcAb阳性

C: 不具有传染性

D: 提示乙肝病毒在体内复制活跃，具有传染性，需要隔离

答案：D

10.患者女，6岁，因发热体温38.6℃、头痛、鼻塞、流清涕咳嗽、无痰就诊。实验室检查:白细胞、中性粒细胞计正常。临床诊断为普通感冒。

A: 溴己新

B: 可待因

C: 乙酰半胱氨酸

D: 右美沙芬

答案：D

11.患者，男，35岁，髋关节置换术后7天，患者右侧下肢肿胀、疼痛，抬高患肢后可好转。

A: 下肢动脉栓塞

B: 病理性骨折

C: 肺动脉栓塞

D: 下肢深静脉血栓形成

答案：D

12.（2015年真题）伴有高血压的患者应慎用的是（）。

A: 氯苯那敏

B: 阿司匹林

C: 对乙酰氨基酚

D: 含伪麻黄碱的复方制剂

答案：D

13.下列药物中，能解救含亚硝酸盐的食物中毒的是

A: 普萘洛尔

B: 维生素K1

C: 维生素B6

D: 亚甲蓝

答案：D

14.下列对于轻度沙眼疗效最好的药物是

A: 硫酸锌

B: 红霉素

C: 酞丁安

D: 磺胺醋酰钠

答案：C

15.药源性疾病是由药物诱发的疾病，是指在预防、诊断、治疗或调节生理功能过程中出现与用药有关的人体功能异常或组织损伤所引起的一系列临床症状。引起药源性疾病的因素主要有患者因素、药物因素。

A: 药动学相互作用

B: 药物制剂因素

C: 药物的使用

D: 药理作用

答案：C

16.（2019年真题）患者，男，64岁，诊断为2型糖尿病，既往有磺胺过敏史，不宜选用的药物是

A: 二甲双胍

B: 格列齐特

C: 吡格列酮

D: 阿卡波糖

答案：B

17.患者，女，45岁，1年前临床诊断为室上性心动过速，服用美托洛尔片25mgbid。近日因反复胃痛就诊，胃镜检查诊断为胃溃疡，幽门螺杆菌阳性。既往有膝关节疼痛，长期服用非甾体抗炎药。医师处方：奥美拉唑肠溶片20mgqd，甲硝唑片0.4gtid，克拉霉素片50mgbid，枸橼酸铋钾胶囊220mgtid。该患者在治疗期间饮酒，可能会导致

A: 维生素B2缺乏

B: 维生素B12缺乏

C: 舌苔

D: 双硫仑样反应

答案：D

18.（2015年真题）患者，男，64岁，身高174cm，体重92kg。既往有高血压、高脂血症及心肌梗死病史，近日因反复胸闷就诊，临床处方，阿司匹林肠溶片、辛伐他汀片、特拉唑嗪片、氨氯地平片、曲美他嗪片、单硝酸异山梨酯注射液进行治疗。

A: 特拉唑嗪片、辛伐他汀片、阿司匹林肠溶片

B: 特拉唑嗪片、氨氯地平片、单硝酸异山梨酯注射液

C: 特拉唑嗪片、氨氯地平片、辛伐他汀片

D: 特拉唑嗪片、氨氯地平片、阿司匹林肠溶片

答案：B

19.中毒时可采用催吐处理方法的患者

A: 中毒引起抽搐，惊厥被控制之后的清醒病人

B: 昏迷状态病人

C: 患有严重心脏病的患者

D: 孕妇患者

答案：A

20.横纹肌溶解症是下列哪种降脂药的不良反应

A: 烟酸及衍生物

B: 弹性酶

C: HMG-CoA还原酶抑制剂

D: ACEⅠ类

答案：C

21.患者,男,28岁,外出进餐后出现腹泻,日6次,水样便,无发热和腹痛症状。宜选用的药物是（）

A: 蒙脱石散

B: 干酵母片

C: 奥美拉唑肠溶胶囊

D: 复方阿嗪米特肠溶片

答案：A

22.（2017年真题）半衰期大于24h的药物通常选择（）

A: 2～3个半衰期给药1次

B: 每日给药1次

C: 每个半衰期给药1次

D: 静脉滴注给药

答案：B

23.患者女45岁。一年前临床诊断为室上性心动过速服用美托洛尔片25mgbid。近日因反复胃痛就诊，胃镜检查诊断为胃溃疡幽门螺杆菌阳性。医师处方：埃索美拉唑镁肠溶片20mgbid，甲硝唑片0.4gbid，克拉霉素片50mgbid，枸橼酸铋钾胶囊0.6gbid。

A: 克拉霉素片

B: 甲硝唑片

C: 埃索美拉唑镁肠溶片

D: 枸橼酸铋钾胶囊

答案：A

24.抗类风湿关节炎药物中,服用4～8周后起效的是

A: 来氟米特

B: 青霉胺

C：柳氮磺吡啶

D：氯喹

答案：C

25.不属于早期杀菌性抗结核药物的是

A：链霉素

B：吡嗪酰胺

C：异烟肼

D：利福平

答案：B

26.对中枢神经有抑制作用的是

A：脂肪

B：食醋

C：酒

D：食盐

答案：C

27.（2018年真题）患者，男58岁，高血压病史5年，吸烟史40年，日均40支，6小时前出现左侧肢体无力，并逐渐加重，不能站立，家属发现其说话迟钝含混，右侧嘴唇变浅，意识清楚，到某院急诊BP190/120mmHg，血常规基本正常，行头部MRI检查后，诊断为急性脑梗死。

A：尼莫地平注射液20mgqdiv

B：呋塞米片200mgqdpo

C：甘露醇注射液250mlq6hiv

D：胞二磷胆碱注射液200mgqdiv

答案：C

28.老年CAP患者。不能选用的治疗药物是

A：碳青霉烯类

B：第三代头孢菌素

C：大环内酯类

D：氟喹诺酮类

答案：D

29.干眼症可选用()

A：色甘酸钠滴眼液

B：七叶洋地黄双苷滴眼液

C：玻璃酸钠滴眼液

D：氧氟沙星滴眼液

答案：C

30.下歹鬘关于硫脲类抗甲状腺药不良反应的描述，哪—项是错误的

A：中毒性肝炎

B：粒细胞缺乏

C：咽痛、发热

D：药疹、瘙痒

答案：C

31.以下药物中毒事例中不宜用硫酸镁导泻的是

A：抗结核药中毒

B：解热镇痛药中毒

C：镇静药中毒

D：降血糖药中毒

答案：C

32.下列治疗老年痴呆药物可通过酸化尿液而显著增加其排泄的是

A：碳酸氢钠

B：多奈哌齐

C：加兰他敏

D：美金刚

答案：D

33.药品不良反应(ADR)的机制和影响因素错综复杂，遇到可疑ADR时，需要进行因果关系评价

A：可能

B：很可能

C：可能无关

D：肯定

答案：D

34.（2018年真题）患者,男,40岁,因感冒所致鼻塞到药店购药,药师应推荐的药品是（）

A：对乙酰氨基酚片

B：酚麻美敏片

C：萘甲唑啉滴鼻液

D：氯苯那敏片

答案：C

35.适用于伴快速型心律失常的高血压患者服用的药物是

A：氢氯噻嗪

B：阿替洛尔

C：阿利吉仑

D：多沙唑嗪

答案：B

36.目前推荐的绝经激素治疗窗口期是

A：60岁以后

B：绝经后15年之内或60岁以后

C：绝经后5年之内

D：绝经后10年之内或60岁以前

答案：D

37.从事药学服务的药师应具备沟通能力。此项要求的重要性不是

A：可杜绝投诉事件

B：可提高公众对药师的认知度

C：是药师实施药学服务的基础

D：可使患者获得有关用药指导

答案：A

38.治疗口腔溃疡时，取少量吹敷于患处，一日用2～3次的药物是()

A：地塞米松粘贴片

B：甲硝唑口腔粘贴片

C：西地碘含片

D：冰硼咽喉散

答案：D

39.药品不良反应(ADR)的机制和影响因素错综复杂，遇到ADR时，需要进行因果关系评价。患者，男，45岁，因男性乙型肝炎给予干扰素治疗，治疗1个月后，患者出现脱发，停用干扰素后，脱发症状好转，再次给予干扰素治疗，患者再次出现脱发。该ADR的因果关系评价结果是()

A：可能

B：很可能

C：肯定

D：可能无关

答案：C

40.（2018年真题）患者,女,48岁,因进食高蛋白食物过多导致消化不良、胃胀气到药店购药,药师应推荐的药品是（）

A：甲氧氯普胺片

B：酵母片

C：乳酶生片

D：多潘立酮片

答案：C

41.在现代社会，药学信息的收集已不困难，但很容易出现信息量大但杂乱无章和重复的现象。药师必须通过专业的药学信息检索，对众多良莠不齐的药物信息进行客观、合理的分析评价，去伪存真，挑出有专业证据的高质量信息，指导临床合理用药。

A：美国药典药物信息

B：马丁代尔药物大典

C：医师案头参考

D：药物事实与比较

答案：B

42.下述“药物治疗慢性阻塞性肺疾病的目的”中，不正确的是

A：预防疾病进展

B：缓解呼吸道症状

C：排痰化痰

D: 减少病死率

答案：C

43.药物警戒涉及与药品相关的研究和活动，但不包括

A: 药物的有效成分鉴定

B: 处方调配错误

C: 药品超说明书用药

D: 疫苗的不良反应

答案：A

44.应用胆碱酯酶复活剂时做法错误的是()。

A: 切勿两种或三种复活剂同时使用，以免毒性增加

B: 复活剂对解除烟碱样作用和促使患者昏迷苏醒的作用比较明显

C: 复活剂不需稀释，可以直接注射

D: 不能与碱性药物并用

答案：C

45.糖尿病患者服用后可使血糖降低或升高的药物是

A: 培高利特

B: 培氟沙星

C: 头孢哌酮

D: 加替沙星

答案：D

46.患者，男，75岁,有高血压，长期服用厄贝沙坦氢氯噻嗪片（150mg/12．5mg）1片qd，血压控制平稳。因排尿困难、尿频和尿不尽感就诊，诊断为良性前列腺增生。给予非那雄胺片5mgqd,特拉唑嗪片5mgqd。患者用药后出现头晕，前来咨询。

A: 非那雄胺可增强降压药的降压效果，建议更换降压药
B: 建议睡前服用特拉唑嗪，有助于缓解头晕症状
C: 头晕可能与患者焦虑有关，继续用药会逐渐缓解
D: 非那雄胺可引|起直立性低血压，头晕可能与此相关
答案：B

47.急性感染、急性化学药物中毒如汞中毒可呈现
A: 红细胞计数减少
B: 血小板减少
C: 淋巴细胞增多
D: 白细胞增多
答案：D

48.（2018年真题）患者,男,57岁,化验结果:TC4.6mmol/L（参考值<5.2mmol/L）,TG11.0mmol/L（参考值0.56——1.70mmol/L）尿酸508umol/L（参考值<420umol/L）,应首选的调脂药物为（）
A: 依折麦布
B: 非诺贝特
C: 考来烯胺
D: 烟酸
答案：B

49.妊娠后期长期使用，可导致胎儿严重出血，甚至死胎的药物是
A: 雌孕激素、雄激素
B: 阿司匹林
C: 沙利度胺
D: 叶酸拮抗剂
答案：B

50.受精后3周至3个月（12周末之前）
A：几乎见不到药物的致畸作用
B：中枢神经系统发育迟缓
C：女性生殖系统发育迟缓
D：可产生形态或功能的异常而造成畸形
答案：D

51.患者，男，50岁，诊断为高血压、冠心病。医师处方，氨氯地平片10mgpoqd；美托洛尔缓释片47.5mgpoqd；贝那普利片20mgpoqd；阿司匹林肠溶片100mgpoqd；辛伐他丁片40mgpoqd。
A：氨氯地平片可用于早上服用
B：阿司匹林肠溶片必须晚上，餐后服用
C：若需减量，美托洛尔缓释片可掰开服用
D：阿司匹林肠溶片应整片服用，不能嚼碎
答案：C

52.双膦酸盐属于
A：骨吸收抑制剂
B：促进骨矿化剂
C：骨形成刺激剂
D：激素替代剂
答案：A

53.考察药品在广泛使用条件下的疗效和不良反应试验阶段，属于
A：Ⅱ期临床试验
B：Ⅳ期临床试验
C：Ⅰ期临床试验

D: Ⅲ期临床试验

答案：B

54.静滴、静注等给药途径的不良反应发生率较高，说明药源性疾病的药物因素是

A: 生理因素

B: 不良生活方式

C: 药物制剂因素

D: 药物的使用

答案：D

55.患者，女，60岁。现病史：近日因摔倒而致左腕骨骨折。骨科处理：因背痛加重接受口服止痛治疗。骨密度：L1-4椎体T值一2.7SD，BMD749（mg/cm2）；股骨颈T值一2．2SD，BMD602（mg/cm2）。医生诊断：绝经后骨质疏松症。

A: 甲状旁腺素

B: 钙制剂

C: 氟制剂

D: 双膦酸盐

答案：D

56.适用于阿司匹林哮喘伴有过敏性鼻炎的预防和维持治疗的药物是

A: 茶碱片

B: 沙丁胺醇气雾剂

C: 异丙托溴铵气雾剂

D: 孟鲁司特钠咀嚼片

答案：D

57.患者，女，65岁，今日因天气骤变出现急性支气管炎症状，出现喘息困难，无其他基础疾病，可给予的治疗药物是

A: N-乙酰半胱氨酸片600mgbid

B: 喷托维林25mgtid

C: 马来酸氯苯那敏片4～8mgtid

D: 沙丁胺醇气雾剂1～2喷q6h

答案：D

58.食管癌患者应用顺铂+氟尿嘧啶+多柔比星+依托泊苷属于

A: 过度治疗用药

B: 超剂量用药

C: 非适应证用药

D: 超适应证用药

答案：A

59.可导致胎儿颅面部畸形、腭裂的药物是

A: 沙利度胺

B: 叶酸拮抗剂

C: 雌激素、孕激素、雄激素

D: 苯巴比妥

答案：B

60.慢性肾盂肾炎治疗的关键是

A: 积极寻找并去除易感因素

B: 选用敏感抗菌药物

C: 联合使用抗菌药物

D: 延长给药疗程

答案：A

61.用于治疗前列腺增生症的高选择性a1A受体阻断剂为

A：坦索罗辛

B：索利那新

C：特拉唑嗪

D：托特罗定

答案：A

62.女，37岁，前来药店购买退热药，药师应进行的咨询与指导，错误的是

A：如果得知顾客为本人购药，且已经服用过对乙酰氨基酚3日，症状未缓解，药师可建议患者联合服用布洛芬口服液

B：若经过咨询得知顾客是为家里3岁女儿购买，不应推荐阿司匹林

C：顾客告知自己母亲72岁，有慢阻肺病史，昨日出现头痛、肌肉酸痛、咽痛、咳嗽，前来替母亲购药，药师应建议顾客带家属就医，不宜自我药疗

D：如果顾客购买对乙酰氨基酚口服液，应告知患者3天后症状未缓解需及时就医

答案：A

63.患者，男，58岁，高血压病史5年；吸烟史40年，日均40支。2小时前出现左侧肢体无力，并逐渐加重，不能站立；家属发现其说话迟钝、言语含混，左侧鼻唇沟变浅；意识清楚。急送医院急诊，BP170/100mmHg；血常规基本正常；头颅CT检查未见高密度病灶。诊断为脑梗死。

A：华法林片3mgqdpo

B：氯吡格雷片75mgqdpo

C：阿司匹林肠溶片300mgqdpo

D: 阿司匹林肠溶片100mgqdpo

答案：D

64.可用于治疗夜盲症的药物是

A: 维生素

B: 维生素A

C: 维生素C

D: 复合维生素B

答案：B

65.患者,男,16岁,因急性细菌性扁桃体炎使用青霉素钠治疗,用药前进行青霉素皮试。关于青霉素皮试液浓度和给药方法的说法正确的是()

A: 浓度5000U/ml,肌内注射0.1ml

B: 浓度500U/ml,皮内注射0.1ml

C: 浓度500U/ml,肌内注射0.1ml

D: 浓度5000U/ml,皮内注射0.1ml

答案：B

66.患者，女，63岁，因“突发左上肢麻木，伴头晕2小时”入院，诊断为缺血性脑卒中，患者既往有高血压病史20年，可选用哪种药物进行溶栓治疗

A: 阿司匹林

B: 巴曲酶

C: 华法林

D: 阿替普酶

答案：D

67.复方铝酸铋

A: 宜睡前服用

B: 宜餐前服用

C: 宜餐后服用

D: 宜清晨服用

答案：B

68.饮酒可使其吸收明显减少的药物是

A: 维生素B

B: 利血平

C: 苯妥英钠

D: 卡马西平

答案：A

69.稚嫩、柔弱，喹诺酮类药物可致关节痛及关节肿胀、软骨损害

A: 水盐代谢

B: 血液系统

C: 内分泌系统

D: 运动系统

答案：D

70.下列哪种药物是WHO规定的第一阶梯镇痛药物

A: 芬太尼

B: 吗啡

C: 可待因

D: 阿司匹林

答案：D

71.可减弱华法林抗凝作用的药物为

A：头孢哌酮
B：阿司匹林
C：布洛芬
D：苯巴比妥
答案：D

72.以下哪种铁剂口服吸收效果最差
A：右旋糖酐铁(二价铁)
B：枸橼酸铁(三价铁)
C：乳酸亚铁(二价铁)
D：琥珀酸亚铁(二价铁)
答案：B

73.如不良反应已经好转，后患者又死于原患疾病或与此不良反应无关的并发症，ADR报告表此栏应填“好转”；所对应的项目是
A：不良反应/事件的结果
B：ADR/ADE过程描述
C：用药原因
D：用药起止时间
答案：A

74.真性红细胞增多症
A：白细胞增多
B：白细胞减少
C：红细胞沉降率减慢
D：淋巴细胞增多
答案：C

75.（2016年真题）关于癌症疼痛患者止痛药使用原则的说法，错误的是（）。

A：应个体化用药

B：提倡无创给药方式，尽量口服

C：疼痛时用药，不痛时不需用药

D：按阶梯给药

答案：C

76.患者，女性，62岁，自述近日常有一过性黑矇，雾视、视野中有黑点，一侧面部无力、麻木。医师诊断为短暂性脑缺血。

A：2.0～4.0

B：3.0～4.0

C：2.0～3.0

D：2.0～3.5

答案：C

77.纳洛酮或纳屈酮用于解救吗啡中毒的机制是

A：敏感化作用

B：协同作用

C：减少不良反应

D：竞争性拮抗作用

答案：D

78.在病情危重抢救时最常用的是

A：直肠给药

B：静脉注射

C：肌内注射

D：口服给药

答案：B

79.检查注射剂的澄明度与口服溶液剂的色泽和澄清度属于

A：视觉试验

B：听觉试验

C：触觉试验

D：嗅觉试验

答案：A

80.（2015年真题）患者，男，64岁，身高174cm，体重92kg。既往有高血压、高脂血症及心肌梗死病史，近日因反复胸闷就诊，临床处方，阿司匹林肠溶片、辛伐他汀片、特拉唑嗪片、氨氯地平片、曲美他嗪片、单硝酸异山梨酯注射液进行治疗。

A：氨氯地平片

B：曲美他嗪片

C：阿司匹林肠溶片

D：特拉唑嗪片

答案：D

81.稳定型心绞痛发作应首选的药物是

A：美托洛尔

B：单硝酸异山梨酯

C：氨氯地平

D：硝酸甘油

答案：D

82.排便在一日内超过3次，或粪便中脂肪成分增多，或带有未消化的食物、黏液、脓血者称为腹泻。腹泻是由多种不同病因所致，在应用止泻药治疗的同时，实施对因治疗不可忽视。

A：天麻素

B：黄连素

C：谷维素

D：磷霉素

答案：B

83.苯二氮

A：阿戈美拉汀

B：米氮平

C：唑吡坦

D：艾司唑仑

答案：D

84.治疗窗窄以及代谢存在较大的个体差异的药物是

A：地高辛

B：顺铂

C：苯妥英钠

D：茶碱

答案：D

85.引起急性支气管炎的常见病原体是

A：肺炎链球菌

B：结核杆菌

C：铜绿假单胞菌

D：呼吸道合胞病毒

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/147110005046010024