

2024 年广西壮族自治区融水苗族自治县《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题题库大全加解析答案

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 嗜酸性粒细胞正常参考区间是

A: 0.005~0.05

B: 0.03~0.08

C: 0~0.01

D: 0.20~0.40

答案：A

2. 致癌、致畸作用常发生于用药数月或数年后，因此必须

A: 了解患者及家族的过敏史

B: 注意特殊人群用药

C: 注意 ADR 症状，尤其是迟发反应

D: 注意定期监测器官功能

答案：C

3. 患者，女，25 岁，产后 2 个月，哺乳期，因尿路感染需要给予抗感染治疗，首选的药物是()

A: 头孢呋辛

B: 阿米卡星

C: 多西环素

D: 左氧氟沙星

答案：A

4. (用药与尿液检查异常) 氨苄西林可能引起

- A: 尿肌酐
- B: 尿酮体
- C: 尿沉渣结晶
- D: 尿血红蛋白

答案: C

5. (2019 年真题) 患者，男，68 岁，既往体健，因受凉后咳嗽、咳黄脓痰，伴发热 2 天入院。查体: 体温 39.1℃，血压 138/80mmHg，心率 102 次/分，呼吸 32 次/分，左肺可闻及湿性啰音。化验结果: 白细胞计数 $11.2 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞百分比 85%。胸部 X 线左肺下叶浸润性阴影。痰培养结果待归。入院诊断: 社区获得性肺炎。

- A: 莫西沙星
- B: 哌拉西林他唑巴坦
- C: 阿奇霉素
- D: 头孢哌酮舒巴坦

答案: A

6. 患者到药店购买鱼肝油, 药师应给予()

- A: 维生素
- B: 维生素 AD
- C: 维生素 A
- D: 鱼油

答案: B

7. 患者，男，23 岁，近日出现大便有鲜血、便后出血自行停止、肛门有坠胀感，无感染症状，诊断为痔疮。可用于患者的治疗药物是

- A: 10%樟脑软膏
- B: 地塞米松软膏
- C: 复方甲硝唑栓
- D: 复方片仔癀软膏

答案：D

8. 患者，女，51 岁，体检时发现血压 160 / 105mmHg，糖耐量试验餐后 2 小时血糖为 9.56mmol / L、甘油三酯 1.52mmol / L(正常参考区间 0.56~1.70mmol / L)、总胆固醇 6.26mmol / L(正常参考区间 <5.2mmol / L)、低密度脂蛋白胆固醇 4.85mmol / L(正常参考区间 2.1~3.1mmol / L)、高密度脂蛋白胆固醇 1.2mmol / L(正常参考区间 1.2~1.65mmol / L)、血肌酐 50 μ mol / L(正常参考区间 45~84 μ mol / L)、尿蛋白(++)。临床诊断：高血压病、高脂血症、糖耐量异常。

- A: 减少脂肪摄入
- B: 不必限盐
- C: 控制体重
- D: 适当运动

答案：B

9. 治疗胃食管反流病，艾司奥美拉唑的正确服药时间是

- A: 餐后、睡前
- B: 三餐前 30min
- C: 早餐前 30min
- D: 症状发作时、餐后 1.5h 和睡前

答案：C

10. 预混胰岛素 30R 的组成为()

- A: 70%超短效胰岛素，30%中效胰岛素

- B: 30%中效胰岛素，70%短效胰岛素
- C: 70%中效胰岛素，30%短效胰岛素
- D: 30%超短效胰岛素，70%中效胰岛素

答案：C

11. 某患者，男，25 岁，苯二氮

- A: 氟马西尼
- B: 亚甲蓝
- C: 间羟胺
- D: 硫酸钠

答案：A

12. 患者，女性，25 岁，因面色苍白、头晕、乏力 1 年余，加重伴心悸 1 个月来诊。经诊断为缺铁性贫血。

- A: 甲床苍白、反甲或脆裂
- B: 腹泻
- C: 共济失调
- D: 牛肉样舌

答案：A

13. （2016 年真题）将药物治疗成本和所产生的效益规划为以货币为单位的数字，进行药物经济学评价。这一评价方法属于（）。

- A: 成本-效果分析
- B: 最小成本分析
- C: 成本-效用分析
- D: 成本-效益分析

答案：D

14. (2018 年真题) 患者, 女, 47 岁, 出现一侧颜面部骤然发作性闪痛, 诊断为三叉神经痛, 应选用的药物是 ()

- A: 卡马西平
- B: 麦角胺咖啡因
- C: 布洛芬
- D: 山莨菪碱

答案: A

15. 适用于 L-dopa 治疗伴发疗效减退、症状波动患者的是

- A: 苯海索
- B: 恩托卡朋
- C: 左旋多巴
- D: 司来吉兰

答案: B

16. 以下联合用药中, 依据"作用相加或增加疗效"机制的是

- A: 阿托品联用普萘洛尔
- B: 普萘洛尔联用硝苯地平
- C: 阿托品联用解磷定
- D: 阿托品联用吗啡

答案: C

17. (2018 年真题) 患者, 男, 59 岁, 高血压病史 5 年, 因头痛伴有恶心、呕吐就诊, MRI 检查结果显示蛛网膜下腔出血。为防治脑血管痉挛, 早期宜选用的药物 ()

- A: 尼莫地平
- B: 氟氯地平
- C: 缬沙坦

D: 硝苯地平

答案：A

18. 每日 4 次的缩写为

A: q4h

B: iv

C: qid

D: pc

答案：C

19. 增加出血危险的配伍用药是

A: 普萘洛尔联用硝酸酯类

B: 肝素钠联用阿司匹林

C: 山莨菪碱联用盐酸哌替啶

D: 氨基糖苷类抗生素联用依他尼酸

答案：B

20. 与烟酸合用可能引起横纹肌溶解症的是

A: 万古霉素

B: 卡那霉素

C: 吲哚美辛

D: 辛伐他汀

答案：D

21. 患者，女，62 岁，医师处方如下：姓名：×××性别：女年龄：62 岁
临床诊断：2 型糖尿病、高血压 2 级、高脂血症、PCI 术后

A: 氯吡格雷

B: 氨氯地平

C: 阿卡波糖

D: 二甲双胍

答案: B

22. (2019 年真题) 患者，女，35 岁，复杂部分发作性癫痫病史 12 年，最初使用苯妥英钠单药治疗，6 个月前因癫痫控制不佳提高苯妥英钠剂量，因不能耐受不良反应换用卡马西平联合丙戊酸钠治疗，癫痫得到控制。患者近期出现体重增加及严重脱发，到神经内科复诊，患者同时患有 2 型糖尿病，长期口服二甲双胍、阿卡波糖治疗。此外患者长期服用复合维生素 B。

A: 视物模糊

B: 牙龈增生

C: 低血糖

D: 共济失调

答案: C

23. (2013 版中国居民膳食营养素参考摄入量》建议，成人推荐维生素 D 摄入量为

A: 600IU (15 μ g) / d

B: 400IU (10 μ g) / d

C: 8001200IU (20~30 μ g) / d

D: 2000~4000IU (50~100 μ g) / d

答案: B

24. (2019 年真题) 患者，男，78 岁，因心房颤动服用华法林治疗 2 年余。后因真菌感染使用氟康唑，用药后 INR 升高并出现咳血症状。出现该症状的主要原因是

- A: 氟康唑具有较强的血浆蛋白结合力，导致血中游离的华法林浓度升高
- B: 氟康唑抑制华法林的肾脏排泄，导致华法林血药浓度升高
- C: 氟康唑可抑制 CYP2C9，导致华法林血药浓度升高
- D: 氟康唑可增加华法林的吸收，导致华法林血药浓度升高

答案：C

25. 药物相互作用是双向的，既可能产生对患者有益的结果，使疗效协同或毒性降低；也可能产生对患者有害的结果，使疗效降低和毒性增强，有时会带来严重后果，甚至危及生命。

- A: 阿托品联用吗啡
- B: 阿托品联用普萘洛尔
- C: 山莨菪碱联用哌替啶
- D: 铁剂联用维生素

答案：C

26. 患儿，男，3 岁半，身高 95cm，体重 16kg 一天前开始发热，20h 左右出现腹泻，约 3h 一次大便，量少，黄色黏液便，呕吐 1 次。检查结果：体温 38.8℃，脉搏 118 次/分，呼吸 28 次/分，出现轻微脱水症状，白细胞计数 $18.5 \times 10^9/L$ （参考值 $4.0 \times 10^9/L - 10.0 \times 10^9/L$ ），粪便镜检可见红、白细胞。

- A: 首选口服补液，必要时静脉补液
- B: 益生菌应避免与小檗碱、鞣酸蛋白同时服用
- C: 腹泻可致电解质丢失，故需特别注意补充电解质
- D: 药用炭可以吸附细菌和毒素，可与微生态制剂同时服用

答案：D

27. 粪外观所对应的疾病，阻塞性黄疸

- A: 米泔水样
- B: 暗红果酱色
- C: 柏油便，黑色有光泽
- D: 白陶土便

答案：D

28. 不能用于治疗缺铁性贫血的药物是

- A: 硫酸亚铁
- B: 葡萄糖酸亚铁
- C: 乳酸亚铁
- D: 去铁胺

答案：D

29. 下列药物中，有效治疗浓度范围与中毒浓度范围相接近的是

- A: 阿托品
- B: 四环素
- C: 地高辛
- D: 氯噻嗪

答案：C

30. 肺炎药物治疗时应注意

- A: 观察抗菌药物疗效应在药物治疗后 12~24 小时对病情进行评价
- B: 肺炎的抗菌药物疗程大多数为 5 天，极少数需要 7~10 天或更长疗程
- C: 抗菌药一般不良反应较少，不需要注意与预防
- D: 一旦怀疑为细菌性肺炎应给予首剂抗菌药物，病情稳定后可从静脉途径改为口服治疗

答案：D

31. 患者，男，32 岁，因细菌性扁桃体炎口服阿莫西林胶囊，出现全身瘙痒。立即停药，无特殊治疗，患者症状逐渐好转，未再给予阿莫西林胶囊治疗。该 ADR 的因果关系评价结果是

- A: 可能无关
- B: 可能
- C: 肯定
- D: 很可能

答案：D

32. 患者，女，72 岁，有青霉素过敏史。主诉尿痛、尿频，尿常规检查示大量白细胞，尿细菌数 $105\text{cfu}/\text{m}$ ，诊断为急性膀胱炎。应选用的药物是

- A: 复方磺胺甲噁唑片
- B: 莫西沙星片
- C: 阿奇霉素片
- D: 阿莫西林胶囊

答案：A

33. 饮用含葡萄柚汁的饮料可能影响一些药物的药动学的机制是

- A: 抑制 CYP3A4
- B: 抑制 CYP2C9
- C: 抑制 CYP1A2
- D: 诱导 CYP3A4

答案：A

34. 患者女性，40 岁，既往有风湿性心脏病史，近 2 年来出现劳力性呼吸困难，1 天前因受凉出现发热、咳嗽，咳痰、咯血，头晕、心悸，不能平卧，查体：半卧位，口唇发绀，肺部湿性啰音。心脏体征：肺动脉瓣听诊区第二心音亢进及舒张期奔马律。

- A: 西地兰
- B: 硝普钠
- C: 阿替洛尔
- D: 卡托普利

答案：D

35. 能刺激骨骼、肌肉和组织生长发育的是

- A: 肽类激素
- B: 利尿剂
- C: 蛋白同化激素
- D: 麻醉药品

答案：A

36. 患者，女，58 岁，既往无心脏病、高血压、糖尿病病史及手术史。目前体检：身高 160cm，体重 70kg。实验室检查：白细胞 $8.0 \times 10^9 / L$ ，红细胞 $4.0 \times 10^{12} / L$ ，总胆红素 $11 \mu mol / L$ ，总胆固醇 $6.0 mmol / L$ ，空腹血糖 $7.6 mmol / L$ 。

- A: 格列齐特
- B: 非诺贝特
- C: 辛伐他汀
- D: 二甲双胍

答案：D

37. 贫血患者常出现

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

A: 中性粒细胞增多

B: 嗜酸性粒细胞增多

C: 血红蛋白减少

D: 血小板计数增高

答案：C

38. 用药咨询是药师应用所掌握的药学知识和药品信息，承接公众对药物治疗和合理用药的咨询服务，对临床合理用药有关键性作用。根据药物咨询对象的不同，可以将其分为患者、医师、护士和公众的用药咨询。

A: 药品适应证

B: 自我保健

C: 新药信息

D: 治疗药物监测

答案：A

39. 可引起儿童良性颅压增高、囟门隆起的药物是

A: 维生素 A

B: 抗组胺药

C: 氯霉素

D: 苯妥英钠

答案：A

40. 蒽环类抗生素容易引起急、慢性心脏毒性，可导致左心室功能受损、心衰等，可以采用何种药物预防（）

A: 硝苯地平

B: 辅酶 Q

C: 阿托品

D: 普萘洛尔

答案：B

41. 毒物中毒的严重程度与后果往往取决于作用毒物的剂量、作用的时间以及诊断和救治是否准确与及时等。对于急性中毒者，必须迅速作出准确判断，及时采取有效的救治措施，以挽救生命、减轻损害程度。

- A: 20~30 分钟
- B: 5~10 分钟
- C: 10~20 分钟
- D: 15~30 分钟

答案：D

42. 氨茶碱注射剂和片剂所表现的是()。

- A: 同一药物，制成同一剂型，由于制备工艺不同而表现不同
- B: 同一药物，制成同一剂型，由于处方组成不同而表现不同
- C: 同一药物，剂型不同，其副作用、毒性不同
- D: 同一药物，剂型不同，其起效的快慢、作用强度和持续时间不同

答案：D

43. 李某，男，45 岁，近日感觉头痛、头晕、心悸，眼花、耳鸣、失眠、乏力等症状，血压为 160/100mmHg。

- A: 高血压
- B: 冠心病
- C: 心力衰竭
- D: 心律失常

答案：A

44. 下列关于药物对孕妇的影响哪一项是错误的

- A: 受精后 3 周至 3 个月接触药物，最易发生先天畸形

- B: 孕妇患有结核、糖尿病应绝对避免药物治疗以防胎儿畸形
- C: 孕妇不应过量服用含咖啡因的饮料
- D: 受精后半个月内，几乎见不到药物的致畸作用

答案：B

45. 香豆素类杀鼠药中毒呈现

- A: 恶心、呕吐、口内有金属味
- B: 抽搐、进行性加重
- C: 出血、凝血时间延长
- D: 呼出气体中可有苦杏仁气味

答案：C

46. 尿液是人体泌尿系统排除的代谢废物，正常人每日排出尿液 1000～3000ml。其中 97% 为水分，而在 3% 的固体物质中，主要含有两大类物质：有机物（尿素、尿酸、肌酐等蛋白质代谢产物）和无机物（氯化钠、磷酸盐、硫酸盐、铵盐等）。

- A: 氯化铵
- B: 氯化钠
- C: 氯化钾
- D: 硫酸镁

答案：A

47. 可用于强心苷类中毒后快速型心律失常的药物是

- A: 利多卡因
- B: 阿托品
- C: 胺碘酮
- D: 异丙肾上腺素

答案：A

48. 可引起尿胆红素阳性的是

- A: 肺结核
- B: 病毒性肝炎
- C: 再生障碍性贫血
- D: 肾小球肾炎

答案：B

49. 以下所列药物中，推荐用于治疗三叉神经痛的首选处方药是

- A: 卡马西平
- B: 舒马曲坦
- C: 地西泮
- D: 苯噻啶

答案：A

50. 氟马西尼用于解救的是（）

- A: 有机磷中毒
- B: 氰化物中毒
- C: 汞中毒
- D: 三唑仑中毒

答案：D

51. 冠心病二级预防的“ABCDE”方案中，“B”是指

- A: β 受体阻断剂和血压控制
- B: 阿司匹林和 ACEI
- C: 健康教育和运动
- D: 控制饮食和糖尿病

答案：A

52. (2021 年真题) 为配制有效氯浓度为 500mg/L 的消毒剂 10L, 需要次氯酸钠溶液 (有效氯浓度为 6. 0%) 和纯化水的量分别是 ()

- A: 83mL 和 9917mL
- B: 120mL 和 9880mL
- C: 830mL 和 9170mL
- D: 150mL 和 9850mL

答案: A

53. 消化不良很常见, 半数以上人群在生命过程中曾因此病症而就诊, 其主要症状有上腹饱胀、食欲缺乏等表现。

- A: 莫沙必利
- B: 复方阿嗪米特肠溶片
- C: 雷尼替丁
- D: 胰酶片

答案: C

54. 具有沉淀作用, 不宜在胃内滞留, 可用浓茶代替的洗胃液是

- A: 活性炭混悬液
- B: 淀粉溶液
- C: 3%鞣酸溶液
- D: 1: 5000 高锰酸钾

答案: C

55. 关于腹泻下列说法正确的是

- A: 排便一日超过 4 次
- B: 慢性腹泻病程大于 1 个月
- C: 迁延性腹泻病程为 2 周至 1 个月

D: 急性腹泻病程小于 2 周

答案：D

56. 需要用 10%酒精或植物油冲洗的是

A: 眼内污染毒物

B: 毛发被毒物污染

C: 眼内进入固体腐蚀性颗粒

D: 皮肤污染酚类毒物

答案：D

57. 患者，女，65 岁，诊断为房性心律失常，给予胺碘酮治疗。近日，因胃溃疡开始用西咪替丁，出现窦性心动过缓症状。

A: ②④⑤

B: ①②④⑤

C: ①③⑤

D: ①②③④

答案：B

58. 异烟肼+维生素 B6 治疗结核病属于

A: 提高药物疗效

B: 治疗多种疾病

C: 减少药物不良反应

D: 延缓细菌耐药性的产生

答案：C

59. 记录患者用药问题、药学干预内容、药学监护计划的技能是

A: 药历书写技能

B: 沟通技能

C: 药品警戒技能

D: 自主学习能力

答案: A

60. 患儿，男，1 岁 3 个月，因仍不能独立行走而就诊。经询问其母亲，该患儿一直睡眠不好，夜哭较多，非常容易出汗，数次罹患呼吸道感染。查体：头部有“枕秃”。实验室检查：血钙水平低于正常值。诊断为“佝偻病”。

A: 少饮水

B: 泼尼松 2mg/（kg·d）口服

C: 降钙素 50~100U/d 肌注

D: 立即停止使用维生素 D

答案: A

61. 药物相互作用包括发生在体内的药动学、药效学方面的作用；以及发生在体外的配伍变化，如引起理化反应使药品出现混浊、沉淀、变色和活性降低。

A: 依他尼酸合用华法林

B: 用药时同服甲氧氯普胺

C: 抗酸药合用四环素类药

D: 磺胺类药与青霉素合用

答案: A

62. 药师应对处方进行审核、依照处方准确、快速地调配，体现处方的

A: 经济性

B: 法律性

C: 有效性

D: 技术性

答案：D

63. 可能引起肺间质病变的药物是（）

- A: 羟氯喹
- B: 硫唑嘌呤
- C: 甲氨蝶呤
- D: 柳氮磺吡啶

答案：C

64. （2017 年真题）服用后可致嗜睡，驾驶员应慎用的药物是（）

- A: 胰酶
- B: 阿司匹林
- C: 吲达帕胺
- D: 氯苯那敏

答案：D

65. 是归纳、综合、整理后的出版物，使用最为广泛

- A: 研究论文
- B: 二级文献
- C: 药学网络
- D: 三级文献源

答案：D

66. 服药期间饮酒可引起低血糖反应的是

- A: 西咪替丁
- B: 硫酸亚铁
- C: 维生素
- D: 格列本脲

答案：D

67. 口服避孕药对机体代谢的影响，正确的为

- A: 低密度脂蛋白升高
- B: 甘油三酯降低
- C: 高密度脂蛋白降低
- D: 糖耐量异常

答案：D

68. 静滴亚硝酸钠用于解救

- A: 有机磷杀虫药中毒
- B: 瘦肉精中毒
- C: 氟乙酰胺中毒
- D: 氰化氢中毒

答案：D

69. 可引起尿液碱度降低的疾病是

- A: 痛风
- B: 肾小管性酸中毒
- C: 应用碳酸氢钠
- D: 呼吸性碱中毒

答案：A

70. 《药物事实与比较》属于

- A: 药物综合信息
- B: 药物相互作用
- C: 药品标准
- D: 药品不良反应

答案：A

71. 血液净化疗法可使重症毒物中毒者愈后大为改观，血液净化的方法不包括

- A: 血液置换
- B: 血液滤过
- C: 腹膜透析
- D: 血液透析

答案：A

72. 在配制静脉输液时，不宜用葡萄糖注射液溶解的药品是

- A: 两性霉素 B
- B: 盐酸万古霉素
- C: 维生素 K
- D: 青霉素

答案：D

73. 苯二氮

- A: 艾司唑仑
- B: 阿米替林
- C: 丁螺环酮
- D: 舍曲林

答案：A

74. 对乙酰氨基酚的妊娠毒性分级是（）

- A: X 级
- B: B 级
- C: A 级

D: C 级

答案: B

75. 患者，女，28 岁，妊娠 27 周，头晕 3 天。入院查体：血压 160/100mmHg，诊断为：妊娠高血压。

A: 尼莫地平注射液

B: 葡萄糖酸钙注射液

C: 硫酸镁注射液

D: 甲氧氯普胺注射液

答案: C

76. 泌尿系统感染可能出现

A: 尿沉渣管型

B: 尿沉渣白细胞

C: 尿沉渣尿酸盐

D: 尿沉渣结晶

答案: B

77. 痛风患者急性关节炎期间常见单个关节出现红、肿、热、痛，最常见的病变部位是

A: 第一跖趾关节

B: 腰椎关节

C: 胸椎关节

D: 颈椎关节

答案: A

78. 属于药物信息服务的最重要的部分的是

A: 对文献进行评价、分析和整理

B: 形成答案并以口头形式提供给询问者

C: 确立有效的检索方法、查阅文献

D: 对问题进行确定并归类

答案：B

79. 马来酸氯苯那敏（扑尔敏）用于良性前列腺增生症患者，导致尿潴留，属于

A: 有禁忌证用药

B: 超适应证用药

C: 过度治疗用药

D: 无适应证用药

答案：A

80. 嗜碱性粒细胞正常值参考范围是

A: 0~0.01

B: 0.03~0.08

C: 0.01~0.05

D: 0.20~0.40

答案：A

81. 妊娠期尿路感染宜选用

A: 四环素？

B: 丙硫氧嘧啶？

C: 阿莫西林？

D: 喹诺酮类？

答案：C

82. 患者，男，70 岁，右手抖动和行走缓慢 3 个月，经过神经科检查后诊断为帕金森病，既往前列腺肥大史 3 年，临床上对该患者不宜选用

:

- A: 多巴丝肼
- B: 苯海索
- C: 司来吉兰
- D: 左旋多巴

答案: B

83. (用药与尿液检查异常)阿司匹林可能引起

- A: 尿肌酐
- B: 尿酮体
- C: 尿血红蛋白
- D: 尿沉渣结晶

答案: C

84. 伴有心脏病、高血压者应慎用的药品是

- A: 含氯苯那敏的抗感冒药
- B: 含咖啡因的抗感冒药
- C: 含右美沙芬的抗感冒药
- D: 含伪麻黄碱的抗感冒药

答案: D

85. 舒肝丸与甲氧氯普胺合用

- A: 合用后增加毒性，出现药物中毒
- B: 两者合用作用相反，互相降低药效
- C: 合用后抑制后者吸收，降低疗效

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: 合用抑制呼吸，易致呼吸衰竭

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/147115141052010024>