

2024 年广东省陆河县《执业药师之西药学综合知识与技能》考试题库大全附答案（实用）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 促进机体的利用的是

- A: 维生素 C 与铁剂同服
- B: 普萘洛尔联用硝苯地平降血压
- C: 亚胺培南-西司他汀复方制剂
- D: 磷霉素联用其他抗菌药物

答案：A

2. 患者，男，54 岁，2 周前痛风急性发作，经治疗后病情缓解，后期针对其痛风的治疗不宜选用的药物是()

- A: 非布索坦
- B: 秋水仙碱
- C: 别嘌醇
- D: 苯溴马隆

答案：B

3. 某溶液的浓度为 1：100，其含义为

- A: 1L 溶液中含有的溶质为 0.1mol
- B: 100ml 溶液中含有 1g 溶质
- C: 100g 溶液中含有 1g 溶质
- D: 100ml 溶液中含有 1ml 溶质

答案：B

4. 属于 H₂ 受体拮抗剂的是 ()

- A: 埃索美拉唑
- B: 铝碳酸镁
- C: 法莫替丁
- D: 多潘立酮

答案: C

5. 患者，男，体检发现血清尿素氮升高，血肌酐升高，其他生化指标，该患者最可能患有：

- A: 血液疾病
- B: 肝脏疾病
- C: 肾脏疾病
- D: 心脏疾病

答案: C

6. 写明稀释比例和使用时间，是指

- A: 实现个体化治疗
- B: 医嘱清楚准确
- C: 修订医嘱及时沟通
- D: 医嘱完整不漏项

答案: D

7. 不宜用热水送服的药物是

- A: 去氢胆酸
- B: 双膦酸盐
- C: 氨茶碱
- D: 整肠生

答案：D

8. (2015 年真题) 患儿，女，4 岁半，身高 110cm，体重 15kg，一天前开始发热 (39.1℃)，咽稍痛，无咳嗽，无吐泻，家长在家选用退烧药对症治疗。发热 20h 左右出现腹泻，约 2~3h 一次大便，量少，黄色粘液便，呕吐 1 次。体格检查，T38.8℃，P118 次/分，R28 次/分，咽微充血。出现轻微脱水症状。双肺呼吸音清，腹平软，肝脾未触及，肠鸣音活跃。实验室检查：WBC $18.5 \times 10^9/L$ (参考值 $4.0 \times 10^9 \sim 10.0 \times 10^9$)，粪便镜检可见红、白细胞。

- A: 若患儿腹泻加重，可口服自制补液盐进行补液
- B: 若症状不能改善，可及时加用诺氟沙星
- C: 每次腹泻后均要少量多次喂水，直至腹泻停止
- D: 应给予少量、多次、清淡饮食

答案：B

9. 药学服务的具体工作不包括

- A: 处方审核
- B: 治疗药物监测
- C: 关注特殊人群
- D: 参与临床药物治疗

答案：C

10. 能提示患者大量或长期应用广谱抗生素的粪便细胞显微镜检出物是

- A: 真菌
- B: 红细胞
- C: 吞噬细胞增多
- D: 上皮细胞

答案：A

11. 药物不良反应报告的描述项目

A: 患者疾病发病时间

B: 患者用药记录

C: 采取措施干预不良反应的时间

D: 药品不良反应动态变化的相关症状体征、检查及干预措施结果

答案: D

12. 患者女 27 岁确诊慢性乙型肝炎 3 年，近日化验结果:HBV-DNA 2×10^5 opies/ml,ALT122U/L. 拟予以病毒治疗首选的药物是()

A: 泛昔洛韦

B: 利巴韦林

C: 恩替卡韦

D: 阿糖腺苷

答案: C

13. 属于选择性 GABAA 复合受体拮抗剂

A: 唑吡坦

B: 阿戈美拉汀

C: 米氮平

D: 艾司唑仑

答案: A

14. (2017 年真题) 下列关于失眠药物治疗策略的说法, 正确的是 ()

A: 药物治疗开始后应及时开展血药浓度监测

B: 原发性失眠在非药物治疗无效时首选苯二氮卓类抗失眠药

C: 焦虑症患者存在失眠时以失眠药物为主

D: 失眠继发于或伴发于其他疾病时, 应同时治疗原发或伴发疾病

答案：D

15. 抗结核联合治疗方案中可出现橘红色尿的药物是()

- A: 乙胺丁醇
- B: 吡嗪酰胺
- C: 利福平
- D: 左氧氟沙星

答案：C

16. 治疗痔疮的常用内服药是

- A: 九华膏
- B: 联苯苄唑乳膏
- C: 地奥司明
- D: 聚甲酚磺醛栓

答案：C

17. 患者，男，45岁，患有高血压，因感冒发热，咽痛，流鼻涕到药店买药，药师不应推荐其使用的药物是()

- A: 复方酚咖伪麻胶囊
- B: 维C银翘片
- C: 速克感冒片
- D: 速感宁胶囊

答案：A

18. 癫痫持续状态首选的治疗方案是()

- A: 口服地西泮 10mg
- B: 静脉注射地西泮 10mg
- C: 静脉注射丙戊酸钠 200mg

D: 口服丙戊酸钠 200mg

答案: B

19. 二氢吡啶类钙通道阻滞药硝苯地平引起的主要不良反应是

A: 低钾血症

B: 多毛症

C: 高钾血症

D: 水肿

答案: D

20. 其含量用视黄醇当量(RE)表示的是

A: 维生素 A

B: 维生素 D

C: 维生素 B

D: 维生素 E

答案: A

21. 处方的法律性质主要是指()。

A: 因开具处方或调配处方所造成的医疗差错或事故，医师和药师分别负有相应的法律责任

B: 药师具有审核、调配处方权和开具处方权

C: 医师具有诊断权和开具处方权和调配处方权

D: 因处方所造成的医疗差错或事故，医师负有法律责任

答案: A

22. 表现为"牛肉样舌"的疾病为

A: 再生障碍性贫血

B: 缺铁性贫血

C: 淋巴瘤

D: 巨幼细胞性贫血

答案: D

23. 国际标准化比值是血栓性疾病患者实施抗凝治疗的依据，其正常参考区间是

A: >1.5

B: <0.8

C: 2

D: $0.8\sim1.5$

答案: D

24. 非甾体抗炎药引起的典型药源性肌病是

A: 神经系统疾病

B: 胃肠道疾病

C: 血液系统疾病

D: 肌病

答案: B

25. 应用两种以上药物以增强与确保疗效

A: 规律

B: 联合

C: 早期

D: 适量

答案: B

26. 依据权威的专科诊疗指南是

A: 药物治疗的方便性

- B: 药物治疗的规范性
- C: 药物治疗的有效性
- D: 药物治疗的安全性

答案：B

27. 氟马西尼用于解救的是（）

- A: 有机磷中毒
- B: 氰化物中毒
- C: 三唑仑中毒
- D: 汞中毒

答案：C

28. 杨某，女，19 岁，咳嗽、有脓性痰，并伴有胸痛；发热 39℃；肺闻及湿性啰音；WBC $>13\times 10$

- A: 社区获得性肺炎
- B: 支气管炎
- C: 哮喘
- D: 肺结核

答案：A

29. 患者，男，72 岁，以“间断发热、纳差、精神抑郁半年，再发高热 1 天”为主诉入院，既往体健，无高血压、糖尿病、冠心病史。入院时查体：T36.9℃，P88 次/分，R22 次/分，BP112 / 77mmHg，可触及颈部、锁骨上、腋下多部位浅表淋巴结肿大。经实验室检查、影像学检查，确诊为非霍奇金淋巴瘤。

- A: 顺铂+利妥昔单抗+格拉司琼+芬太尼
- B: 紫杉醇+吉非替尼+环磷酰胺+美司钠
- C: 环磷酰胺+阿霉素+长春新碱+泼尼松

D: 伊立替康+环磷酰胺+甲氨蝶呤+地塞米松

答案: C

30. 解救慢性重症铅性脑病患者给予

A: 卫生教育

B: 驱铅治疗

C: 补充蛋白质

D: 糖皮质激素

答案: D

31. 属于 5α -还原酶抑制剂，可抑制前列腺生长的药品

A: 阿夫唑嗪

B: 黄酮哌酯

C: 非那雄胺

D: 氟他胺

答案: C

32. 对急性心肌梗死引起的室性心律失常首选

A: 地高辛

B: 利多卡因

C: 普萘洛尔

D: 硝酸酯类

答案: B

33. 下列治疗老年痴呆药物可通过酸化尿液而显著增加其排泄的是

A: 碳酸氢钠

B: 加兰他敏

C: 多奈哌齐

D: 美金刚

答案: D

34. 粪外观所对应的疾病,阿米巴痢疾

A: 暗红果酱色

B: 柏油便, 黑色有光泽

C: 米泔水样

D: 白陶土便

答案: A

35. 某女性, 64 岁, 既往高血压病病史 15 年, 活动后心悸、气短 3 年, 2 小时前无明显诱因突发喘憋。体检:端坐体位, BP190/110mmHg, R30 次/分, HR108 次/分, 心界向左侧扩大, 双肺可闻及广泛湿啰音。

A: 肺动脉栓塞?

B: 急性左心衰竭?

C: 肺结核?

D: 支气管哮喘?

答案: B

36. 只能采用注射方式给药的药物是

A: 磷结合剂

B: 促红细胞生成素

C: 铁剂

D: 维生素 D

答案: B

37. 与对氨基苯甲酸 (PAPB) 化学结构相似, 可与 PAPB 竞争二氢叶酸合成酶的药物是

- A: 青霉素
- B: 磺胺嘧啶
- C: 四环素
- D: 链霉素

答案：B

38. 孕妇过量服用可诱发新生儿坏血病的药物是

- A: 复合维生素 B
- B: 葡萄糖酸钙
- C: 维生素 AD
- D: 维生素

答案：D

39. 低比重尿主要见于

- A: 急性肾小球肾炎
- B: 尿崩症
- C: 急性肾衰竭少尿期
- D: 糖尿病

答案：B

40. 静滴亚硝酸钠用于解救

- A: 氟乙酰胺中毒
- B: 有机磷杀虫药中毒
- C: 氰化氢中毒
- D: 瘦肉精中毒

答案：C

41. (2018 年真题) 患者, 女, 21 岁, 近半年来食欲亢进, 多汗体重明显减轻, 伴有乏力、心悸。就诊查体见双手震颤, 心率 104 次/分, 化验结果: 血清促甲状腺素 (TSH) $<0.1\text{mU/L}$, FT3、FT4 明显升高, 肝肾功能基本正常, 白细胞计数正常, 诊断为甲状腺功能亢进症。首选的治疗方案是 ()

- A: 注意休息补充营养, 使用甲巯咪唑治疗
- B: 甲状腺次全切除手术
- C: 选用 ^{131}I 治疗
- D: 碘化钾治疗, 定期复查

答案: A

42. 容易在乳汁中排泄的药物的理化特性主要是

- A: 弱酸性
- B: 分子量 <200
- C: 在脂肪中极易溶解
- D: 在水中容易溶解

答案: B

43. 患者, 女, 27 岁, 2 年前开始出现多汗、多食, 近期因消瘦、心悸就诊。查体: 甲状腺肿大, 根据血 T3、T4 及 TSH 检查结果, 诊断为甲亢。目前该患者正处于哺乳期。

- A: 粒细胞减少
- B: 皮疹
- C: 肝功能损害
- D: 头痛

答案: A

44. 药师应告知医师"血药浓度监测是提高治疗效果的重要措施"的事例是

- A: 地高辛用于肾功不全者须监测血药浓度
- B: 利巴韦林致畸与肿瘤
- C: 阿昔洛韦致急性肾衰竭
- D: 替加色罗存在心绞痛

答案: A

45. 哺乳期妇女应用下列药物会对乳婴产生何种不良影响,长期服用阿司匹林

- A: 可引起过期妊娠、产程过长和产后出血
- B: 可能引起乳婴视神经损害、智力障碍
- C: 导致新生儿血钙过高
- D: 可能致胎儿畸形

答案: A

46. 有关抗菌药物的局部应用,说法错误的是

- A: 眼部感染应首选眼药水滴定治疗
- B: 青霉素类、头孢菌素类药物不适宜局部应用
- C: 对于全身给药难以到达的感染部位,可局部加用抗菌药物
- D: 耳部革兰阴性菌感染应首选氨基糖苷类药物局部滴耳

答案: D

47. 卡托普利主要通过下列哪项而起抗慢性心功能不全的作用

- A: 利尿降压
- B: 抑制血管紧张素转化酶
- C: 扩张血管
- D: 拮抗钙

答案：B

48. 患者，男，35 岁。于中饭后即开始有胃部疼，胀满食少，现感觉脐周硬、闷痛拒按，于 1 日无改善情况下，前来医院就诊。诊断结果：因饱食而导致的继发性消化不良。

- A: 多潘立酮
- B: 复合消化酶胶囊
- C: 胰酶片
- D: 莫沙必利

答案：D

49. 结核病化学治疗成功的关键措施是

- A: 采用大剂量
- B: 避免与克服细菌耐药
- C: 采用间歇疗法
- D: 采用短程疗法

答案：B

50. 冠状动脉粥样硬化性心脏病患者，如无用药禁忌证，欲服用阿司匹林进行治疗，最佳剂量范围是（）

- A: 25～50mg / d
- B: 150～300mg / d
- C: 75～150mg / d
- D: 25～75mg / d

答案：C

51. 痛风慢性发作期间为促进尿酸排泄可选用

- A: 苯溴马隆

- B: 泼尼松龙
- C: 别嘌醇
- D: 秋水仙碱

答案：A

52. 膀胱炎占尿路感染的 60%以上，致病菌多为

- A: 白假丝酵母菌
- B: 大肠埃希菌
- C: 淋病奈瑟菌
- D: 金黄色葡萄球菌

答案：B

53. 下列关于三环类抗抑郁药中毒表现不正确的是

- A: 血压升高或下降
- B: 激惹、躁动
- C: 心律减慢
- D: 嗜睡、昏迷

答案：C

54. (2017 年真题) 患者,男,72 岁既往有高血压、心绞痛、心力衰竭、房室传导阻滞和胃溃疡病史。一个月前因出现哮喘症状就诊医师布地奈德气雾剂 200 μ g bid 吸入沙丁胺醇气雾剂 100 μ g prn 吸入,氨氯地平片 5mg qd 口服及硝酸甘油片 0.5mg prn 舌下含服治疗。

- A: 布地奈德剂量太大
- B: 氨氯地平的不良反应
- C: 硝酸甘油剂量不足
- D: 沙丁胺醇的不良反应

答案：D

55. 苯二氮

A: 舍曲林

B: 阿米替林

C: 艾司唑仑

D: 丁螺环酮

答案: C

56. 药品外观质量检查时，下列哪种药品需要进行澄明度检查

A: 糖浆剂

B: 注射剂

C: 片剂

D: 口服液

答案: B

57. (2016 年真题) 患者，女，1 岁 6 个月，因感冒发热到医院就诊，医生处方对乙酰氨基酚滴剂，药师误发成对乙酰氨基酚片，患者家属拿到药品后不知如何使用，故询问药师，此时药师发现发错了药。针对该类型差错，有效的防范措施是 ()。

A: 采用电子处方系统

B: 使用药片通用名

C: 双人核对

D: 采用两种方式核对患者身份

答案: C

58. 抗结核药异烟肼与昆布合用可以失去抗结核杆菌的功能，是因为昆布中含有

A: 碘

B: 钙

C: 氯

D: 钾

答案：A

59. 治疗急迫性尿失禁的首选药物是

A: 选择性 α_1 激动剂

B: α_1 阻断剂

C: 5α 还原酶抑制剂

D: 抗胆碱能药物

答案：D

60. 治疗窗窄以及代谢存在较大个体差异的药物是（）

A: 地高辛

B: 茶碱

C: 顺铂

D: 苯妥英钠

答案：B

61. 切忌直接静脉注射，应于临用前稀释，否则不仅会引起剧痛，且可致心脏停搏的药物是

A: 青霉素

B: 两性霉素 B

C: 头孢曲松钠

D: 氯化钾

答案：D

62. 患者，女，27 岁，2 年前开始出现多汗、多食，近期因消瘦、心悸就诊。查体：甲状腺肿大，根据血 T3、T4 及 TSH 检查结果，诊断为甲亢。目前该患者正处于哺乳期。

- A: 虾皮
- B: 紫菜
- C: 海带
- D: 不含碘的食用盐

答案：D

63. 结核病、水痘、麻疹、百日咳、流行性腮腺炎等传染病可呈现

- A: 中性粒细胞增多
- B: 单核细胞增多
- C: 淋巴细胞增多
- D: 嗜酸性粒细胞增多

答案：C

64. 第二代抗组胺药氯雷他定治疗过敏性鼻炎的用法、用量是

- A: 一次 10mg，每日 1 次
- B: 一次 2mg，每日 3 次
- C: 一次 4mg，每日 1 次
- D: 一次 4mg，每日 3 次

答案：A

65. 属于钙通道阻滞剂（第Ⅳ类）的抗心律失常药是

- A: 拉贝洛尔
- B: 维拉帕米
- C: 美西律
- D: 胺碘酮

答案：B

66. 血清天门冬氨酸氨基转移酶正常参考区间是

- A: 男性 11~50U/L
- B: 成人<50U/L
- C: 成人<40U/L
- D: 男性<40U/L

答案：C

67. 治疗药源性疾病的方法如下，最先采用的是

- A: 停用致病药物
- B: 对症治疗
- C: 调整治疗方案
- D: 拮抗致病药物

答案：A

68. 患者，女，30 岁，情感低落、反应迟钝半年余，晨重夜轻，临床诊断为抑郁症。

- A: 3 周
- B: 2 周
- C: 1 周
- D: 4 周

答案：B

69. 尤以铅中毒疗效好的解毒剂是

- A: 青霉胺
- B: 二巯丁二钠
- C: 依地酸钙钠

D: 二巯丙醇

答案: C

70. 患者，女，27 岁，确诊慢性乙型肝炎 3 年。近日化验结果：HBV-DNA 2×10^5 copies/ml，ALT122U/L。拟予以抗病毒治疗，首选的药物是

A: 阿糖腺苷

B: 泛昔洛韦

C: 利巴韦林

D: 恩替卡韦

答案: D

71. 患者，女，55 岁，关节痛半年，临床诊断为类风湿关节炎，既往有十二支肠溃疡病史，应首选的 NSAID 类药物是

A: 布洛芬

B: 吲哚美辛

C: 双氯芬酸

D: 塞来昔布

答案: D

72. 可引起胎儿肢体、耳、内脏畸形的是

A: 沙立度胺

B: 甲巯咪唑

C: 氮芥类

D: 雌孕激素

答案: A

73. 药师发药时提示患者“用药期间禁止饮酒或含酒精饮料”，针对的药物是

- A: 氟西汀
- B: 铋制剂
- C: 卡托普利
- D: 氯苯那敏

答案：A

74. (2016 年真题) 缓解视疲劳可选用的药物是 ()。

- A: 氧氟沙星滴眼液
- B: 羟甲基纤维素钠滴眼液
- C: 酞丁安滴眼液
- D: 色甘酸钠滴眼液

答案：B

75. 可改善睫状肌功能和增加睫状肌血流量，改善眼部调节功能的药物是

- A: 七叶洋地黄双苷滴眼液
- B: 玻璃酸钠滴眼液
- C: 羟甲基纤维素钠滴眼液
- D: 聚乙烯醇滴眼液

答案：A

76. 服用后可致嗜睡，驾驶员应慎用的药物是 ()

- A: 胰酶
- B: 阿司匹林
- C: 氯苯那敏
- D: 吲达帕胺

答案：C

77. 服用左旋多巴时应避免同时进食蛋白质类食物，应隔开

- A: 1~1.5 小时
- B: 1.5~2 小时
- C: 0.5~1 小时
- D: 2~3 小时

答案：D

78. 由服用利尿剂所引起的尿失禁属于（）

- A: 真性尿失禁
- B: 急性、可逆性/暂时性尿失禁
- C: 压力性尿失禁
- D: 急迫性尿失禁

答案：B

79. 患者，男性，30 岁，确诊为支气管哮喘，入院治疗 3 周，经正规治疗病情缓解，仅偶有胸闷，出院时医生嘱咐了一些用药注意事项。

- A: 异丙托溴铵气雾剂
- B: 酮替酚
- C: 二丙酸倍氯米松气雾剂
- D: 特布他林气雾剂

答案：C

80. 关于抗抑郁药用药注意事项及患者教育的说法，错误的是

- A: 联合用药效果好，应为首选
- B: 氟西汀停药 5 周之后才能换用 MAOIs
- C: 多种抗抑郁药合并使用，可增加 5-HT 综合征的发生风险
- D: 尽可能采用最小有效剂量

答案：A

81. 用于颠茄类生物碱中毒的解救药物是

- A: 碘解磷定
- B: 毛果芸香碱
- C: 亚甲蓝
- D: 阿托品

答案：B

82. 影响药品质量的环境因素不包括

- A: 人员设置
- B: 振荡
- C: 时间
- D: 日光

答案：A

83. 属于非核苷类逆转录酶抑制剂的是（）

- A: 依非韦伦
- B: 齐多夫定
- C: 利托那韦
- D: 利巴韦林

答案：A

84. 下列治疗痤疮的药物中，患者在治疗期间及治疗结束后 1 个月应避免献血的是：

- A: 红霉素
- B: 异维 A 酸
- C: 过氧甲苯酰
- D: 克林霉素

答案：B

85. (2019 年真题) 患者，女，27 岁，确诊慢性乙型肝炎 3 年，近日化验结果：HBV-DNA 2×10^5 opies/ml，ALT122U/L。予以抗病毒治疗首选的药物是

- A: 泛昔洛韦
- B: 恩替卡韦
- C: 利巴韦林
- D: 阿糖腺苷

答案：B

86. 可引起嗜酸性粒细胞增多的药物是()

- A: 头孢氨苄
- B: 氯苯那敏
- C: 坎地沙坦
- D: 碳酸氢钠

答案：A

87. 膀胱炎约占尿路感染的 60%以上，致病菌多为()

- A: 金黄色葡萄球菌
- B: 奈瑟淋病双球菌
- C: 白色念珠菌
- D: 大肠埃希菌

答案：D

88. 粪便隐血可见于

- A: 胃溃疡

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

B: 痛经

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/147132112052010024>