专业《执业药师之西药学专业二》考试必背200题题库，word格式可自由下载编辑，附完整答案！

2024年福建省同安区《执业药师之西药学专业二》考试必背200题通关秘籍题库【各地真题】

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.抑制骨髓造血功能的是

A：庆大霉素

B：四环素

C：氯霉素

D：红霉素

答案：C

2.氯霉素最严重的不良反应是

A：二重感染

B：肝脏损害

C：胃肠道反应

D：抑制骨髓造血功能

答案：D

3.无抗结核作用的是

A：红霉素

B：异烟肼

C：乙胺丁醇

D：吡嗪酰胺

答案：A

4.阿托品引起便秘的原因是()

A：抑制排便反射

B：松弛肠道平滑肌

C：使括约肌兴奋

D：抑制胃肠道腺体分泌

答案：B

5.（2016年真题）不属于口服避孕药所致不良反应的是

A：突破性出血

B：月经失调

C：增加血栓栓塞性疾病风险

D：低钙血症

答案：D

6.铁剂的适应证为()

A：缺铁性贫血

B：再生障碍性贫血

C：恶性贫血

D：巨幼红细胞性贫血

答案：A

7.属于第二代a1肾上腺素受体阻断剂的是

A：特拉唑嗪

B：他达拉非

C：西地那非

D：度他雄胺

答案：A

8.阿司匹林与华法林合用

A：诱发胃肠道溃疡出血

B：心源性水肿

C：头晕、头痛、血压下降

D：抗凝血作用增强

答案：D

9.铋剂连续服用不得超过2个月，是因为长期服用可导致()

A：神经毒性

B：大便呈黑色

C：舌苔变黑

D：肝功能损害

答案：A

10.利尿作用较弱，具有排钠留钾作用，可作用与慢性心力衰竭治疗的利尿剂是

A：呋塞米

B：螺内酯

C：氢氯噻嗪

D：乙酰唑胺

答案：B

11.阿奇霉素()

A：与庆大霉素合用于铜绿假单胞菌感染时不能混合静脉滴注

B：脑脊液中浓度较高，酶稳定性高，适用于脑膜炎

C：肾毒性较大

D：用于非典型致病原感染

答案：D

12.氨苄西林()
A：特别对铜绿假单胞菌有效
B：对G
C：对G
D：抗菌作用强，对厌氧菌有效
答案：C

13.关于苯丙哌林与可待因镇咳作用强度比较，正确的是
A：可待因镇咳作用约为苯丙哌林的2倍
B：可待因镇咳作用约为苯丙哌林的2～4倍
C：苯丙哌林镇咳作用约为可待因的2倍
D：苯丙哌林镇咳作用约为可待因的2～4倍
答案：D

14.（2015年真题）散瞳和调节睫状肌麻痹宜选用（）。
A：毛果芸香碱滴眼液
B：复方托吡卡胺滴眼液
C：碘苷滴眼液
D：左氧氟沙星滴眼液
答案：B

15.非麻醉性镇痛药中属于中枢性镇痛药的是
A：曲马多
B：布洛芬
C：秋水仙碱
D：吗啡
答案：A

16.氨基糖苷类

A：禁用于胆道阻塞患者

B：禁用于早产儿、新生儿

C：禁用于8岁以下儿童

D：禁用于18岁以下儿童及青少年

答案：C

17.抑制心肌收缩力、延长APD及ERP的药物是()

A：苯妥英钠

B：奎尼丁

C：利多卡因

D：美西律

答案：B

18.育龄女性在无防护的性生活或避孕失败72小时内,宜使用的口服紧急避孕药物是（）

A：炔雌醇去氧孕烯（30g/150g）

B：十一酸睾酮（40mg）

C：左炔诺孕酮（1

D：复方醋酸环丙孕酮（35μg/2mg）

答案：C

19.（2016年真题）对血小板聚集及凝血机制无影响的药品是

A：对乙酰氨基酚

B：吲哚美辛

C：阿司匹林

D：罗非昔布

答案：A

20.与氢氯噻嗪不存在交叉过敏反应的是

A：依他尼酸

B：呋塞米

C：磺胺类药

D：布美他尼

答案：A

21.第一代蒽环类抗肿瘤药物，主要用于急性白血病的药物是

A：表柔比星

B：多柔比星

C：柔红霉素

D：吡柔比星

答案：C

22.关于应对顺铂所致肾毒性的措施，下列说法错误的是

A：肾功能不全者可以使用

B：必要时给予碳酸氢钠碱化尿液和别嘌醇

C：使用时应充分水化，并及时给予利尿剂

D：定期监测电解质、肾功能

答案：A

23.患者，男，68岁。发热伴咳嗽1周，表情淡漠、气急。近2天全身散在出血点及淤斑，血压60/40mmHg，血红蛋白120g/L，白细胞12×10

A：维生素C

B：维生素K

C: 鱼精蛋白

D: 低分子量肝素

答案：C

24.可用于骨和关节感染的药物是()

A: 林可霉素

B: 四环素

C: 万古霉素

D: 青霉素

答案：A

25.关于硝基呋喃类，下列叙述哪项是错误的

A: 耐药率低

B: 血浆药物浓度低

C: 口服吸收好

D: 抗菌谱广

答案：C

26.属于非麻醉性镇痛药的是

A: 可待因

B: 吗啡

C: 美沙酮

D: 布洛芬

答案：D

27.长期频繁使用可致眼部真菌感染

A: 氯霉素

B: 利巴韦林

C: 更昔洛韦

D: 四环素可的松

答案：D

28.抑制核苷酸还原酶

A: 甲氨蝶呤

B: 羟基脲

C: 氟尿嘧啶

D: 阿糖胞苷

答案：B

29.低分子量肝素的作用靶点是

A: 因子Xa

B: 因子IXa

C: 凝血酶III（AT—III）

D: 因子IIa

答案：C

30.硫脲类抗甲状腺药起效慢的主要原因是()

A: 口服后吸收不完全

B: 待已合成的甲状腺素耗竭后才能生效

C: 肾脏排泄速度快

D: 肝内代谢转化快

答案：B

31.影响疟原虫叶酸代谢过程的抗疟药是

A: 奎宁

B: 青蒿素

C：乙胺嘧啶

D：伯氨喹

答案：C

32.（2018年真题）同时具有短效和长效（双时相）作用的胰岛素/胰岛素类似物是（）

A：精蛋白锌胰岛素注射液

B：预混胰岛素注射液

C：普通胰岛素注射液

D：甘精胰岛素注射液

答案：B

33.危重哮喘患者治疗时，剂量过高可引起严重低钾血症的药物是

A：吸入性糖皮质激素

B：噻托溴铵

C：孟鲁司特

D：沙丁胺醇

答案：D

34.关于地西泮的作用特点，叙述错误的是

A：小于镇静剂量时即有抗焦虑作用

B：可增强其他中枢抑制药的作用

C：剂量加大可引起麻醉

D：有良好的抗癫痫作用

答案：C

35.下述药物中用于拮抗肝素过量的是

A：维生素K1

B: 鱼精蛋白

C: 氨甲苯酸

D: 维生素

答案：B

36.（2019年真题）服用后易出现呃逆、腹胀和嗳气，甚至引起反跳性胃酸分泌增加的药物是（）

A: 奥美拉唑

B: 替普瑞酮

C: 胶体果胶铋

D: 复方碳酸钙

答案：D

37.婴儿尿布皮炎外用激素制剂应限于

A: 2周

B: 3天

C: 5～7天

D: 3～5天

答案：C

38.男性，70岁，进食后饱胀不适伴反酸5年余，黑便1天。胃镜检查提示：胃多发性溃疡（A1期）伴出血。

A: 埃索美拉唑

B: 克拉霉素

C: 胶体果胶铋胶囊

D: 硝苯地平缓释片

答案：A

39.可以改善心肌缺血的是

A：果糖

B：维生素

C：葡萄糖

D：脂肪乳

答案：A

40.林旦不应与碱性物质或铁器接触。口诀：“碱淡淡铁旦旦”。

A：阿达帕林

B：克罗米通

C：林旦

D：莫匹罗星

答案：C

41.属于促凝血因子活性药的是

A：甲萘氢醌

B：酚磺乙胺

C：鱼精蛋白

D：氨甲环酸

答案：B

42.属于延长动作电位时程类的广谱抗心律失常药物的是()

A：普罗帕酮

B：奎尼丁

C：胺碘酮

D：普鲁卡因胺

答案：C

43.他汀类所引起的肝损害特点不包括

A：肝毒性与剂量无关

B：当转氨酶升高至正常值上限的3倍以上，需要减量或停药

C：所有他汀类药物都产生肝毒性

D：使用辛伐他汀当转氨酶升高至正常值上限的3倍需停药

答案：A

44.强效（使LDL-ch水平降低≥50%）的他汀类调血脂药

A：大剂量阿托伐他汀

B：依折麦布

C：小剂量阿托伐他汀

D：小剂量氟伐他汀

答案：A

45.属于血小板膜蛋白IIb/IIIa受体阻断剂的是

A：替罗非班

B：阿司匹林

C：氯吡格雷

D：奥扎格雷

答案：A

46.（2018年真题）可抑制粒细胞浸润和白细胞趋化,用于痛风急性发作的药物是（）

A：苯溴马隆

B：非布索坦

C：别嘌醇

D：秋水仙碱

答案：D

47.可产生严重的低血压、皮疹、高钾血症的肾素抑制剂是()

A: 利血平

B: 哌唑嗪

C: 阿利克仑

D: 甲基多巴

答案：C

48.（2019年真题）长期用药易发生低镁血症的药物是（）

A: 胶体果胶铋

B: 复方碳酸钙

C: 替普瑞酮

D: 奥美拉唑

答案：D

49.不耐酸，口服剂型多制成酯化物的是

A: 红霉素

B: 克拉霉素

C: 罗红霉素

D: 克林霉素

答案：A

50.人工合成的第一个应用于临床的单环 β-内酰胺类抗生素是()

A: 氨苄西林

B: 氨曲南

C: 头孢唑林

D: 舒巴坦

答案：B

51.治疗膀胱过度活动症宜选用

A: 尼莫地平

B: 托特罗定

C: 坦洛新

D: 利血平

答案：B

52.服用抗帕金森病药恩他卡朋的患者，其尿液可变成

A: 淡绿色

B: 蓝绿色

C: 红棕色

D: 深蓝色

答案：C

53.治疗冠状动脉痉挛所致的变异型心绞痛最为有效的药物是()

A: 比索洛尔

B: 硝酸异山梨酯

C: 氨氯地平

D: 氯沙坦

答案：C

54.属于嘧啶类的是

A: 卡泊芬净

B: 氟胞嘧啶

C: 特比萘芬

D: 制霉菌素

答案：B

55.需要皮下注射的糖尿病治疗药物是

A：艾塞那肽

B：阿卡波糖

C：二甲双胍

D：那格列奈

答案：A

56.下列有关奎尼丁的叙述，不正确的是

A：可用于强心苷中毒

B：抑制Na+内流和K+外流

C：具有抗胆碱和仅受体阻断作用

D：可用于治疗心房扑动和心房颤动

答案：A

57.（2018年真题）患者,女,28岁,因“多汗、心慌、消瘦、易怒半月余”就诊,实验室检查显示FT4和FT3均升高,TSH降低,甲状腺Ⅰ度肿大,心率92次/分,诊断为“甲状腺功能亢进症”简称甲亢”。给予甲巯咪唑片10mg，一日3次盐酸普萘洛尔片10mg,日3次。患者1月后复查,FT3和FT4恢复正常,但出现膝关节疼痛。

A：可以妊娠,选择适当的抗甲状腺药物以最小剂量维持

B：甲状腺激素水平恢复正常后即可停药准备妊娠

C：不可停药妊娠,应手术切除甲状腺后再准备妊娠

D：妊娠期间应将甲状腺功能维持在正常下限

答案：A

58.氯霉素的抗菌作用机制是

A：阻止氨基酰-tRNA与细菌核糖体30S亚基结合，影响蛋白质的合成

B: 与细菌核糖体50S亚基结合，抑制肽酰基转移酶的活性，从而阻止肽链延伸，使蛋白质合成受阻

C: 抑制二氢叶酸合成酶，影响叶酸的合成

D: 改变细菌胞浆膜通透性，使重要的营养物质外漏

答案：B

59.下述药物中不可用于治疗疥疮的是

A: 过氧苯甲酰

B: 苯甲酸苄酯

C: 林旦霜

D: 硫黄软膏

答案：A

60.属于Ⅰa类抗心律失常药的是

A: 普罗帕酮

B: 奎尼丁

C: 胺碘酮

D: 利多卡因

答案：B

61.注射用二磷酸果糖5～10g稀释于5%～10%葡萄糖注射液100ml中，滴速应控制在

A: 10～40mg/min

B: 100～300mg/min

C: 400～1000mg/min

D: 60～100mg/min

答案：C

62.作用机制是抗代谢的是

A：巯嘌呤

B：吉非替尼

C：紫杉醇

D：枸橼酸他莫昔芬

答案：A

63.下列关于镇痛药物的禁忌证，错误的是

A：多痰患者禁用可待因

B：颅脑损伤患者禁用羟考酮

C：心源性哮喘禁用吗啡

D：室上性心动过速禁用哌替啶

答案：C

64.下列氟喹诺酮类抗菌药物中，原形从肾脏排泄率最高的是

A：诺氟沙星

B：环丙沙星

C：氧氟沙星

D：氟罗沙星

答案：C

65.别嘌醇抗痛风的作用机制是

A：抑制近端肾小管对尿酸盐的重吸收，使尿酸排出增加

B：抑制黄嘌呤氧化酶，阻止次黄嘌呤和黄嘌呤代谢为尿酸

C：可促进尿酸分解，将尿酸转化为一种溶解性更好的尿囊素

D：抑制粒细胞浸润和白细胞趋化

答案：B

66.泛昔洛韦口服后代谢为

A：阿昔洛韦

B：更昔洛韦

C：西多福韦

D：喷昔洛韦

答案：D

67.强心苷中毒所致的心室纤颤宜选用()

A：利多卡因

B：普罗帕酮

C：地尔硫

D：胺碘酮

答案：A

68.由于分子结构上的差异，导致铂类化合物的各自毒性亦有所区别典型不良反应为恶心、呕吐、肾毒性和耳毒性的是

A：顺铂

B：奥沙利铂

C：亚叶酸钙

D：卡铂

答案：A

69.男性，70岁，进食后饱胀不适伴反酸5年余，黑便1天。胃镜检查提示：胃多发性溃疡（A1期）伴出血。13C呼气试验：Hp（+）。患者既往有高血压病史8年，口服替米沙坦、美托洛尔及硝苯地平控制血压。医嘱：0．9%氯化钠注射液100ml+注射用埃索美拉唑钠40mg，静脉滴注，2次／日；阿莫西林胶囊1g，口服，2次／日；克拉霉素缓释胶囊0．5g，口服，2次／日；注射用蛇毒血凝酶1KU，静脉注射，1次／日；替米沙坦40mg，口服，1次／日；硝苯地平缓释片30mg，口服，1次／日；美托洛尔12．5mg，口服，2次／日；胶体果胶铋胶囊100mg，口服，3次／日。

A: 美托洛尔

B: 胶体果胶铋胶囊

C: 替米沙坦

D: 埃索美拉唑钠

答案：B

70.氟尿嘧啶、卡培他滨属于()

A: 胸腺核苷合成酶抑制剂

B: DNA多聚酶抑制剂

C: 二氢叶酸还原酶抑制剂

D: 核苷酸还原酶抑制剂

答案：A

71.（2015年真题）属于膨胀性泻药的是（）。

A: 甘油（开塞露）

B: 聚乙二醇4000

C: 酚酞

D: 乳果糖

答案：B

72.关于甲氨蝶呤，下列说法中错误的是

A：主要用于治疗急性白血病

B：是二氢叶酸合成酶抑制剂

C：是二氢叶酸还原酶抑制剂

D：强酸条件下的水解产物是谷氨酸和蝶呤酸

答案：B

73.高钠血症是指

A：血钠＞140mmol/L

B：血钠＞130mmol/L

C：血钠＞145mmol/L

D：血钠＞135mmol/L

答案：C

74.可用于缓解绝经后更年期症状的药品是()。

A：地屈孕酮

B：戊酸雌二醇

C：他莫昔芬

D：依普黄酮

答案：B

75.属于维生素K拮抗剂的抗血栓药是

A：维生素K

B：肝素

C：华法林

D：达比加群酯

答案：C

76.长期大剂量服用可产生欣快感，可能出现药物依赖性的具有阿片样作用的止泻药是

A：地芬诺酯

B：硫酸镁

C：洛哌丁胺

D: 蒙脱石散

答案：A

77.不易引起严重乳酸血症的双胍类药物是

A: 甲苯磺丁脲

B: 苯乙双胍

C: 阿卡波糖

D: 二甲双胍

答案：D

78.（2016年真题）属于α1受体阻断剂的抗良性前列腺增生症的药品是

A: 酚妥拉明

B: 普适秦

C: 度他雄胺

D: 特拉唑嗪

答案：D

79.在虫体神经肌肉接头处发挥抗胆碱作用，阻断乙酰胆碱对蛔虫肌肉的兴奋作用，或改变虫体肌肉细胞膜对离子的通透性，影响神经自发冲动的传递；亦可抑制琥珀酸盐的产生，减少能量的供应，从而阻断神经肌肉接头处，使冲动不能下达，使蛔虫从寄生的部位脱开，随肠蠕动而排出体外的药物是

A: 左旋咪唑

B: 阿苯达唑

C: 哌嗪

D: 甲苯咪唑

答案：C

80.监测他汀类药所致肌毒性的临床指标的是

A：乳酸脱氢酶

B：尿淀粉酶

C：肌酸激酶

D：碱性磷酸酶

答案：C

81.下列说法正确的是

A：异丙托溴铵口服可提高疗效

B：沙美特罗适用于缓解支气管痉挛的急性症状

C：长效β2受体激动剂不适合初始用于快速恶化的急性哮喘发作

D：氨茶碱可与青霉素合用

答案：C

82.防止急性血栓的首选药物是

A：维生素B

B：香豆素类

C：维生素K

D：肝素

答案：D

83.治疗侵袭性曲霉菌病首选()

A：氟康唑

B：伏立康唑

C：氟胞嘧啶

D：灰黄霉素

答案：B

84.属于P-糖蛋白的底物，提高辛伐他汀发生横纹肌溶解危险性的是

A：烟酸

B：红霉素

C：利福平

D：地高辛

答案：D

85.对阿司匹林过敏或不耐受的患者可选用

A：替罗非班

B：替格雷洛

C：氯吡格雷

D：噻氯匹定

答案：C

86.从植物中提取，具有促进白细胞增生、抗炎、降血压、抗肿瘤、抗心肌缺氧缺血、抗心律失常等作用的是

A：小檗胺

B：鲨肝醇

C：维生素B4

D：丙酸诺龙

答案：A

87.下列可引起糖尿病患者血糖过低，而对非糖尿病患者无降血糖作用的抗心律失常药物是

A：地尔硫革

B：普萘洛尔

C：胺碘酮

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/147143130050010024