

第一章测试

1. 小儿会坐的年龄是（ ）

参考答案：
6 个月

2. 早期诊断先天性甲状腺功能减退症应进行的新生儿期筛查项目是（ ）

参考答案：
TSH

3. 新生儿出生时，皮肤苍白，四肢青紫，心率 40 次/分，无呼吸，四肢略屈曲，弹足底无反应。Apgar 评分（ ）

参考答案：
2 分

4. 先天性心血管畸形形成的胎龄是妊娠（ ）

参考答案：
2～8 周

其身正，不令而行；其身不正，虽令不从。——《论语》

5. 新生儿期的保健重点包括以下几方面（ ）

参考答案：

保温
;喂养
;清洁卫生
;消毒隔离

6. 关于正常小儿运动功能发育，以下哪项正确（ ）

参考答案：

10 个月独站
;12 个月能独走
;18 个月能爬台阶
;2 个月时能抬头

7. 新生儿保健重点应放在生后第一周。（ ）

参考答案：

对

8. 小儿各系统器官发育最早的是神经系统。（ ）

参考答案：

对

9. 新生儿生理调节功能较成熟。（ ）

参考答案：

错

老当益壮，宁移白首之心；穷且益坚，不坠青云之志。——唐·王勃

10. 儿科疾病种类与成人疾病种类相同。（ ）

参考答案：
错

第二章测试

1. 关于新生儿生理性体重下降，以下描述正确的是（ ）

参考答案：
生后 2~4 天，体重下降 5% ， 7 天恢复

2. 正常小儿身高 90cm，体重 14Kg,乳牙 20 个，腕骨骨化中心 4 个，能说短歌谣，会穿鞋。其最可能年龄为（ ）

参考答案：
3 岁

3. 正常小儿 1 周岁时的体重（Kg）和身长（cm）约为（ ）

参考答案：
10,75

4. 小儿前囟闭合最晚的年龄是（ ）

参考答案：

2 岁

5. 关于小儿各系统的发育，下列描述正确的是（ ）

参考答案：
肌肉的生长发育与体格发育相平行
;淋巴系统发育是先快后慢
;小儿生殖系统发育是先慢后快
;腕部骨化中心数是年龄加 1

6. 有关小儿头围数值，以下哪项正确（ ）

参考答案：
5 岁时 50cm
;新生儿平均头围 34cm
;2 岁时 48cm
;6 个月时 44cm
;1 岁时 46cm

7. 脊柱出现胸曲的年龄是 6 个月。（ ）

参考答案：
对

8. 小儿语言发育三个阶段的顺序是发音理解表达。（ ）

参考答案：
对

9. 最能反映骨骼发育的重要指标是头围。（ ）

参考答案：
错

10. 前囟的正确测量方法是邻边中点连线。（ ）

参考答案：
错

第三章测试

1. 母乳喂养早吸吮的最合理时间是出生后（ ）

参考答案：
30 分钟内

2. 人乳中的蛋白质以哪种蛋白为主（ ）

参考答案：
乳清蛋白

3. 关于初乳，下列哪项不正确（ ）

参考答案：
呈淡黄色，含有丰富的脂质

去留无意，闲看庭前花开花落；宠辱不惊，漫随天外云卷云舒。——《幽窗小记》

4. 佝偻病恢复期长骨 X 线改善的特点是（ ）

参考答案：
临时钙化带重新出现

5. 关于母乳喂养，下列描述正确的是（ ）

参考答案：
母乳对婴儿的生长发育有不可替代作用
;母乳含丰富的抗感染物质
;按需哺乳，以哭为号
;有利于婴儿心理和社会适应性发展

6. 关于佝偻病的发病因素，下列哪项是正确的（ ）

参考答案：
肝肾损害
;日光照射不足
;食物中钙磷比例不合适
;疾病和药物的影响

7. 佝偻病肋骨串珠以胸骨旁最明显。（ ）

参考答案：
错

8. 维生素 D 缺乏性佝偻病激期血生化的特点是血清钙降低，血清磷降低，碱性磷酸酶增高。（ ）

参考答案：
对

9. 佝偻病后遗症期的主要表现是精神神经症状。（ ）

参考答案：
错

10. 枕秃、囟门晚闭是佝偻病初期的临床表现。（ ）

参考答案：
错

第四章测试

1. 新生儿生理性体重下降发生在出生后（ ）

参考答案：
第一周

2. 死亡率最高的时期是（ ）

参考答案：
新生儿期

3. 诊断新生儿败血症最有意义的是（ ）

参考答案：
血培养

4. 出生体重低于 1000g 者称（ ）

参考答案：
超低出生体重儿

5. 关于新生儿病理性黄疸的特点哪项是正确的（ ）

参考答案：
黄疸多在生后 24 小时内出现
;黄疸退而复现
;黄疸 4 周不消失

6. 下列哪项属于高危儿（ ）

参考答案：
母亲有妊高征、先兆子痫
;母亲分娩过程中使用镇静剂和止痛药
;高龄产妇
;母孕期吸毒、酗酒
;母亲过去有死胎、死产病史

7. 新生儿寒冷损伤综合征治疗关键是复温（ ）

参考答案：
对

8. 新生儿硬肿症复温越快越好（ ）

参考答案：
错

9. 新生儿硬肿症从头部开始（ ）

参考答案：
错

10. 新生儿开始排尿的时间为生后 2 小时（ ）

参考答案：
错

第五章测试

1. 年长儿多见、剧烈咳嗽、肺部体征不明显的是（ ）

参考答案：
支原体肺炎

2. 小儿肺炎引起全身各系统病理生理变化的关键是（ ）

参考答案：
缺氧

3. 引起疱疹性咽峡炎的病原体是（ ）

柯萨奇 组病毒

4. 引起咽结合膜热的病原体是（ ）

参考答案：
腺病毒 3、7 型

5. 在治疗小儿肺炎过程中出现下列情况均应考虑有并发症（ ）

参考答案：
热退后又突然上升
;体温持续不退
;呼吸困难突然加重
;全身中毒症状加重

6. 婴儿气道的解剖生理特点（ ）

参考答案：
粘液腺分泌不足，气道较干燥，纤毛运动差
;婴儿的气管、支气管较成人狭窄
;软骨柔软，缺乏弹力组织，支撑作用薄弱
;气道粘膜柔嫩、血管丰富
;肺含血多而含气少

7. 小儿肺炎应用抗生素治疗，不发热立刻停药（ ）

参考答案：
错

8. ()

参考答案：
错

9. 小儿肺炎病理生理改变最主要的是缺氧 ()

参考答案：
对

10. 呼吸道合胞病毒肺炎是最常见的病毒性肺炎 ()

参考答案：
对

第六章测试

1. 等渗性脱水时血钠浓度为多少？ ()

参考答案：
~150mmol/L

2. 腹泻患儿易脱水，按脱水性质分，以下哪项是正确的 ()

参考答案：
等渗性脱水

其身正，不令而行；其身不正，虽令不从。——《论语》

3.)

参考答案：
轮状病毒

4. 判断重型腹泻最主要的依据是（ ）

参考答案：
有脱水、酸中毒和电解质紊乱

5. 关于小儿腹泻正确的是（ ）

参考答案：
多因素引起
主要表现为大便次数增多和大便性状改变
;多病原引起
;重者可引起水和电解质紊乱
;6月~2岁婴幼儿发病率高

6. 关于婴儿腹泻补钾原则，下列哪项是对的（ ）

参考答案：
滴注速度不宜过快
;一般见尿补钾
;轻症患者可口服补钾
;静脉补钾浓度不超过 0.3%
;补钾量通常为 150 ~300mg/kg· d

勿以恶小而为之，勿以善小而不为。——刘备

()

参考答案：
错

8. 秋季腹泻病原体主要是细菌 ()

参考答案：
错

9. 腹泻患儿易缺钙、镁 ()

参考答案：
对

10. 明显的周围循环障碍者，紧急扩容宜 2:1 等张含钠液 20ml/kg ()

参考答案：
对

第七章测试

1. 蹲踞现象常见于哪种先天性心脏病 ()

参考答案：
法洛四联症

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/148014042041007021>