

2023 年药学类之药学（士）通关试题库（有答案）

单选题（共 50 题）

1、以下羟基蒽醌中，酸性最强的是

- A. 1, 2-二羟基蒽醌
- B. 3, 6-二羟基蒽醌
- C. 2-羟基蒽醌
- D. 1-羟基蒽醌
- E. 1, 8-二羟基蒽醌

【答案】 B

2、与肝素抗凝相关的维生素是

- A. 维生素 A
- B. 维生素 E
- C. 维生素 K
- D. 维生素 D
- E. 维生素 C

【答案】 C

3、最易感染疟疾的人群是

- A. 婴儿
- B. 妇女
- C. 疟区居民
- D. 老年人

E. 青年人

【答案】 A

4、以红色椭圆形底阴文为专有标识的是()

A. 药品的商品名称

B. 药品包装、标签及说明书

C. 甲类非处方药

D. 乙类非处方药

E. 药品的通用名称

【答案】 C

5、中药大黄的水提液具有显著的致泻作用，该药致泻的主要活性成分属于()。

A. 蒽醌类

B. 苯丙素类

C. 黄酮苷类

D. 生物碱类

E. 鞣质类

【答案】 A

6、沙丁胺醇俗称

A. 喘定

B. 舒喘灵

C. 扑热息痛

D. 氨哮素

E. 消炎痛

【答案】 B

7、下列药品不属于实行管制的是

A. 第一类精神药品

B. 麻醉药品

C. 第二类精神药品

D. 精神药品药用原植物

E. 麻醉药品药用原植物

【答案】 D

8、消化性溃疡与黏膜局部损伤和保护机制之间的平衡失调有关，损伤因素增强（胃酸、胃蛋白酶和幽门螺杆菌）或保护因素减弱（胃黏液-HCO

A. 硫糖铝

B. 替仑西平

C. 奥美拉唑

D. 米索前列醇

E. 胶体枸橼酸铋钾

【答案】 C

9、药物不良反应用英文可缩写为

A. ADR

B. TDM

C. Exe

D. Amp

E. EDR

【答案】 A

10、进行药物临床试验应事先告知受试者或监护人真实情况，并取得

A. 受试者或监护人的书面同意

B. 受试者或监护人的口头同意

C. 受试者或监护人签署的具有法律效力的合同

D. 受试者或监护人批准的《临床试验开始通知书》

E. 受试者或监护人签署的《临床试验方案》

【答案】 A

11、医疗单位配制的制剂可以

A. 凭医生处方在本医疗机构使用

B. 在零售药店凭处方销售

C. 凭处方市场上销售

D. 凭处方在其他医疗机构销售

E. 在医疗单位之间使用

【答案】 A

12、减轻药物引起心悸的措施中，错误的是（ ）。

A. 经常休息

B. 避免紧张

C. 加强体育锻炼

D. 戒烟

E. 多饮水

【答案】 C

13、第一类精神药品处方保存时间为

A. 2 年

B. 6 年

C. 10 年

D. 1 年

E. 3 年

【答案】 A

14、宜选用氨苄西林、阿莫西林的是

A. 军团菌属

B. 革兰阴性杆菌

C. 肺炎链球菌

D. 流感嗜血杆菌

E. 金黄色葡萄球菌

【答案】 D

15、麻醉药品和第一类精神药品的定点批发企业

A. 药品经营企业不得经营

B. 由国务院药品监督管理部门规定的药品批发企业经营

- C. 由省级药品监督管理部门规定的定点药品批发企业经营
- D. 应当具有保证供应责任区域内医疗机构所需麻醉药品和第一类精神药品的能力，并具有保证麻醉药品和第一类精神药品安全经营的管理制度
- E. 应当具有保证供应责任区域内医疗机构所需麻醉药品和第一类精神药品的能力

【答案】 D

16、中枢镇痛药盐酸哌替啶俗称

- A. 大仑丁（苯妥英钠）
- B. 佳乐定
- C. 度冷丁
- D. 可达龙
- E. 心得安

【答案】 C

17、在规定的条件下保持其有效性和安全性的能力，是药品的

- A. 有效性
- B. 安全性
- C. 稳定性
- D. 均一性
- E. 有效性和安全性

【答案】 C

18、药品与非药品、内用药与外用药、处方药与非处方药之间()

- A. 控制堆放高度，定期翻垛

- B. 应与其他药品分开存放
- C. 应分类相对集中存放，按批号及效期远近依次或分开堆码并有明显标志
- D. 应分开存放
- E. 专库、或专区、或单独存放

【答案】 D

19、气喘气雾剂中的氟利昂为

- A. 抛射剂
- B. 增溶剂
- C. 助悬剂
- D. 抑菌剂
- E. 等渗调节剂

【答案】 A

20、负责辖区内处方药与非处方药分类管理的组织实施和监督管理的部门是()

- A. 国务院
- B. 卫生部
- C. 县级以上药监部门
- D. 省级药监部门
- E. SFDA

【答案】 C

21、以下需要检查崩解时限的制剂是

- A. 注射用无菌粉末

- B. 滴眼剂
- C. 栓剂
- D. 片剂
- E. 注射剂

【答案】 D

22、以下有关“哺乳期合理用药原则”的叙述中，不正确的是

- A. 不采用药物治疗手段
- B. 不用哺乳期禁用和慎用的药物
- C. 服药期间暂时不哺乳或减少哺乳次数
- D. 选用乳汁排出少、相对比较安全的药物
- E. 在哺乳后 30 分钟或下次哺乳前 3~4 小时服药

【答案】 A

23、经注册的执业助理医师在乡、镇医院执业必须

- A. 在注册的执业地点取得相应的处方权
- B. 经所在执业地点执业医师签字或加盖专用签章后方有效
- C. 取得资格后方可开具处方
- D. 其处方权即被取消
- E. 应当经所在医疗机构有处方权的执业医师审核并签名或加盖专用签章后方有效

【答案】 A

24、习惯称为潘生丁的药物是

- A. 肝素
- B. 双嘧达莫
- C. 维生素 K
- D. 链激酶
- E. 华法林

【答案】 B

25、在环境适宜时能发育成细菌繁殖体的是

- A. 病毒
- B. 螺旋体
- C. 细胞壁
- D. 芽胞
- E. 荚膜

【答案】 D

26、关于药物不良反应和药源性疾病的说法不正确的是

- A. 药物不良反应的发生率随着用药时间的延长而升高
- B. 药源性疾病会导致机体某个器官或某个组织发生功能性、器质性损害
- C. 肾功能不良时易引起主要经肾排泄的药物血药浓度升高
- D. 长期使用某些药物，为了避免药源性疾病的出现，可突然停药
- E. 肝功能不良时易引起主要经肝代谢的药物血药浓度升高

【答案】 D

27、在 DNA 和 RNA 分子中()

- A. 核糖和碱基都相同
- B. 核糖不同而部分碱基不同
- C. 核糖和碱基都不同
- D. 核糖不同而碱基相同
- E. 核糖相同而碱基不相同

【答案】 B

28、有关氯丙嗪药理作用叙述错误的是

- A. 抗精神失常
- B. 抗抑郁
- C. 镇吐
- D. 阻断 α 受体
- E. 促进催乳素分泌

【答案】 B

29、药检工作人员收到一份异烟肼类药物，要对其建立质量标准。该工作人员首先应该做的是

- A. 苯基丙二酰脲的检查
- B. 游离肼的检查
- C. 6-甲氧基-2-萘乙酮的检查
- D. 游离磷酸盐的检查
- E. 2, 3-甲基苯胺的检查

【答案】 B

30、安钠咖注射液是咖啡因与以下哪种物质形成的复盐水溶液

- A. 苯甲酸钠
- B. 盐酸
- C. 富马酸
- D. 苯磺酸钠
- E. 磷酸

【答案】 A

31、物料中颗粒不够干燥可能造成

- A. 松片
- B. 裂片
- C. 崩解迟缓
- D. 黏冲
- E. 片重差异大

【答案】 D

32、细菌在血液中大量繁殖是

- A. 败血症
- B. 脓毒血症
- C. 毒血症
- D. 菌血症
- E. 菌群失调症

【答案】 A

33、能完全溶于 pH2.0~9.0 的缓冲液中的生物碱为

- A. 水溶性生物碱
- B. 酸碱两性生物碱
- C. 伯胺生物碱
- D. 氮氧化物
- E. 季铵生物碱

【答案】 B

34、《处方药与非处方药分类管理办法》明确，SFDA 的职责不包括

- A. 负责提出处方药与非处方药分类管理办法
- B. 负责处方药的标签和说明书的批准
- C. 负责处方药与非处方药分类管理的组织实施
- D. 负责非处方药目录的公布和调整
- E. 负责非处方药目录的遴选和审批

【答案】 C

35、下列抗甲状腺药中哪个能诱发甲状腺功能亢进

- A. 丙硫氧嘧啶
- B. 卡比马唑
- C. 放射性碘
- D. 大剂量碘化钾
- E. 阿替洛尔

【答案】 D

36、处方中 i. m. 的含义是（ ）。

- A. 皮内注射
- B. 皮下注射
- C. 肌肉注射
- D. 静脉注射
- E. 静脉滴注

【答案】 C

37、单糖透过生物膜是属于

- A. 主动转运
- B. 促进扩散
- C. 膜动转运
- D. 吞噬作用
- E. 被动扩散

【答案】 A

38、《中国药典》（2010年版）规定，一般压制片的崩解时限为

- A. 10min
- B. 15min
- C. 25min
- D. 45min
- E. 2h

【答案】 B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/148071012121006034>