

2024 年广西壮族自治区蒙山县《执业药师之西药学综合知识与技能》考试大全附答案（能力提升）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 处方审核是处方调配的重要环节，药师只有在审核处方内容正确无误时才能进行药品调配。处方审核的结果分为合理处方和不合理处方，不合理处方包括不规范处方、用药不适宜处方和超常处方。

- A: 中药饮片和化学药物在同一处方中开写
- B: 处方字迹模糊不易辨识
- C: 无正当理由超药品说明书用药
- D: 处方中使用了“遵医嘱”字样

答案：C

2. 有潜在的肺毒性的

- A: 苯巴比妥
- B: 氯苯那敏
- C: 呋喃妥因
- D: 双嘧达莫

答案：C

3. 艾滋病的传播途径不包括

- A: 性途径传播
- B: 消化道传播
- C: 经血制品传播
- D: 经血传播

答案：B

4. 药师发现严重滥用药品的处方，应该

A: 拒绝调配处方，联系处方医师并进行干预

B: 拒绝调配处方，并依照有关规定报告

C: 调配处方并发药

D: 拒绝调配处方

答案：B

5. 高血压、动脉硬化患者突然发生剧烈头痛，提示可能是

A: 脑膜炎

B: 脑血管意外

C: 脑肿瘤

D: 动脉瘤

答案：B

6. 淡黄色处方作为

A: 麻醉药品和第一类精神药品处方

B: 儿科处方

C: 急诊处方

D: 普通处方

答案：C

7. 以下哪种铁剂口服吸收效果最差

A: 枸橼酸铁(三价铁)

B: 乳酸亚铁(二价铁)

C: 琥珀酸亚铁(二价铁)

D: 右旋糖酐铁(二价铁)

答案：A

8. 可用口服吐根糖浆 15ml，饮水 500ml 催吐解救的中毒是

- A: 丙戊酸钠中毒
- B: 丙米嗪中毒
- C: 三唑仑中毒
- D: 磷化锌中毒

答案：B

9. 治疗胆囊炎的药物需选用

- A: M 受体激动剂
- B: H₂ 受体阻断剂
- C: 质子泵抑制剂
- D: 消炎利胆片

答案：D

10. (2016 年真题) 医师书写处方时经常使用外文缩写，药师在指导用药时需要准确掌握和解释

- A: 右眼
- B: 适量
- C: 立即
- D: 左眼

答案：A

11. 由服用利尿剂所引起的尿失禁属于 ()

- A: 急性、可逆性/暂时性尿失禁
- B: 真性尿失禁
- C: 压力性尿失禁

D: 急迫性尿失禁

答案：A

12. (肾功能不全者的药物排泄机制)弱酸性药物离子化减少

A: 肾小管分泌减少

B: 肾小管重吸收增加

C: 肾小球滤过减少

D: 肾血流量减少

答案：B

13. 下列药学服务的重要的人群中，特殊人群是指

A: 应用特殊剂型者

B: 药物治疗窗窄、需要做监测者

C: 肝肾功能不全者

D: 需要重新选择药品或调整用药方案者

答案：C

14. 阿司匹林可导致药源性肾病的机制是

A: 不可逆性肾小管坏死

B: 前列腺素合成障碍

C: 结晶沉积

D: 肾小球滤过率下降

答案：B

15. 可帮助人短时间内急速降低体重

A: 蛋白同化制剂

B: 麻醉药品

C: 利尿剂

D: 肽激素类

答案：C

16. 用于估算透析清除率的是（）

A: CoCkroft-GAut 公式

B: CLHD 公式

C: CoChrAnE 分级

D: NCEMERP 标准

答案：B

17. 关于三酰甘油的临床意义说法不正确的是

A: 大量饮酒可使三酰甘油出现假性升高

B: 应用雌激素、避孕药可出现三酰甘油减少

C: 血清三酰甘油增高可提示动脉硬化及高脂血症

D: 长期饥饿或食用高脂肪食品可导致三酰甘油升高

答案：B

18. 镇咳作用强度为可待因的 1/3,咳嗽较弱者宜选用，同时可使痉挛的支气管平滑肌松弛，降低气道阻力的是

A: 喷托维林

B: 苯丙哌林

C: 可待因

D: 羧甲司坦

答案：A

19. 药师审核处方"用药与病症诊断不相符"工作中，所遇到的典型问题不包括

A: 无适应证用药

- B: 有禁忌证用药
- C: 过度治疗用药
- D: 联合用药

答案：D

20. 服用时不宜嚼碎的是

- A: 抗酸药
- B: 解痉、镇痛药
- C: 质子泵抑制剂
- D: 胃黏膜保护剂

答案：C

21. 苯二氮类中毒血压下降时可给予（）

- A: 阿托品
- B: 去甲肾上腺素
- C: 苯妥英钠
- D: 有机硫类

答案：B

22. 患者，男，72岁，以“间断发热、纳差、精神抑郁半年，再发高热1天”为主诉入院，既往体健，无高血压、糖尿病、冠心病史。入院时查体：T36.9℃，P88次/分，R22次/分，BP112/77mmHg，可触及颈部、锁骨上、腋下多部位浅表淋巴结肿大。经实验室检查、影像学检查，确诊为非霍奇金淋巴瘤。

- A: 每21天为1个疗程
- B: 根据患者的体重计算抗肿瘤药物给药剂量
- C: 抗肿瘤药物选择在每个疗程的第一天给药
- D: 抗肿瘤药物均采用静脉给药

答案：B

23. 患者男,78 岁实施右侧髌关节置换术,术后第 10 日,患侧下肢出现肿胀、疼痛,诊断为深静脉血栓。该患者应选用的药物是 ()

- A: 阿司匹林
- B: 依诺肝素
- C: 氯吡格雷
- D: 血凝酶

答案：B

24. (2015 年真题) 患者, 女, 51 岁, 体检时发现血压 160/105mmHg, 糖耐量试验餐后 2 小时血糖为 9.56mmol/L (参考范围 <7.8mmol/L), 甘油三酯 1.52mmol/L (参考范围 0.56~1.70mmol/L), 总胆固醇 6.26mmol/L (参考范围 <5.2mmol/L), 低密度脂蛋白胆固醇 4.85mmol/L (参考范围 2.1~3.1mmol/L), 高密度脂蛋白胆固醇 1.20mmol/L (参考范围 1.2~1.65mmol/L, 肌酐 $60\mu\text{mol/L}$ (参考范围 $45\sim 84\mu\text{mol/L}$), 蛋白尿: ++。临床诊断为高血压病、高脂血症、糖耐量异常。

- A: 普罗布考
- B: 阿托伐他汀
- C: 依折麦布
- D: 非诺贝特

答案：B

25. 抗生素的理论效价指纯品的质量与效价单位的折算比率。以其特定的“盐” $1\mu\text{g}$ 作为 IU 的抗生素是

- A: 土霉素
- B: 链霉素

C: 四环素

D: 红霉素

答案: C

26. 普通处方一般不得超过几日用量

A: 7

B: 1

C: 3

D: 5

答案: A

27. 治疗需用 10%葡萄糖注射液 1000ml，现仅有 50%和 5%浓度的葡萄糖注射液，分别取 50%和 5%浓度的葡萄糖注射液多少毫升进行配制

A: 889ml，111ml

B: 500ml，500ml

C: 111ml，889ml

D: 200ml，800ml

答案: C

28. 1 日 1 次用药的外文规范缩写是

A: qn

B: qod

C: qh

D: qd

答案: D

29. 清洁手术的预防用药时间不超过

A: 48 小时

B: 6 小时

C: 12 小时

D: 24 小时

答案：D

30. 痛经症状严重者可选用的处方药为

A: 可待因

B: 对乙酰氨基酚

C: 贝诺酯

D: 布洛芬

答案：A

31. 主要通过肝脏清除的药物的代谢速度和程度降低，是指

A: 药物排泄

B: 药物吸收

C: 药物分布

D: 药物代谢

答案：D

32. 属于 5-羟色胺及去甲肾上腺素再摄取抑制剂的药品是

A: 吗氯贝胺

B: 雷尼替丁

C: 奥美拉唑

D: 度洛西汀

答案：D

33. 纳洛酮或纳屈酮用于解救吗啡中毒的机制是

- A: 竞争性拮抗作用
- B: 协同作用
- C: 敏感化作用
- D: 减少不良反应

答案：A

34. 对磺胺类药物过敏者可以选用的利尿剂是

- A: 乙酰唑胺
- B: 氢氯噻嗪
- C: 布美他尼
- D: 依他尼酸

答案：D

35. 属于祛痰药的是

- A: 沙丁胺醇
- B: 苯丙哌林
- C: 羧甲司坦
- D: 羟甲唑啉

答案：C

36. 营养性巨幼细胞性贫血只是因为缺乏（）

- A: 白细胞
- B: 叶酸和（或）维生素 B12
- C: 维生素 C
- D: 鞣酸

答案：B

37. 抑制前列腺内双氢睾酮水平，达到降低雄激素水平，提高最高尿流率的是（）

- A: 索利那新
- B: 哌唑嗪
- C: 度他雄胺
- D: 特拉唑嗪

答案：C

38. 给幼儿患者选用糖浆、水剂、冲剂等较合适，体现儿童用药原则中的

- A: 避免食物的影响
- B: 根据儿童特点选择适宜的给药方案
- C: 严格掌握用药剂量
- D: 密切监护

答案：B

39. 下列治疗良性前列腺增生症的药物中，可以引起性功能减退的是

- A: 索利那新
- B: 奥昔布宁
- C: 非那雄胺
- D: 托特罗定

答案：C

40. 应提示患者服用后舌苔、大便可呈灰褐色的是

- A: 胰岛素注射剂
- B: 枸橼酸铋钾
- C: 米索前列醇
- D: 氟西汀

答案：B

41. 在妊娠期可致颅骨和面部畸形、腭裂的药是

- A: 雄激素
- B: 叶酸拮抗剂
- C: 沙立度胺
- D: 孕激素

答案：B

42. 躯干部出现鞭打状色素沉着

- A: 氟尿嘧啶
- B: 白消安
- C: 博来霉素
- D: 柔红霉素

答案：C

43. 维生素 B2 的特定吸收部位在小肠上部，故其最适宜服用的时间是

- A: 餐前
- B: 清晨
- C: 餐后
- D: 餐中

答案：C

44. 有机氟中毒的特效解毒剂是

- A: 维生素 K1
- B: 乙酰胺
- C: 氯磷定
- D: 烯丙吗啡

答案：B

45. 荨麻疹患者常出现

- A: 中性粒细胞增多
- B: 嗜酸性粒细胞增多
- C: 血小板增多
- D: 血红蛋白减少

答案：B

46. 引起药源性肾病的药物,阿昔洛韦可导致

- A: 前列腺素合成障碍
- B: 肾间质纤维化
- C: 肾小管阻塞
- D: 直接肾毒性

答案：C

47. 急性支气管炎呈自限性，对于急性单纯性支气管炎不建议常规使用抗菌药物，除非是出现了肺炎。治疗通常是对症和支持疗法。

- A: 右美沙芬
- B: 伪麻黄碱
- C: 愈创木酚甘油醚
- D: 苯海拉明

答案：A

48. 以下所列药物中，最可能引起血小板减少的是

- A: 呋噻米
- B: 阿司匹林
- C: 维生素 E

D: 硝酸甘油

答案：B

49. 可造成肝脏损害，形成肝硬化或脂肪肝，减弱对药物代谢速度的是

A: 茶叶中的鞣酸

B: 酒中的乙醇

C: 食醋中的醋酸

D: 食盐中的氯化钠

答案：B

50. 患者，男，35 岁，髋关节置换术后 7 天，患者右侧下肢肿胀、疼痛，抬高患肢后可好转。

A: 糖皮质激素

B: 抗菌药物

C: 阿司匹林

D: 布洛芬

答案：A

51. （2017 年真题）药师在指导患者合理用药时应同时关注药物、食物和膳食补充剂的相互影响。下列合用方式合理的是（）

A: 异烟肼与牛奶同服

B: 左甲状腺素与钙剂同服

C: 华法林与人参同服

D: 硫酸亚铁与维生素 C 同服

答案：D

52. 预防乳腺癌患者化疗出现呕吐，可在给药期间给予

A: 人粒细胞巨噬细胞刺激因子 (GM—CSF)

B: 白介素-11(IL-11)

C: 昂丹司琼

D: 甲氧氯普胺

答案: C

53. 填报 ADR / ADE 报告描述的时间

A: 采取措施干预不良反应的时间

B: 患者疾病发病时间

C: 患者用药记录

D: 药品不良反应动态变化的相关症状体征、检查及干预措施结果

答案: A

54. 运动员长期使用可促进肌肉发达，但易导致不孕和心脑血管疾病的兴奋剂是

A: 人促红细胞生成素

B: 氢氯噻嗪

C: 苯丙酸诺龙

D: 可待因

答案: C

55. 缺铁性贫血、铅中毒贫血是由于

A: 血红蛋白生成减少

B: 红细胞生成过多

C: 红细胞丢失过多

D: 红细胞生成减少

答案: A

56. 淋巴细胞正常参考区间是

- A: 0~0.01
- B: 0.03~0.08
- C: 0.01~0.05
- D: 0.20~0.40

答案：D

57. 患者，男，66岁，身高170cm，体重85kg，以“头晕、胸闷、乏力1周”为主诉入院治疗。空腹血糖11.2mmol/L，餐后血糖16.5mmol/L。诊断结果：2型糖尿病。既往有磺胺类药过敏史，一直服用硝苯地平控释片、辛伐他汀片、阿司匹林肠溶片控制高血压和冠心病。医师处方：二甲双胍0.5g bid、消渴丸10丸（规格30g/120丸）bid、罗格列酮4mg qd 治疗。

- A: 肝功能异常
- B: 高血压
- C: 腹胀
- D: 高血脂

答案：A

58. 适用于L-dopa治疗伴疗效减退、症状波动的患者

- A: 苯海索
- B: 恩托卡朋
- C: 左旋多巴
- D: 司来吉兰

答案：B

59. 选择合适药物的首要标准是

- A: 药物治疗的有效性
- B: 药物治疗的安全性

C: 药物治疗的方便性

D: 药物治疗的规范性

答案: A

60. 与硫酸亚铁合用，可减少铁吸收的药物是

A: 叶酸

B: 苜丝肝

C: 克拉维酸钾

D: 奥美拉唑

答案: D

61. (2018 年真题) 为比较不同质子泵抑制剂治疗十二指肠溃疡的经济性,将药物治疗的成本与产生的效用指标以货币进行评估,此药物经济学评价方法是 ()

A: 最小成本分析

B: 成本-效果分析

C: 成本-效益分析

D: 成本-效用分析

答案: C

62. 可分泌到乳汁中引起新生儿黄疸的药物是 ()

A: 复方磺胺甲噁唑

B: 阿莫西林

C: 诺氟沙星

D: 头孢克洛

答案: A

63. (2019 年真题) 患者，女，25 岁，两天前淋雨后开始发热体温 39.0℃，咳嗽，咳铁锈色黏痰，化验结果提示白细胞计数及中性粒细胞比例升高，诊断为肺炎，经验性抗感染治疗时适宜选用的药物

- A: 头孢他啶
- B: 头孢唑林
- C: 阿奇霉素
- D: 阿米卡星

答案：B

64. 很多药物存在血液系统影响，会造成某些血细胞增多或减少头孢拉定主要会造成

- A: 嗜碱性粒细胞增多
- B: 中性粒细胞减少
- C: 嗜酸性粒细胞增多
- D: 嗜酸性粒细胞减少

答案：C

65. 降低痰液黏度，使痰液易于排出的药品是

- A: 右美沙芬
- B: 苯丙哌林
- C: 可待因
- D: 羧甲司坦

答案：D

66. “从患者安全、环境污染和医务人员职业暴露多角度降低风险”的工作是

- A: 参与临床药物治疗
- B: 静脉药物配置

C: 治疗药物监测

D: 处方调剂

答案: B

67. 在配制静脉输液时，不宜用葡萄糖注射液溶解的药品是

A: 盐酸万古霉素

B: 青霉素

C: 两性霉素 B

D: 维生素 K

答案: B

68. 患者,男,21 岁因过敏性鼻炎就诊。关于过敏性鼻炎药物治疗及用药教育的说法,错误的是()

A: 治疗过敏性鼻炎可局部使用糖皮质激素鼻喷剂

B: 过敏性鼻炎的典型症状和感冒症状相似,应注意鉴别

C: 治疗过敏性鼻炎使用口服糖皮质激素,首选地塞米松

D: 过敏性鼻炎患者应尽量避免接触已知的过敏原

答案: C

69. 药源性疾病是由药物诱发的疾病，是指在预防、诊断、治疗或调节生理功能过程中出现与用药有关的人体功能异常或组织损伤所引起的一系列临床症状。引起药源性疾病的因素主要有患者因素、药物因素。

A: 药物制剂因素

B: 药物的使用

C: 药理作用

D: 药动学相互作用

答案: A

70. 下列药师承接的用药咨询内容中，多由患者提出的是

- A: 新药信息
- B: 自我保健
- C: 治疗药物监测
- D: 药品适应证

答案：D

71. 可消除便秘，避免腹腔感染和腹膜透析液引流不畅的药物是

- A: 阿法骨化醇
- B: 乳果糖
- C: 对乙酰氨基酚
- D: 铁剂

答案：B

72. 利尿降压药的常见不良反应是

- A: 体位性低血压
- B: 水、电解质紊乱
- C: 咳嗽
- D: 首剂现象

答案：B

73. 作为预防用药错误策略，制定新药新知识培训制度，归属于

- A: 科学发展
- B: 人员知识培训
- C: 管理规范到位
- D: 环境与流程的优化与持续改进

答案：B

74. 上消化道出血(>50ml)可呈现

- A: 柏油黑便
- B: 白陶土便
- C: 乳凝块便
- D: 鲜血便

答案: A

75. 吸烟后促使儿茶酚胺释放，降低其吸收的药物是

- A: 呋塞米
- B: 西咪替丁
- C: 氯丙嗪
- D: 胰岛素

答案: D

76. 蒽环类抗生素容易引起心脏毒性，可以采用的预防药物是

- A: 肾上腺素
- B: 维生素. 辅酶 Q
- C: 抗组胺药
- D: 糖皮质激素

答案: B

77. 容易氧化的药物是

- A: 牛痘菌苗
- B: 阿朴吗啡、水杨酸钠
- C: 胃蛋白酶
- D: 青霉素类、头孢菌素类

答案: B

78. 滥用人血白蛋白及肿瘤辅助治疗药，应评判为

- A: 过度治疗用药
- B: 有禁忌证用药
- C: 联合用药不适宜
- D: 无适应证用药

答案：A

79. 患者，男，56 岁，因高血压常年服用苯磺酸氨氯地平 10mgqd，近期体检血脂指标为 LDL—C4.8mmol / L，药师应建议患者加服

- A: 叶酸
- B: 福辛普利
- C: 二甲双胍
- D: 阿托伐他汀

答案：D

80. 杨某，女，19 岁，咳嗽、有脓性痰，并伴有胸痛；发热 39℃；肺闻及湿性啰音；WBC>13×10

- A: 支气管炎
- B: 肺结核
- C: 社区获得性肺炎
- D: 哮喘

答案：C

81. 巴比妥类药物重度中毒的表现是

- A: 意识障碍、昏迷
- B: 抽搐反复发作
- C: 呼出气体中可有苦杏仁气味

D: 恶心、呕吐、视力模糊

答案：A

82. 糖尿病急性并发症为

A: 肾动脉硬化

B: 糖尿病酮症酸中毒

C: 糖尿痛肾痛

D: 周围神经病变

答案：B

83. 普通胰岛素的作用峰时为()。

A: 0.25~0.5 小时

B: 1.5~4 小时

C: 6~12 小时

D: 0.6~1.5 小时

答案：B

84. 运动员长期使用可提高疼痛忍耐力，但易导致成瘾和呼吸抑制的兴奋剂是

A: 人促红细胞生成素

B: 可待因

C: 苯丙酸诺龙

D: 氢氯噻嗪

答案：B

85. 6 个月~2 岁婴幼儿白细胞计数正常参考区间是

A: $(100 \sim 300) \times 10^9 / L$

B: $(4.0 \sim 10.0) \times 10^9 / L$

C: $(11.0 \sim 12.0) \times 10^9 / L$

D: $(200 \sim 300) \times 10^9 / L$

答案：C

86. 归属专业学术机构网站的是

A: [www.google](http://www.google.com)

B: www.merck.com

C: www.cmt.com.cn

D: www.ashp.org

答案：D

87. 下列药品中，孕妇禁用的是

A: 环丙沙星

B: 拉贝洛尔

C: 葡萄糖酸钙

D: 维生素 A

答案：A

88. 由细菌引起的急性卡他结膜炎可选用

A: 0.1% 羟苄唑滴眼剂

B: 0.1% 碘苷滴眼剂

C: 四环素眼膏

D: 2% 色甘酸钠滴眼剂

答案：C

89. 抗癫痫药应从小剂量起始给药，滴定增量，长期规律用药。成年癫痫患者药物治疗时

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

A: 丙戊酸钠

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/148075106045007022>