

@精品辅导-只做好题

备考辅导系列

重点难点梯次总结汇编
精华考点合理提炼编排
不同模块全面备考提升
精选真题发现考试规律
章节训练逐一击破短板
全真模拟精确预测趋势
思维拓展强化考前冲刺

注：请仔细预览文本内容，确认后下载学习资料

@高分一次过

粮情检查检测与分析报告（单选 30 题，多选 11 题，共 41 题）

单选题（30 题）：

1、粮库仓储管理部门负责人应每周对粮情进行全面检查，做好记录，每（ ）形成粮情报告，及时上报粮库负责人。

- A 半年
- B 一个月
- C 半个月
- D 一周

正确答案：C

2、粮库分管负责人应每（ ）对粮情进行全面检查，形成粮情分析报告，及时报粮库主要负责人

- A 一个月
- B 半年
- C 半个月
- D 一周

正确答案：A

3、粮库主要负责人应每（ ）对粮情进行全面检查或重点抽查，召开粮情总结分析会，形成粮库安全储粮报告，及时按规定上报。

- A 一周
- B 半个月
- C 季度
- D 一个月

正确答案：C

4、检测粮情时，对于安全水分粮、基本无虫粮，粮温低于 15℃时，粮情（粮温）检测周期为（ ）。

- A15 天内至少检测 1 次
- B5 天内至少检测 1 次
- C10 天内至少检测 1 次
- D7 天内至少检测 1 次

正确答案：A

5、检测粮情时，对于安全水分粮、基本无虫粮，粮温高于 15℃时，粮情（粮温）检测周期为（ ）。

- A10 天内至少检测 1 次
- B7 天内至少检测 1 次
- C15 天内至少检测 1 次
- D5 天内至少检测 1 次

正确答案：B

6、检测粮情时，对于半安全水分粮、一般虫粮，粮温低于 15℃时，粮情（粮温）检测周期为（ ）。

- A7 天内至少检测 1 次
- B10 天内至少检测 1 次
- C15 天内至少检测 1 次
- D5 天内至少检测 1 次

正确答案：B

7、检测粮情时，对于半安全水分粮、一般虫粮，粮温高于 15℃时，粮情（粮温）检测周期为（ ）。

- A7 天内至少检测 1 次
- B15 天内至少检测 1 次
- C10 天内至少检测 1 次
- D5 天内至少检测 1 次

正确答案：D

8、检测粮情时，对于危险水分粮，粮温低于 15℃时，粮情（粮温）检测周期为（ ）。

- A5 天内至少检测 1 次
- B10 天内至少检测 1 次
- C 每天至少检测 1 次

D7 天内至少检测 1 次

正确答案：A

9、检测粮情时，对于危险水分粮，粮温高于 15℃时，粮情（粮温）检测周期为（ ）。

A 每天至少检测 1 次

B10 天内至少检测 1 次

C5 天内至少检测 1 次

D7 天内至少检测 1 次

正确答案：A

10、检测粮情时，对于危险虫粮处理后的 3 个月内的粮，粮情（粮温）检测周期为（ ）。

A15 天内至少检测 1 次

B7 天内至少检测 1 次

C10 天内至少检测 1 次

D5 天内至少检测 1 次

正确答案：B

11、采用计算机测温的，传感器布置应标准规范，应检测‘三温两湿’，记录检测结果并至少保留（ ）。

A 一年

B 一个储藏周期

C 一个季度

D 三年

正确答案：B

12、人员入仓前，应确认安全，特别是（ ）后方可进仓。

A 有同伴

B 气体浓度安全

C 窗户打开

D 灯打开

正确答案：B

13、粮情检测中孢子计数时，在粮堆扦取（ ）粮食样品，通过清洗-过滤-镜检，观察统计危害霉菌孢子数，对储粮的安全性进行评价。

A10g

B5g

C20g

D15g

正确答案：A

14、粮情检测中孢子计数时，对于扦取的粮食样品，通过（ ），观察统计危害霉菌孢子数，对储粮的安全性进行评价。

A 清洗

B 过滤

C 镜检

D 清洗-过滤-镜检

正确答案：D

15、粮情检测过程中，对储粮霉菌的危害进行评价时，若危害霉菌孢子数(个/g)为（ ），则为安全级别，未出现危害霉菌生长。

A $\geq 1.0 \times 10^7$

B $1.0 \times 10^6 \sim 9.9 \times 10^6$

C $< 1.0 \times 10^5$

D $1.0 \times 10^5 \sim 9.9 \times 10^5$

正确答案：C

16、粮情检测过程中，对储粮霉菌的危害进行评价时，若危害霉菌孢子数(个/g)为（ ），则处于临界阶段，以灰绿曲霉为主，后期，会出现少量白曲霉等的生长。

- A $\geq 1.0 \times 10^7$
B $< 1.0 \times 10^5$
C $1.0 \times 10^5 \sim 9.9 \times 10^5$
D $1.0 \times 10^6 \sim 9.9 \times 10^6$

正确答案：C

17、粮情检测过程中，对储粮霉菌的危害进行评价时，若危害霉菌孢子数(个/g)为（ ），则为危害级别，灰绿曲霉生长优势逐渐被白曲霉替代，并会出现少量其它真菌的生长。

- A $< 1.0 \times 10^5$
B $1.0 \times 10^6 \sim 9.9 \times 10^6$
C $1.0 \times 10^5 \sim 9.9 \times 10^5$
D $\geq 1.0 \times 10^7$

正确答案：B

18、粮情检测过程中，对储粮霉菌的危害进行评价时，若危害霉菌孢子数(个/g)为（ ），则为严重危害级别，以白曲霉为主，后期会出现一些黄曲霉、青霉等危害真菌的生长。

- A $< 1.0 \times 10^5$
B $1.0 \times 10^5 \sim 9.9 \times 10^5$
C $\geq 1.0 \times 10^7$
D $1.0 \times 10^6 \sim 9.9 \times 10^6$

正确答案：C

19、当小麦检出的霉菌孢子数达到（ ）时，应采取措施，抑制霉菌继续生长。

- A 3×10^5 个/g
B 1.0×10^5 个/g
C 1.0×10^6 个/g
D 9.9×10^5 个/g

正确答案：A

20、当玉米检出的霉菌孢子数达到（ ）时，应采取措施，抑制霉菌继续生长。

- A 9.9×10^5 个/g
B 3×10^5 个/g
C 1.0×10^5 个/g
D 1.0×10^6 个/g

正确答案：B

21、当大豆检出的霉菌孢子数达到（ ）时，应采取措施，抑制霉菌继续生长。

- A 3×10^5 个/g
B 1.0×10^6 个/g
C 9.9×10^5 个/g
D 1.0×10^5 个/g

正确答案：A

22、当稻谷检出的霉菌孢子数达到（ ）时，应采取措施，抑制霉菌继续生长。

- A 3×10^5 个/g
B 1.0×10^5 个/g
C 1.0×10^6 个/g
D 9.9×10^5 个/g

正确答案：D

23、粮情检测系统控制室应达到（ ），通风，且防尘性能良好的要求。

- A 采光
B 密闭
C 隔热
D 干燥

正确答案：D

24、储粮霉菌检测结果为临界期时，粮食中以（ ）为主。

- A 白曲霉
- B 灰绿曲霉
- C 黄曲霉
- D 青霉

正确答案：B

25、储粮霉菌检测结果为危害期时，粮食中灰绿曲霉生长优势逐渐被（ ）替代，并会出现少量其它真菌的生长。

- A 黄曲霉
- B 青霉
- C 灰绿曲霉
- D 白曲霉

正确答案：D

26、储粮霉菌检测结果为严重危害期时，粮食中以（ ）为主，后期会出现一些其他危害真菌的生长。

- A 黄曲霉
- B 灰绿曲霉
- C 白曲霉
- D 青霉

正确答案：C

27、粮情检测过程中，除对基础粮情进行检查外，有条件的粮库可取样进行粮食籽粒（ ）检测。

- A 气味
- B 温湿度
- C 霉菌孢子
- D 色泽

正确答案：C

28、发现安全储粮问题和隐患，应（ ），逐级督导。

- A 熏蒸
- B 通风
- C 观察
- D 采取相应处理措施

正确答案：D

29、粮库主要负责人应对粮情进行全面检查或重点抽查，召开粮情总结分析会，形成（ ），及时按规定上报。

- A 储粮品质报告
- B 霉菌危害报告
- C 虫情报告
- D 粮库安全储粮报告

正确答案：D

30、检测粮情时，对于新收获粮食入仓后 3 个月内的粮，粮情（粮温）检测应（ ）。

- A15 天内至少检测 1 次
- B5 天内至少检测 1 次
- C 要适当增加检测次数
- D10 天内至少检测 1 次

正确答案：C

多选题（11 题）

1、对未采用计算机测温的粮堆，或者（ ），应进行人工检测检查、记录检测结果

- A 门窗口
- B 计算机测温的盲区
- C 粮温异常点、系统故障点
- D 易发生问题的部位

正确答案：B、C、D

2、根据人员入仓检查粮情的情况，采用（ ），检测问题部位粮食水分，进一步分析粮情风险。

- A 分选筛
- B 粮食水分快速检测仪（器）
- C 抽样送检
- D 扦样器

正确答案：B、C

3、粮情检测时，按 GB/T 29890 的方法取样检测虫情，筛检害虫，同时应（ ）并。

- A 检测‘三温两湿’
- B 鉴定害虫种类
- C 确定虫粮等级
- D 测算虫口密度

正确答案：B、C、D

4、粮情检测时，进仓后，应（ ）

- A 观察仓内有无虫茧网、鼠雀迹
- B 检查仓温仓湿、粮温粮湿
- C 检查粮食色泽气味
- D 检查粮堆是否有结露、板结、发热、霉变等现象

正确答案：A、B、C、D

5、当粮食中霉菌孢子数超标时，应采取（ ）等措施，抑制霉菌继续生长。

- A 翻动粮面
- B 单管或多管通风
- C 熏蒸
- D 谷冷通风

正确答案：A、B、D

6、储粮霉菌检测结果为严重危害期时，粮食中以（ ）等危害真菌的生长为主。

- A 白曲霉
- B 灰绿曲霉
- C 黄曲霉
- D 青霉

正确答案：A、C、D

7、粮情检查时，应按照‘三先’顺序检查，即（ ）。

- A 先仓外后仓内
- B 先无虫粮后有虫粮
- C 先原粮后成品粮
- D 先散装粮后包装粮

正确答案：A、B、C

8、粮食日常管理应做到逐级督导，应实时掌握粮情的是（ ）。

- A 粮库分管负责人
- B 粮库仓储管理部门负责人
- C 保管员
- D 粮库主要负责人

正确答案：A、B、C、D

9、进仓检查粮情时，应检查粮食色泽气味；观察仓内有无虫茧网、鼠雀迹；

- A 发热
- B 霉变
- C 板结
- D 结露

正确答案：A、B、C、D

10、进仓检查粮情时，应观察仓内有无虫茧网、鼠雀迹；检查仓温仓湿、粮温粮湿；检查粮堆是否有结露、板结、

发热、霉变等现象，除此之外还应检查（ ）

- A 破碎率
- B 容重
- C 粮食色泽
- D 粮食气味

正确答案：C、D

11、进仓检查粮情时，应检查粮食色泽气味；检查粮堆是否有结露、板结、发热、霉变等现象；除此之外还应检查仓内（ ）

- A 虫茧网
- B 仓温仓湿
- C 鼠雀迹
- D 粮温粮湿

正确答案：A、B、C、D

储粮温湿度控制（单选 17 题，多选 10 题，共 27 题）

单选题（17 题）：

1、新入仓的粮食进行通风的目的（ ）。

- A 均温
- B 调质
- C 降温
- D 降水

正确答案：A

2、新入仓的粮食单位通风量宜控制在（ ）。

- A $7\sim 11\text{ m}^3/\text{h}\cdot\text{t}$
- B $5\sim 10\text{ m}^3/\text{h}\cdot\text{t}$
- C $8\sim 12\text{ m}^3/\text{h}\cdot\text{t}$
- D $6\sim 12\text{ m}^3/\text{h}\cdot\text{t}$

正确答案：D

3、当粮堆温度梯度满足（ ）时，新入仓粮食被视为通透。

- A $\leq 1.2^\circ\text{C}/\text{m}$
- B $< 1^\circ\text{C}/\text{m}$
- C $\leq 1^\circ\text{C}/\text{m}$
- D $\leq 0.8^\circ\text{C}/\text{m}$

正确答案：C

4、筒式仓新入仓的粮食上层与底层温差为（ ），视为通风通透。

- A $\leq 8^\circ\text{C}$
- B $\leq 11^\circ\text{C}$
- C $\leq 10^\circ\text{C}$
- D $\leq 9^\circ\text{C}$

正确答案：C

5、夏秋季节（ ）时，应适时自然通风或开启排风扇排积热。

- A 仓温或表层粮温明显不低于外温
- B 仓温或粮温明显不低于外温
- C 仓温或粮温明显高于外温
- D 仓温或表层粮温明显高于外温

正确答案：D

6、排积热期间对（ ）和（ ）等做好（ ）工作。

- A 门、窗，防雀
- B 门窗、排风扇口，防雀
- C 门、窗，防虫

D 门窗、排风扇口，防虫

正确答案：D

7、LS/T1202 中规定，粮食水分（ ）当地储粮安全水分时，宜进行（ ）通风。

A 低于，调质

B 高于，降水

C 高于，降温

正确答案：C

8、LS/T1202 中规定，允许降温通风的温度条件（ ）（ t_1 与 t_2 分别是仓外大气温度和粮堆平均温度，单位均温 $^{\circ}\text{C}$ ）

A 开始通风时： $t_2 - t_1 > 8^{\circ}\text{C}$ （亚热带地区： $t_2 - t_1 > 6^{\circ}\text{C}$ ）；通风进行时： $t_2 - t_1 > 3^{\circ}\text{C}$ （亚热带地区： $t_2 - t_1 > 2^{\circ}\text{C}$ ）。

B 开始通风时： $t_2 - t_1 \geq 8^{\circ}\text{C}$ （亚热带地区： $t_2 - t_1 \geq 6^{\circ}\text{C}$ ）；通风进行时： $t_2 - t_1 > 4^{\circ}\text{C}$ （亚热带地区： $t_2 - t_1 > 3^{\circ}\text{C}$ ）。

C 开始通风时： $t_2 - t_1 > 8^{\circ}\text{C}$ （亚热带地区： $t_2 - t_1 > 6^{\circ}\text{C}$ ）；通风进行时： $t_2 - t_1 > 4^{\circ}\text{C}$ （亚热带地区： $t_2 - t_1 > 3^{\circ}\text{C}$ ）。

D 开始通风时： $t_2 - t_1 \geq 8^{\circ}\text{C}$ （亚热带地区： $t_2 - t_1 \geq 6^{\circ}\text{C}$ ）；通风进行时： $t_2 - t_1 > 3^{\circ}\text{C}$ （亚热带地区： $t_2 - t_1 > 2^{\circ}\text{C}$ ）。

正确答案：B

9、冬季通风后，春季仓房宜（ ）有利于保持粮堆低温。

A 密闭隔热

B 谷冷

C 气密

D 熏蒸

正确答案：A

10、据粮库安全储粮守则可知，春季（ ）利于实现储粮安全。

A 粮仓排积热

B 通风降粮温

C 控温去热皮

D 隔热保冷心

正确答案：D

11、夏季，应主要控制（ ）以安全度夏。

A 仓温和表层粮温

B 粮温

C 仓温

D 气温和粮温

正确答案：A

12、在东北、华北、西北地区，夏季利用粮堆（ ）进行相应储粮技术措施。

A 冷心冷量

B 表层热量

C 地面辐射

D 侧壁热交换量

正确答案：A

13、在东北、华北、西北地区，夏季利用粮堆冷心冷量，通过（ ），降低粮堆（ ）。

A 谷物冷却，温度

B 环流熏蒸，温度

C 环流通风，热皮

D 谷物冷却，热皮

正确答案：C

14、除了东北、华北、西北地区之外的其它地区，夏季粮堆应采用（ ）进行控温。

A 自然冷源

B 自然通风

C 机械通风

D 人工冷源

正确答案：D

15、春夏交替之际，做好仓房或粮堆（ ），防止（ ）。

- A 密闭隔热，结露
- B 通风，结露
- C 密闭隔热，发热
- D 通风，发热

正确答案：A

16、秋冬交替之际，随着外温的改变，适时进行（ ）以减小（ ）。

- A 通风，粮温
- B 密闭，温差
- C 通风，温差
- D 密闭，粮温

正确答案：C

17、秋冬交替之际，薄膜密闭的粮堆必要时应（ ），预防结露。

- A 密闭
- B 揭膜
- C 通风
- D 压盖

正确答案：B

多选题（10 题）

1、新入仓的粮食单位通风量宜采用（ ）。

- A $6 \text{ m}^3/\text{h}\cdot\text{t}$
- B $5 \text{ m}^3/\text{h}\cdot\text{t}$
- C $12 \text{ m}^3/\text{h}\cdot\text{t}$
- D $9 \text{ m}^3/\text{h}\cdot\text{t}$

正确答案：A、C、D

2、房式仓新入仓的粮食上层与底层温差为（ ），视为通风通透。

- A 3°C
- B 2°C
- C 2.2°C
- D 1.5°C

正确答案：A、B、C、D

3、（ ）季，粮堆出现（ ）时，要适时采取措施进行排积热。

- A 秋，仓温或表层粮温明显高于外温
- B 夏，仓温或表层粮温明显不低于外温
- C 夏秋，仓温或表层粮温明显不低于外温
- D 夏，仓温或表层粮温明显高于外温

正确答案：A、D

4、（ ）区域，可以利用有利的环境条件，采取自然通风进行缓速降低粮温。

- A 西北
- B 华北
- C 北方
- D 东北

正确答案：A、B、C、D

5、在满足允许通风降温的条件时，秋冬季节应采取（ ）措施降低粮温。

- A 谷物冷却
- B 横向机械通风
- C 自然通风
- D 竖向机械通风

正确答案：B、C、D

6、冬季通风后，春季时仓房除了密闭隔热外，有条件的粮面可（ ）利于保持粮堆低温。

- A 覆一定厚度的稻壳
- B 覆盖一定厚度的棉被
- C 覆膜
- D 压盖

正确答案：A、B、D

7、夏季，粮堆热皮是指粮堆（ ）的较高粮温。

- A 表层
- B 底层
- C 中间
- D 侧壁

正确答案：A、B、D

8、夏季，除了东北、华北、西北外的其它地区，可以采取（ ）进行粮堆控温。

- A 排积热
- B 谷冷
- C 热泵
- D 空调

正确答案：B、C、D

9、春夏交替之际，粮堆易发生结露的位置是（ ）。

- A 易受外界影响的部位
- B 边壁处
- C 粮堆表层
- D 粮堆底层

正确答案：A、B、C

10、季节交替之际，应（ ）防止粮堆结露。

- A 春夏交替之际，应适时通风降低粮温、仓温以减小温差
- B 秋冬交替之际，应适时通风降低粮温、仓温以减小温差
- C 秋冬交替之际，做好仓房或粮堆密闭隔热
- D 春夏交替之际，做好仓房或粮堆密闭隔热

正确答案：B、D

虫霉防治（单选 30 题，多选 20 题，共 50 题）

单选题（30 题）：

1、防虫线布设宽度大于（ ）cm，用于日常放虫。

- A10
- B30
- C2
- D5

正确答案：A

2、在门窗处布设（ ）目以上防虫网。

- A50
- B25
- C80
- D10

正确答案：C

3、储藏时间超过（ ）年的粮食，宜对粮堆底层和上层 30 cm 厚的粮食施用防护剂或食品级惰性粉，按标准剂量施用。

- A2
- B3
- C1

D5

正确答案：C

4、采用喷雾机械施用防护剂时，在皮带输送机输送粮食入仓时（ ）施药。

A 随机

B 定点定量

C 定量

D 定点

正确答案：B

5、防护剂的载体应使用与储粮种类相同的（ ）。

A 药剂

B 稻谷

C 粮食糠壳

D 小麦

正确答案：C

6、使用防护剂的操作人员应经过（ ）。

A 培训

B 领导指挥

C 资格认证

D 上岗评估

正确答案：A

7、施用的防护剂应经过国家农药等管理部门（ ）。

A 批准

B 登记

C 登记和批准

D 购买

正确答案：C

8、粮温 15℃ 以上的一般虫粮，应在（ ）天内进行除治。

A50

B25

C30

D15

正确答案：D

9、严重虫粮应在（ ）天之内进行除治。

A7

B30

C15

D20

正确答案：A

10、危险虫粮应立即隔离并在（ ）天内进行彻底的杀虫处理。

A15

B7

C20

D3

正确答案：D

11、熏蒸方案经粮库负责人审核后报（ ）。

A 当地消防机构。

B 当地粮食行政管理部门备案

C 当地政府

D 当地派出所

正确答案：B

12、已经发霉的粮食要及时（ ）。

- A 清理出仓
- B 施用惰性粉
- C 通入冷风
- D 熏蒸

正确答案：A

13、惰性粉适用于各种未入粮的空仓杀虫处理，用粉量为（ ）g/m³。

- A 0.5~0.75
- B 0.10~0.25
- C 0.75~1.0
- D 0.25~0.5

正确答案：D

14、使用喷粉机，将惰性粉喷施到空仓内，关闭仓房门窗及通风口，密闭（ ）天，达到彻底杀虫目的。

- A 10~14
- B 1~7
- C 3~5
- D 7~10

正确答案：D

15、按（ ）g/m²的用粉量，在门、窗、通风道口和排风扇口布置惰性粉防虫线。

- A 180
- B 60
- C 20
- D 120

正确答案：D

16、按 120 g/m²的用粉量，在门窗、通风道口和排风扇口布置宽（ ）cm 的惰性粉防虫线

- A 10~20
- B 20~30
- C 30~40
- D 5~10

正确答案：A

17、惰性粉气溶胶防虫时，竖向通风选用大于（ ）m³/s/m² 单位面积通风量。

- A 0.0010
- B 0.0015
- C 0.0025
- D 0.0001

正确答案：C

18、惰性粉气溶胶防虫时，横向通风选用大于（ ）m³/s/m² 单位面积通风量。

- A 0.0001
- B 0.0015
- C 0.0010
- D 0.0025

正确答案：B

19、惰性粉气溶胶防虫时，按（ ）g/t 计算用粉量。

- A 10~30
- B 30~40
- C 5~10

正确答案：A

20、惰性粉气溶胶防虫时，用喷粉机在（ ）形成气溶胶，在气流牵引下施入粮堆。

- A 仓外
- B 通风道空间
- C 仓内或通风道空间
- D 仓内

正确答案：C

21、粮堆表层拌合惰性粉防虫，人工将惰性粉拌合到（ ）cm 厚的粮堆表层。

- A0~5
- B30~50
- C10~30
- D5~10

正确答案：B

22、粮堆表层拌合惰性粉防虫，宜采用（ ）向粮面施粉，人工拌合。

- A 输送带
- B 拌粮机
- C 喷粉机
- D 人工

正确答案：C

23、惰性粉拌合处理小麦粮堆表层的用粉量为（ ）g/t（粮）（ ）g/m²（粮面）

- A50，100
- B100，50
- C50，50
- D100，100

正确答案：B

24、惰性粉拌合处理玉米、稻谷粮堆表层的用粉量为（ ）g/t（粮）（ ）g/m²（粮面）

- A150，70
- B150，150
- C75，150
- D75，75

正确答案：A

25、惰性粉拌合处理大豆粮堆表层的用粉量为（ ）g/t（粮）（ ）g/m²（粮面）

- A50，50
- B25，25
- C50，25
- D25，50

正确答案：C

26、惰性粉拌合处理大豆粮堆表层的用粉量为（ ）g/t（粮）（ ）g/m²（粮面）

- A100，100
- B50，50
- C100，50
- D50，100

正确答案：C

27、惰性粉防治粮堆局部害虫，按（ ）g/m² 的用粉量。

- A50
- B150
- C200
- D100

正确答案：C

28、惰性粉防治粮堆局部害虫，向局部危害区表层（ ）cm 施粉、拌合即可。

- A10~30

B0～5

C30～50

D5～10

正确答案：C

29、包装粮表面惰性粉防虫时，根据粮堆面积按（ ）g/m² 的用粉量。

A0～2

B2～5

C10～15

D5～10

正确答案：B

30、包装粮表面惰性粉防虫时，将惰性粉均匀的撒在包装（ ）。

A 粮堆四周

B 粮堆内部

C 粮堆表面

D 粮堆侧壁

正确答案：C

多选题（20 题）

1、在（ ）等处布置和喷施食品级惰性粉、溴氰菊酯或防虫磷等防虫剂

A 排风扇口

B 气密性检测口

C 仓房门窗

D 通风口

正确答案：A、C、D

2、在仓房门窗、排风扇口、通风口等处布置和喷施（ ）等防虫剂。

A 防虫磷

B 溴氰菊酯

C 食品级惰性粉

D 磷化铝

正确答案：A、B、C

3、绿色安全防治储粮害虫，应尽可能减少储粮化学药剂的使用，优选（ ）防虫。

A 温控防虫

B 磷化氢熏蒸

C 防虫磷

D 粮面密封薄膜

正确答案：A、D

4、绿色安全防治储粮害虫，有条件情况下，可采取（ ）。

A 气调防治

B 熏蒸防治

C 生物防治

D 食品级惰性粉防治

正确答案：A、C、D

5、储藏时间超过 1 年的粮食，宜对粮堆的（ ）粮食施用防护剂或食品级惰性粉，按标准剂量施用。

A 中部

B 上层 30 cm 厚

C 底层

D 全部

正确答案：B、C

6、储藏时间超过 1 年的粮食，宜对粮堆底层和上层 30 cm 厚的粮食施用（ ），按标准剂量施用。

A 食品级惰性粉

- B 磷化铝片
- C 溴甲烷
- D 防护剂

正确答案：A、D

7、基本无虫粮和粮温不超过 15℃的一般虫粮，应（ ）。

- A 加强检测
- B 立即熏蒸
- C 做好防护工作
- D 不需进行杀虫处理

正确答案：A、C、D

8、熏蒸杀虫时，粮库仓储管理部门应根据（ ），制定熏蒸方案。

- A 害虫种类
- B 领导意向
- C 虫粮等级
- D 害虫数量

正确答案：A、C

9、熏蒸方法可采取（ ）等储粮方法杀虫。

- A 自然潮解常规熏蒸
- B 缓释熏蒸
- C 间歇施药熏蒸
- D 环流熏蒸

正确答案：A、B、C、D

10、熏蒸方法可采取（ ）等储粮方法杀虫。

- A 帐幕熏蒸
- B 氮气气调
- C 双低熏蒸
- D 磷化氢二氧化碳混合熏蒸

正确答案：A、B、C、D

11、实施熏蒸、气调作业前，（ ）应当按照粮食熏蒸、气调作业单的内容，逐项检查，签字确认。

- A 安全员
- B 仓储部门负责人
- C 粮库分管仓储工作负责人
- D 化验员

正确答案：A、B、C

12、熏蒸投药或气调充氮后，应（ ）确保杀虫效果。

- A 定期补充药量
- B 定期检测气体浓度
- C 必要时补充氮气
- D 必要时补充药量

正确答案：B、C、D

13、熏蒸和气调作业完成后，由仓库（ ）共同签字确认。

- A 粮库分管仓储工作负责人
- B 安全员
- C 仓储部门负责人
- D 化验员

正确答案：A、C

14、惰性粉气溶胶防虫时，用喷粉机在（ ）形成气溶胶，在气流牵引下施入粮堆。

- A 仓内
- B 窗口

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/155020204314011334>