

关于甲亢危象的临床表现、急救及护理

甲亢的定义

甲亢

广义上是指多种原因引起甲状腺合成和/或释放过多的甲状腺激素（thyroid hormone, TH），而导致的以高代谢为主要表现的一组临床综合征，其中以弥漫性甲状腺肿伴甲状腺功能亢进最为常见

甲亢危象的临床表现

甲状腺 功能亢 进危象

是甲状腺功能亢进最严重的并发症，多发生于甲亢未治疗或控制不良患者，在感染、手术、创伤、或突然停药后，以高热、大汗、心动过速、心律失常、严重吐泻、意识障碍等为特征的临床综合征

凶险，死亡率20~30%

病因



常发生于弥漫性中毒性甲状腺肿和毒性结节性甲状腺肿伴甲亢患者



少数为毒性甲状腺腺瘤和甲状腺癌伴甲亢患者



TSH分泌增多导致的甲亢、新生儿及儿童甲亢很少见

诱因

A

甲状腺手术，准备不充分，术中挤压甲状腺，出血过多，休克，术后并发感染

B

应激状态，强烈刺激，外伤，手术，分娩，过度疲劳，感染，AMI等

C

放射性碘治疗

D

其他，如自行停药，甲状腺过度挤压，对病情控制不良的患者更易发生

发病机理



临床表现

危象先兆

淡漠型
危象

活跃型
危象

活跃型危象




活跃型危象临床表现

- 发热：体温多在 $39\sim 42^{\circ}\text{C}$ 之间；
- 心动过速：心率多在 $140\sim 240\text{bpm}$ ，部分表现为房颤，脉压增大，部分发生心衰及休克；
- 中枢神经系统：焦虑不安，激动，定向力异常，烦躁，幻觉，谵妄，昏迷；
- 消化系统：食欲减退、腹痛、腹泻、恶心呕吐，可出现严重失水，部分可有黄疸；

淡漠型危象临床表现

- 淡漠型以上症状与体征不明显，可以缓慢起病，虚弱表现，反应迟钝，表情淡漠，嗜睡，恶液质，肌肉萎缩，体温轻度升高，肤干燥冰冷，心率增加不明显，最后昏迷

临床特点



鉴别诊断

高热

心动
过速

精神
疾病

胃肠
炎

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/155100222002012003>