

# 学习资料整理汇编

(考点或配套习题突击训练)

## 实用临床护理三基考前练习题与答案

1、沿胸骨外侧缘所作的垂线称为：（ ）

- A、 胸骨旁线
- B、 胸骨线
- C、 前正中线
- D、 锁骨中线

答案：B

2、内源性感染又称为：（ ）

- A、 自身感染
- B、 交叉感染
- C、 显性感染
- D、 隐性感染

答案：A

3、在倾听病人说话时，不妥的行为是：（ ）

- A、 全神贯注地听
- B、 及时评论病人所谈内容
- C、 保持目光接触
- D、 适宜的距离

答案：B

4、骨折的局部症状不包括：（ ）

- A、 畸形
- B、 弹性固定
- C、 骨擦音
- D、 异常活动

答案：B

5、以下哪项不是影响疼痛的因素：（ ）

- A、 个人经历
- B、 肥胖
- C、 疲乏
- D、 社会文化背景

答案：B

6、基础体温测定至少必须连续测定几个月：（ ）

- A、 2 个月
- B、 3 个月
- C、 1 个月

D、 4 个月

答案： B

7、 抑郁症的核心症状为： ( )

A、 情绪低落、自责自罪、自制力的改变

B、 情绪低落、自责自罪、兴趣缺乏

C、 情绪低落、乐趣丧失、自制力的改变

D、 情绪低落、兴趣缺乏、乐趣丧失

答案： D

8、 消化道内支架放置术后几小时可进食： ( )

A、 0 小时

B、 2 小时

C、 6 小时

D、 12 小时

答案： B

9、 脉搏血氧饱和度  $SpO_2$  的正常值范围是： ( )

A、 76%~100%

B、 96%~100%

C、 86%~100%

D、 99%~100%

答案： B

10、 乳房癌根治术后的护理措施中，不正确的是： ( )

A、 病人术后血压平稳后可取半卧位

B、 观察患侧肢体远端血液供应情况

C、 患侧上肢平放，避免在患肢测血压、注射和抽血

D、 术后 10 日内不外展，上肢负重不宜过大或过久

答案： C

11、 处理护理纠纷时应做到： ( )

A、 实事求是

B、 以病人利益为中心

C、 以护士利益为中心

D、 以医院利益为中心

答案： A

12、 下列不作为慢性胆囊炎健康教育内容的是： ( )

A、 平时饮食清淡易消化

B、 避免暴饮、暴食

- C、戒烟
- D、急性发作期禁食

答案：C

13、慢性阻塞性肺气肿病人家庭氧疗的方法是：（ ）

- A、每天吸氧 3~5 小时，氧流量 2~4L/min
- B、每天吸氧 5~10 小时，氧流量 2~4L/min
- C、每天吸氧 5~10 小时，氧流量 1~2L/min
- D、每天吸氧 10~15 小时，氧流量 1~2L/min

答案：D

14、下列哪项不是休克抑制期的临床表现：（ ）

- A、精神兴奋
- B、血压下降
- C、脉搏细速
- D、尿量减少

答案：A

15、杨女士，50 岁，因患尿毒症而入院，患者精神萎靡，食欲差，24 小时尿量 80ml。下腹部空虚，无胀痛，请评估病人目前的排尿状况是：（ ）

- A、尿潴留
- B、少尿
- C、无尿
- D、尿失禁

答案：C

16、正规胰岛素属于：（ ）

- A、超短效胰岛素
- B、短效胰岛素
- C、中效胰岛素
- D、长效胰岛素

答案：B

17、下列不属于情境性心理失调的是：（ ）

- A、对疾病认知反应高敏型
- B、面对诊疗的不信任
- C、对身体残缺的防卫反应
- D、久病不愈的消极反应

答案：B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/155214344242011221>