2022-2023 年护师类之护师（初级）能力检测试卷 A 卷附答案

单选题（共 75 题）

1、孕妇 33 岁，孕 28 周，产前检查发现血压 155/100mmHg，尿蛋白(+)，小腿有水肿，请问此孕妇属于

A.产前子痫

B.先兆子痫

C.中度妊娠高血压综合征

D.重度妊娠高血压综合征

E.轻度妊娠高血压综合征

【答案】 C

2、护士准备配制 1%苯扎溴铵溶液。现有 5%苯扎溴铵 10ml，欲加蒸馏水的容量是

A.150ml

B.250ml

C.360ml

D.490ml

E.550ml

【答案】 D

3、甲状腺手术后最危险的并发症是

A.呼吸困难、窒息

B.手足抽搐

C. 误咽后呛咳

D. 声音嘶哑

E. 甲状腺危象

【答案】 A

4、产钳术时产妇的最佳位置是

A. 仰卧位

B. 侧卧位

C. 膀胱截石位

D. 半坐卧位

E. 俯卧位

【答案】 C

5、患者，男性，22 岁。外出学习后被诊断为甲型肝炎住院，他欲将自己的生病情况告知家人，他的信件寄出前应如何消毒

A. 喷雾法

B. 熏蒸法

C. 蒸汽灭菌法

D. 擦拭法

E. 紫外线照射法

【答案】 B

6、初产妇，27 岁。剖宫产术后 1 天，突然阴道大量流血，入院时血压 80/55mmHg，心率 110 次/分，血红蛋白 60g/L。首要的处理原则是（　　）。

A. 加强宫缩

B. 按摩子宫

C. 静脉输入缩宫素

D. 抢救休克

E. 预防感染

【答案】 D

7、患者男，33 岁。酗酒后上腹部持续剧烈痛并向左肩、腰背部放射，伴恶心呕吐 4 小时来院就诊。目前最有助于诊断的辅助检查是

A. 血常规

B. 腹腔穿刺

C. 血、尿淀粉酶

D. 腹部 B 超检查

E. 胸、腹部 X 线平片

【答案】 C

8、按逆时针方向听诊心脏顺序正确的是

A. T→M→P→A→E

B. M→P→A→E→T

C. T→P→M→A→E

D. M→T→A→E→P

E. M→A→P→E→T

【答案】 B

9、患者，女性，64 岁。主诉阴道口有一肿物脱出 3 年。查体发现：子宫颈已脱至阴道口外，子宫体在阴道内。该患者诊断为子宫脱垂，其程度应属于

A. Ⅰ度轻

B. Ⅰ度重

C. Ⅱ度轻

D. Ⅱ度重

E. Ⅲ度

【答案】 C

10、女性生殖器官萎缩，卵巢分泌功能消失应处于

A. 青春期

B. 性成熟期

C. 围绝经期

D. 老年期

E. 儿童期

【答案】 D

11、患儿男，7 岁。面及眼睑水肿 3 天，尿少入院，入院前 2 周患扁桃体炎，T37.5℃，呼吸 80 次/分，脉搏 24 次/分，神志清醒，面部水肿，咽略红，心肺(-)，尿常规：RBC(+++)，蛋白(++)，管型 0，WBC5 个/HP。该患儿应考虑为

A. 尿路感染

B. 单纯性肾病

C. 急性肾炎

D. 慢性肾炎

E. 肾炎性肾病

【答案】 C

12、下面符合慢性盆腔炎手术治疗表现的是

A.长期腰腹部酸痛

B.两侧输卵管增粗

C.不孕

D.炎性包块久治无效

E.慢性子宫内膜炎

【答案】 D

13、新生儿，日龄 1 天。有产钳助产史。患儿表现烦躁不安，突然出现高声尖叫，伴抽搐，初步诊断为颅内出血。护士应立即给患儿采取的体位是

A.中凹位

B.俯卧位

C.头低足高位

D.头偏向一侧

E.头肩抬高 15°～30°

【答案】 D

14、患者，女性，65 岁，门静脉高压症入院，拟行手术治疗，患者术前一般不放胃管，是为了

A.以免影响进食

B.以免引起胃穿孔

C.防止出血

D.减少插管的痛苦

E.防止胃液丢失

【答案】 C

15、结核性腹膜炎可查出移动性浊音是当腹水量超过

A.400ml

B.600ml

C.800ml

D.1000ml

E.1200ml

【答案】 D

16、患儿男，1 岁。因高热惊厥入院，治疗 1 周痊愈出院。出院前对其家长进行健康教育的重点是（ ）。

A.合理的喂养方法

B.体格锻炼的方法

C.惊厥预防及急救措施

D.预防接种的时间

E.门诊复查的时间

【答案】 C

17、患者，女，12 岁，近 6 个月来有盗汗、消瘦、贫血等全身症状，常双手撑腰，上身后倾，拾物时以挺腰姿势下蹲，红细胞沉降率加快，结核菌素试验阳性，提示其可能患有

A.颈椎结核

B.胸椎结核

C.腰椎结核

D.髋关节结核

E.膝关节结核

【答案】 C

18、为患者实行肾脏移植手术后，应采取

A.呼吸道隔离

B.严密隔离

C.接触隔离

D.保护性隔离

E.消化道隔离

【答案】 D

19、输卵管妊娠破裂出血多发生在

A.妊娠 8～12 周

B.妊娠 6 周

C.妊娠 12～16 周

D.妊娠 20 周

E.妊娠 14～20 周

【答案】 B

20、贫血诊断的实验室检查最主要的依据是

A.红细胞计数

B.血红蛋白定量

C.网织红细胞定量

D.红细胞更新速度

E.红细胞计数比例

【答案】 B

21、产前检查发现巨大儿，最需考虑的情况是

A.经产妇

B.营养过剩

C.孕妇并发糖尿病

D.父母身材高大

E.过期妊娠

【答案】 C

22、治疗的胆囊结石，方法正确且效果确切的是下列哪种方法

A.药物溶石疗法

B.体外震波碎石

C.经皮胆囊去石术

D.胆囊切除术

E.胆囊切除、胆总管探查术

【答案】 D

23、一新生儿出生后不久发现体重下降，其他一切正常，该新生儿体重下降的恢复时间一般是

A.4 天左右

B.6 天左右

C.8 天左右

D.10 天左右

E.20 天左右

【答案】 D

24、健康儿童的脑脊液检查正常的一项是

A.脑脊液压力为 50mmH

B.蛋白质总量为 0.3g/L

C.糖为 5.0mmol/L

D.氯化物为 135mmol/L

E.脑脊液总量为 200ml

【答案】 B

25、原发型肺结核是

A.结核菌初次进入机体

B.结核菌侵入肺动脉

C.结核菌侵入淋巴管

D.结核菌侵入脑膜

E.机体对结核菌的主要代谢产物敏感

【答案】 A

26、肺炎球菌肺炎剧烈胸痛者宜取

A.平卧位

B.半卧位

C.坐位

D.患侧卧位

E.健侧卧位

【答案】 D

27、下列选项中，不符合急性肾盂肾炎可能出现的实验室检查结果的是

A.可有肉眼血尿

B.可有脓尿

C.可有管型尿

D.大量蛋白尿

E.血沉加快

【答案】 D

28、患儿，男，5岁，因高度水肿诊断为肾病综合征，予以泼尼松治疗4个月。该患儿可能会出现

A.肝功能损害

B.骨质疏松

C.骨髓抑制

D.性腺损害

E.脱发

【答案】 B

29、关于特发性血小板减少性紫癜患者的治疗，叙述错误的是

A.避免使用损伤血小板的药物，如阿司匹林、吲哚美辛等

B.肾上腺糖皮质激素为首选药物

C.脾切除适用于糖皮质激素治疗 6 个月以上无效者

D.加强体育锻炼，增强抵抗力

E.血小板计数＜20*10

【答案】 D

30、发生急性胆囊炎时体征呈阳性的是

A.Murphy 征

B.Charcot 三联征

C.Rovsing 征

D.Blumberg 征

E.Mirizzi 征

【答案】 A

31、患者，女性，27 岁，确诊 SLE1 年，下肢及面部水肿 2 周。检查：尿中有蛋白(++)，管型(+)，血压 124/80mmHg，脉搏 88/min。

A.肾盂肾炎

B.狼疮性肺炎

C.心力衰竭

D.狼疮性肾炎

E.输尿管炎

【答案】 D

32、患者女性，孕 38 周初产妇，因重度妊高征住院治疗 3 天，症状不见改善，血压 185／120mmHg，尿蛋白(＋＋＋)，尿 E

A.立即剖宫产术

B.继续解痉、降压治疗

C.催产素静点引产

D.人工破膜加催产素静点引产

E.吸氧加抗生素

【答案】 A

33、某产妇，26 岁，第一胎足月临产 14 小时，肛查：宫口开全，胎膜已破，左枕前位。胎头刚开始“拨露”，胎心 140 次/分。首要的护理措施是

A.指导产妇正确使用腹压

B.给产妇吸氧

C.胎心监护

D.消毒外阴

E.准备接生

【答案】 A

34、手术区皮肤消毒不可使用碘酊的是

A.胸部

B.背部

C.会阴部

D.腋窝部

E.颈部

【答案】 C

35、患儿，7 个月。1 周前患支气管肺炎，晨起突然哭闹不止，烦躁，喘憋加重，口唇发绀。体检：呼吸 66/分，心率 170/分，心音低钝，心律不齐，叩诊肝肋下 3.5cm。患儿最可能并发了

A.中毒性心肌炎

B.脑水肿

C.急性心力衰竭

D.脓气胸

E.肺不张

【答案】 C

36、适用输卵管粘连的治疗检查

A.阴道镜检查

B.官腔镜检查

C.腹腔镜检查

D.X 线检查

E.B 超检查

【答案】 B

37、患者男性，38 岁。体重 50 公斤，热液烧伤的面积为 30%，深度均为深二度，第一个 24 小时的补液量是

A.4000ml

B.4250ml

C.5000ml

D.4750ml

E.4500ml

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/156012154054010100